



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-488(A-14VAP084425-23-257)**

Išduotas 2023 m. lapkričio 13 d., galioja iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, 35010 Borgoricco, Italija

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Murin Pasta Extreme.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD), Italija.

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti.

Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklėjimas

Privaloma biocidinio produkto ženklėjimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinių produktų autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A-14VAP084425.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. IT/2015/00306/AUT (R4BP objekto Nr. IT-0012777-0000) pripažinimas.

Vilniaus departamento direktorė A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-488(A-14VAP084425-23-257)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Murin Pasta Extreme

14 produktų tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5 Mr)BPR-488(A-14VAP084425-23-257)

R4BP objekto numeris: LT-0031858-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

Prekinis pavadinimas	Murin Pasta Extreme
----------------------	---------------------

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas	Pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
	Adresas	via Desman, 43, 35010 Borgoricco, Italija
Autorizacijos liudijimo numeris	(10-14 17.5 Mr)BPR-488(A-14VAP084425-23-257)	
<i>R4BP objekto numeris</i>	LT-0031858-0000	
Autorizacijos liudijimo data	2023-11-13	
Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data	2026-12-31	

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Vebi Istituto Biochimico s.r.l.
Gamintojo adresas	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD), Italija
Gamybos vieta	via Desman, 43, 35010 Borgoricco (PD), Italija

1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	Brodifakumas
Gamintojo pavadinimas	ACTIVA SRL
Gamintojo adresas	Via Feltre, 32, 20132 Milan, Italija
Gamybos vieta	via Tre Ponti, 22, 37050 Santa Maria di Zevio (VR), Italija

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

Bendrasis pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Brodifakumas	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Veiklioji medžiaga	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. **Formuliacijos tipas**

PA - Pasta

3. **PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS**

Pavojingumo kategorijos	Gali pakenkti organams (kraujas), jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai.
Pavojingumo frazės	Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Prieš naudojimą perskaityti etiketę. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Saugoti, kad nepatektų į aplinką. PRARIJUS: Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ / kreiptis į gydytoją. Turinį/talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

4. **AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)**4.1. **Naudojimo aprašymas****Lentelė 1. Naudojimas # 1 – Neprofesionalieji naudotojai**

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: pilkoji žiurkė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: pilkoji žiurkė Vystymo stadija: jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: naminė pelė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: naminė pelė Vystymo stadija: jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	patalpos lauko Patalpose ir lauke aplink pastatus Pelės: patalpose Žiurkės: patalpose ir lauke aplink pastatus

Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse.</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: žiurkės 150 g, pelės 50 g</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Pelių masalo produktai: Vienoje masalo dėžutėje – 50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Jei graužikų užsiveisė daug, priemonę naudoti kas 2 metrus.</p> <p>Pelės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėti masalo.</p> <p>Žiurkės- Vienoje masalo dėžutėje – 150 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 10 metrų. Jei graužikų užsiveisė daug, priemonę naudoti kas 5 metrus.</p> <p>Žiurkės - Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėti masalo.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Neprofesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>MURIN PASTA Extreme pakuojama dviejų tipų pakuotėse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalo pasta supakuota į maistinį popierių po 10 - 15 g 2. Plastikiniai padėkliukai po 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 75 g, 80 g, 100 g <p>Pakuotės dydis: nuo 50 iki 150 g</p> <p>Pakuotės medžiaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vokas, plastikas: koekstruzija/HDPE/polietilenas - metalinė dėžutė/skardinė, popierius, kartonas - dėžė, popierius, kartonas su voku viduje koekstruzija/ HDPE/polietilenas

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Masalo dėžutes pastatyti vietose, kurios nėra apsemtos vandens.
- Pakeisti masalą masalo dėžutėje, jei masalas sudrėko arba buvo užterštas nešvarumais.

- Prieš pradėdant naudoti produktą, perskaityti ir vadovautis produkto informacija bei bet kokia informacija, pateikiama kartu su produktu arba informacija, pateikiama pardavimo vietoje.
- Prieš pradėdant naudoti graužikams skirtus produktus, reikėtų apsvarstyti galimybę taikyti necheminius kontrolės būdus (pvz., naudoti spąstus).
- Nepalikti maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikti išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalyti vietos, kurioje užsiveisė graužikai, nes taip tik išbaidsysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose pastebėti graužikai (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Neatidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.
- Kai produktas naudojamas vienos dozės plastikiniuose padėkliukuose, įdėjus nukirpti viršutinę apsauginę juostelę.
- Masalo dėžutes padėti taip, kad jos būtų nepasiekiamos vaikams, paukščiams, augintiniams, ūkiniam gyvūnams ir kitiems gyvūnams, kuriems masalas nėra skirtas.
- Masalo dėžutes padėti atokiai nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiai nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Nedėti masalo dėžučių prie vandens nutekėjimo sistemų, kad būtų išvengta masalo sąlyčio su vandeniu.
- Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Panaudojus produktą, nusiplauti rankas ir atviras kūno vietas.
- Baigus naudoti, pašalinti likusį masalą arba masalo dėžutes.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Siekiant, kad produkto būtų suėsta kuo daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, taikyti prevencines kontrolės priemones (uždaryti landas ir pašalinti maisto ir gėrimų likučius).
- Nenaudoti antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
- Produkto aprašyme (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad: produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).
- Naudotojai turi aiškiai paženklinti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinti masalo dėžutes, laikantis produkto naudojimo rekomendacijų“).
- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Produkto aprašyme (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.
- Graužikų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, bent jau taip dažnai, kaip tikrinamos masalo dėžutės.
- Negyvus graužikus šalinti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti kraujosrūvų, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

– Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik kvalifikuoto gydytojo/veterinaro.

– Po kontakto su oda - iš pradžių nuplauti odą vandeniu, o tada nuplauti muilu ir vandeniu.

– Patekus į akis - visuomet patikrinti ir išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie yra. Skalauti akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūti atsimerkus. - Patekus į burną - atsargiai praskalauti burną su vandeniu. Niekada nedėti nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinti vėmimo. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam produkto pakuotę ar etiketę.

- Jei produktą prarijo naminis gyvūnas, susisiekti su veterinarijos gydytoju.

- Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052.“.

– Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

- Baigus naikinti graužikus, nesuėstą masalą ir pakuotę, šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalvumus.

- Rekomenduojama mūvēti pirštines.

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti uždarytą ir atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

4.2. **Naudojimo aprašymas**

Lentelė 2. Naudojimas # 2 – Profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: pilkoji žiurkė Vystymo stadija: suaugusieji Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus

	<p>Bendrinis pavadinimas: pilkoji žiurkė Vystymo stadija: jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: naminė pelė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: naminė pelė Vystymo stadija: jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	<p>patalpos lauko Patalpose ir lauke aplink pastatus Pelės: patalpose Žiurkės: patalpose ir lauke aplink pastatus</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: žiurkės 200 g, pelės 50 g</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Pelių masalo produktai: Vienoje masalo dėžutėje – 50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Jei graužikų užsiveisė daug, priemonę naudoti kas 2 metrus.</p> <p>Pelės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėti masalo.</p> <p>Žiurkės - Vienoje masalo dėžutėje – 200 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 10 metrų. Jei graužikų užsiveisė daug, priemonę naudoti kas 5 metrus.</p> <p>Žiurkės - Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėti masalo.</p>

Naudotojų kategorija (-os)	Pramonės Profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>MURIN PASTA Extreme pakuojama dviejų tipų pakuotėse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalo pasta supakuota į maistinių popierių po 10 - 15 g 2. Plastikiniai padėkliukai po 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 75 g, 80 g, 100 g <p>Pakuotės dydis: nuo 1,5 kg iki 25 kg</p> <p>Jei pakuotė didesnė kaip 10 kg, pakuotė gali būti sudaryta iš atskirų supakuotų maišelių, kurių maksimalus dydis yra 5 kg arba 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vokas, plastikas: koekstruzija/ HDPE/polietilenas - metalinė dėžutė/skardinė, popierius, kartonas - dėžė, popierius, kartonas su voku viduje koekstruzijacoextruded/ HDPE/polietilenas - kibirėlis: HDPE

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Prieš pradėdant naudoti produktą, perskaityti ir vadovautis produkto informacija, bei bet kokia informacija, pateikiama kartu su produktu arba informacija, pateikiama pardavimo vietoje.
- Prieš pradėdant naudoti masalą, atlikti užkrėstos vietos įvertinimą, kurioje užsiveisė graužikai. Nustatyti graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.
- Nepalikti maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikti išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalyti vietos, kurioje užsiveisė graužikai, nes taip tik išbaudysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.
- Šis produktas turėtų būti naudojamas tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės sistemos (IPM) dalis, įskaitant ir kitas priemones, tokias kaip higienos reikalavimų laikymasis ir, jei įmanoma, fiziniai kontrolės metodai.
- Siekiant, kad produkto būtų suėsta kuo daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, taikyti prevencines kontrolės priemones (uždaryti landas ir pašalinti maisto ir gėrimų likučius).
- Masalo dėžutės turėtų būti dedamos kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėti graužikai (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos, nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima judinti arba atidaryti (etiketėje pateikiama informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turi būti paženklintos įspėjamaisiais ženklais, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turi būti pateikiamas informacinis

pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantasi pasekmės, bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

– Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad jo graužikai negalėtų ištraukti iš masalo dėžutės.

– Masalą padėti taip, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, ūkiniam gyvūnams ir kitiems gyvūnams.

– Masalą padėti atokiai nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiai nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.- Naudojant produktą, mūvėti apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

- Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Panaudojus produktą, nusiplauti rankas ir atviras kūno vietas.

– Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitos sudėties masalo naudojimą.

- Jei po 35 dienų nuo graužikų naikininimo pradžios, graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą topriežastį. Jei atmetamos visos galimos priežastys, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnio poveikio rodenticidus. Taip pat apsvarstyti galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

– Baigus naudoti, pašalinti likusį masalą arba masaloo dėžutes.

- Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.

- Kai produktas naudojamas vienos dozės plastikiniuose padėkliukuose, įdėjus, nukirpti viršutinę apsauginę juostelę.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdant naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

- Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, graužikų naikinimo laikotarpiu, kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).

– Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienas, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

– Nenaudoti antikoaguliantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

- Produkto aprašyme (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas nėra skirtas neprofesionaliesiems naudotojams (pvz., „tik profesionaliesiems naudotojams“).

– Produktas turi būti naudojamas tinkamose saugiose masalo dėžutėse (pvz., „naudoti tik saugiose masalo dėžutėse“).

– Naudotojai turi aiškiai paženklinti masalo dėžutes, pateikdami produkto charakteristikų santraukos 5.3 skirsnyje nurodytą informaciją (pvz., „paženklinti masalo dėžutes, laikantis produkto naudojimo rekomendacijų“).

- Naudojant šį produktą, graužikai turėtų išnykti per 35 dienas. Produkto aprašyme (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad tuo atveju, jei iki naudojimo pabaigos graužikai neišnyksta, naudotojas turėtų pasitarti su produkto tiekėju ar kvalifikuotu kenkėjų kontrolės specialistu.

– Masalo naudojimo laikotarpiu neplauti masalo dėžučių.

- Negyvus graužikus šalinti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginę arba netiesioginę poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti kraujosrūvų, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

– Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik kvalifikuoto gydytojo arba veterinaro.

– Po kontakto su oda – iš pradžių nuplauti vandeniu, o tada nuplauti muilu ir vandeniu.

– Patekus į akis - visuomet patikrinti ir išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra. Skalauti akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūti atsimerkus.

- Patekus į burną - atsargiai praskalauti burną su vandeniu. Niekada nedėti nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatinėti vėmimo. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo naminis gyvūnas, susisiekti su veterinarijos gydytoju.

- Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052“.

– Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

- Baigus naikinti graužikus, nesuėstą masalą ir pakuotę, šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

- Rekomenduojama mūvēti pirštines.

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti uždarytą ir atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Galiojimo laikas: 2 metai

4.3. Naudojimo aprašymas

Lentelė 3. Naudojimas # 3 – Kvalifikuoti profesionalieji naudotojai

Produkto tipas	PT 14 - Rodenticidai
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Netaikoma
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos)	<p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: pilkoji žiurkė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus norvegicus Bendrinis pavadinimas: pilkoji žiurkė Vystymo stadija: jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Rattus rattus Bendrinis pavadinimas: juodoji žiurkė Vystymo stadija: jaunikliai</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: naminė pelė Vystymo stadija: suaugusieji</p> <p>Mokslinis pavadinimas: Mus musculus Bendrinis pavadinimas: naminė pelė Vystymo stadija: jaunikliai</p>
Naudojimo sritis	<p>patalpos lauko Pelės ir (arba) žiurkės: patalpose ir lauke aplink pastatus Žiurkės: lauke - atviruose plotuose Žiurkės: lauke - atliekų sąvartynuose</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Metodas: masalo naudojimas</p> <p>Išsamus aprašymas: Paruoštas naudoti masalas, skirtas naudoti saugiose masalo dėžutėse</p> <p>Paruoštą masalą naudoti dengtose ir apsaugotose masalo vietose</p>
Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas	<p>Naudojimo kiekis: žiurkės 200 g, pelės 50 g</p> <p>Skiedimas (%): 0</p> <p>Taikymo skaičiaus ir laikas:</p> <p>Pelių masalo produktai: Vienoje masalo dėžutėje – 50 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 5 metrai. Jei graužikų užsiveisė daug, priemonę naudoti kas 2 metrus.</p> <p>Pelės: Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, masalo dėžutes reikėtų patikrinti ne rečiau kaip kas 2–3 dienas, o vėliau – bent kartą per savaitę.</p>

	<p>Prireikus vėl įdėti masalo.</p> <p>Žiurkės- Vienoje masalo dėžutėje – 200 g masalo. Jei reikia daugiau kaip vienos masalo dėžutės, atstumas tarp masalo dėžučių turėtų būti ne mažesnis kaip 10 metrų. Jei graužikų užsiveisė daug, priemonę naudoti kas 5 metrus.</p> <p>Žiurksė - Siekiant išsiaiškinti, ar masalas ėdamas, ar masalo dėžutės nėra pažeistos, taip pat siekiant pašalinti graužikų kūnus, masalo dėžutes reikėtų patikrinti tik po 5–7 dienų, o vėliau tikrinti ne rečiau kaip kartą per savaitę. Prireikus vėl įdėti masalo.</p>
Naudotojų kategorija (-os)	Kvalifikuotas profesionalusis naudotojas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>MURIN PASTA Extreme pakuojama dviejų tipų pakuotėse:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masalo pasta supakuota į maistinį popierių po 10 – 15 g 2. Plastikiniai padėkliukai po 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 75 g, 80 g, 100 g <p>Pakuotės dydis: nuo 1,5 kg iki 25 kg</p> <p>Jei pakuotė didesnė kaip 10 kg, pakuotė gali būti sudaryta iš atskirų supakuotų maišelių, kurių maksimalus dydis yra 5 kg arba 10 kg</p> <p>Pakuotės medžiaga:</p> <ul style="list-style-type: none"> - vokas plastikas: koekstruzija/HDPE/polietilenas - metalinė dėžutė/skardinė, popierius, kartonas - dėžė, popierius, kartonas su voku viduje koekstruzija/HDPE/polietilenas - kibirėlis: HDPE

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

- Prieš pradėdant naudoti produktą, perskaityti ir vadovautis produkto informacija, bei, bet kokia informacija, pateikiama kartu su produktu arba informacija pardavimo vietoje.

– Prieš pradėdant naudoti masalą, atlikti užkrėstos vietos įvertinimą, kurioje užsiveisė graužikai. Nustatyti graužikų rūšis, jų buvimo vietas ir galimą jų užsiveisimo priežastį bei mastą.

- Nepalikti maisto taip, kad jis būtų lengvai pasiekiamas graužikams (pvz., nepalikti išpiltų grūdų arba maisto atliekų). Be to, prieš pat masalo naudojimą nevalyti vietos, kurioje užsiveisė graužikai, nes taip tik išbaidysite graužikus ir bus sunkiau suvilioti juos masalu.

– Šis produktas turėtų būti naudojamas tik kaip integruotos kenkėjų kontrolės sistemos (IPM) dalis, įskaitant ir kitas priemones, tokias kaip higienos reikalavimų laikymasis ir, jei įmanoma, fiziniai kontrolės metodai.

- Produktas turėtų būti dedamas kuo arčiau tų vietų, kuriose anksčiau pastebėti graužikai (pvz., prie jų judėjimo takų, lizdų, maitinimosi vietų, landų, urvų ir t. t.).

- Masalas turi būti dedamas taip, kad būtų kuo labiau sumažintas poveikis netikslinėms rūšims ir vaikams.

- Apsaugoti masalą nuo atmosferos sąlygų. Dėti masalą vietose, kurios nėra apsemiamos.

- Uždengti arba užblokuoti įėjimus į urvus, kuriuose yra masalo, kad sumažinti masalo atmetimo riziką ar išsiliejimą.
- Jei įmanoma, masalo dėžutės turi būti pritvirtinamos prie žemės ar kito pagrindo.
- Masalo dėžutės turi būti aiškiai paženklintos nurodant, kad jose yra rodenticidų ir kad jų negalima judinti arba atidaryti (etiketėje pateikiama informacija nurodyta 5.3 skirsnyje).
- Jei produktas naudojamas viešose vietose, naudojimo laikotarpiu tos naudojimo vietos turi būti paženklintos įspėjamaisiais ženklais, o konkrečiose vietose, kuriose padedamas masalas, turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio arba antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės, bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.
- Pakeisti masalą dėžutėse nauju masalu, jei masalas sušlapo ar užsiteršė.
- Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad jo graužikai negalėtų ištraukti iš masalo dėžutės.
- Masalą padėti taip, kad jis būtų nepasiekiamas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, ūkiniam gyvūnams ir kitiems gyvūnams.
- Masalą padėti atokiai nuo maisto, gėrimų ir pašarų, taip pat atokiai nuo buities reikmenų ar paviršių, kurie liečiasi su maistu, gėrimais arba pašarais.
- Naudojant produktą, mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės)
- Naudojant produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Panaudojus produktą, nusiplauti rankas ir atviras kūno vietas.
- Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.
- Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama apsvarstyti kitos sudėties masalo naudojimą.
- Jei po 35 dienų nuo graužikų naikinimo pradžios, graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetamos visos galimos priežastys, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnio poveikio rodenticidus. Taip pat apsvarstyti galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.
- Baigus naudoti, pašalinti likusį masalą arba masalo dėžutes.
- Jei naudojama impulsinė masalo sistema, suvalgytą masalą keisti tik po 3 dienų, o paskui - ne rečiau kaip kas 7 dienas. Surinkti išbarstytą masalą ir negyvus graužikus.
- Negalima atidaryti maišelių, kuriuose yra masalas.
- Kai produktas naudojamas vienos dozės plastikiniuose padėkliukuose, įdėjus, nukirpti viršutinę apsauginę juostelę.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

- Jei įmanoma, prieš pradėdant naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniams asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

- Siekiant, kad produkto būtų suėsta kuo daugiau ir sumažėtų pakartotinio graužikų atsiradimo tikimybė, taikyti prevencines kontrolės priemones (uždaryti landas ir pašalinti maisto ir gėrimų likučius).
- Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, graužikų naikinimo laikotarpiu kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (pvz. mažiausiai 2 kartus per savaitę).
- Masalą dėti tik į kanalizacijos sistemas, kurios yra prijungtos prie nuotekų valymo įrenginių.
- Nenaudoti produkto graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.
- Produkto aprašyme (t. y. etiketėje ir (arba) informaciniame lapelyje) turi būti aiškiai nurodyta, kad produktas gali būti tiekiamas tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams, turintiems pažymėjimą, kuriuo įrodoma atitiktis taikomiems parengimo reikalavimams (pvz., „tik kvalifikuotiems profesionaliesiems naudotojams“).
- Nenaudokite vietose, kuriose įtariamas atsparumas veikliajai medžiagai.
- Siekiant kontroliuoti atsparumą, nekeisti antikoagulantų kitais, kurių stiprumas panašus arba silpnesnis. Rotacinio naudojimo tikslais apsvarstyti galimybę naudoti ne antikoaguliantinį rodenticidą, jei toks yra, arba naudoti stipresnio poveikio antikoaguliantą.
- Graužikų naikinimo metu, neplauti masalo dėžučių ar kitų naudojamų reikmenų uždengtose ir apsaugotose masalo naudojimo vietose.
- Negyvus graužikus šalinti laikantis nacionalinių teisės aktų reikalavimų.

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

- Dedant masalo dėžutes šalia vandens nubėgimo sistemų, įsitikinti, kad masalas nesilies su vandeniu.- Sudėtyje yra antikoaguliantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti kraujosrūvų, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.
- Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik kvalifikuoto gydytojo/veterinaro.
- Po kontakto su oda – iš pradžių nuplauti odą vandeniu, o tada nuplauti vandeniu ir muilu.
- Patekus į akis - visuomet patitikrinti ir išsiimti kontaktinius lęšius, jei jie yra. Skalauti akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūti atsimerkus.
- Patekus į burną - atsargiai praskalauti burną vandeniu. Niekada nedėti nieko į samonę praradusio žmogaus burną.Neskatinti vėmimo. Prarijus, nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei prarijo naminis gyvūnas, susisiekti su veterinarijos gydytoju.
- Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052“.
- Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

- Baigus naikinti graužikus, nesuėstą masalą ir pakuotę, šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.
- Rekomenduojama mūvėti pirštines.

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

- Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti uždarytą ir atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Galiojimo laikas: 2 metai

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

žr. konkrečius autorizuotus naudojimus

5.2. Rizikos valdymo priemonės

žr. konkrečius autorizuotus naudojimus

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

- Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai, kaip kraujavimas iš nosies ar dantenų. Sunkiais atvejais ant kūno gali atsirasti kraujosrūvų, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujo.

– Priešnuodis: vitaminas K1, skiriamas tik kvalifikuoto gydytojo/veterinaro.

– Po kontakto su oda – iš pradžių nuplauti vandeniu, o tada nuplauti vandeniu ir muilu.

– Patekus į akis - visuomet patikrinti ir išimti kontaktinius lęšius, jei jie yra. Skalauti akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu ir ne mažiau kaip 10 minučių pabūti atsimerkus.

- Patekus į burną - atsargiai praskalauti burną su vandeniu. Niekada nedėti nieko į samonę praradusio žmogaus burną. Neskatinėti vėmimo. Prarijus nedelsiant kreiptis į gydytoją ir parodyti jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo naminis gyvūnas, susisiekti su veterinarijos gydytoju.

- Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: „nejudinti ir neatidaryti“, „viduje yra rodenticidų“, produkto pavadinimas arba autorizacijos numeris, veiklioji (-ios) medžiaga (-os) ir „Informacija apsinuodijus tel. +370 5 236 2052“.

– Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

- Baigus naikinti graužikus, nesuėstą masalą ir pakuotę, šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

- Rekomenduojama mūvēti pirštines.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

- Laikyti sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Talpyklą laikyti uždarytą ir atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių.

– Laikyti vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams ir ūkiniams gyvūnams nepasiekiamose vietose.

– Galiojimo laikas: 2 metai

6. KITA INFORMACIJA

- Antikoagulantų veikimo laikas yra ganėtinai ilgas (uždelstas) - graužikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienų.

- Graužikai yra potencialūs ligų platintojai. Neliesti negyvų graužikų plikomis rankomis – dėvėti pirštines arba naudoti specialius įrankius (žnyplės).

– Šio produkto sudėtyje yra dažų ir karčiųjų medžiagų.

Etiketėje turi būti nurodoma:

Sudėtis: brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,0025 %.

Partijos numeris:

Tinka naudoti iki:

Pakuotė (g, kg):

Liudijimas išduotas: Vebi Istituto Biochimico s.r.l., via Desman, 43, 35010 Borgoricco, Italija

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5 Mr)BPR-488(A-14VAP084425-23-257)