

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: DIFETEC P-29F

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/19-12/07

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0018349-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	2
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	3
4. Odobrena uporaba	3
5. Opće upute za uporabu	17
5.1. Upute za uporabu	17
5.2. Mjere za smanjenje rizika	19
5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	19
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	20
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	20
6. Ostale informacije	20

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

DIFETEC P-29F
BONIRAT NEXT SVJEŽI MAMAC FLUO-NP
BONIRAT NEXT SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP
BONIRAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO-NP
BONIRAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP
ZED DF SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO-NP
ZED DF SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP
STEGORAT NEXT SVJEŽI MAMAC FLUO-NP
STEGORAT NEXT SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP
STEGORAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO-NP
STEGORAT SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO-NP
BONITOP SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO
BONITOP SENSITIVE SVJEŽI MAMAC PLUS FLUO
RATIDIF SENSITIVE SVJEŽI MAMAC FLUO
GARDENTOP SVJEŽI MAMAC P-29F
BONIRAT SVJEŽI MAMAC
AGRIRAT SVJEŽI MAMAC
BROS Meki mamac protiv miševa i štakora III

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	ZAPI S.p.A.
	Adresa	via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/19-12/07	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0018349-0000	
Datum odobrenja	28/12/2017	

Datum isteka odobrenja

14/03/2023

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača

ZAPI S.p.A.

Adresa proizvođača

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija

Lokacija proizvodnih pogona

Via Terza Strada 12 35026 Conselve Italija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar

26 - Difenakum

Naziv proizvođača

PM Tezza S.r.l.

Adresa proizvođača

Viale del Lavoro 326 37050 Angiari (VR) Italija

Lokacija proizvodnih pogona

Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio Italija

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Difenakum	3-(3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl)-4-hydroxycoumarin	Aktivna tvar	56073-07-5	259-978-4	0,0029

2.2. Vrsta formulacije

PA - pasta

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Može uzrokovati oštećenje organa (krv) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti .

Oznake obavijesti

Prije uporabe pribaviti posebne upute.

Ne rukovati prije upoznavanja i razumijevanja sigurnosnih mjera predostrožnosti.

Pri rukovanju proizvodom ne jesti, piti niti pušiti.

Nositi zaštitne rukavice.

U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost:Zatražiti savjet liječnika.

U slučaju zdravstvenih tegoba zatražiti savjet liječnika.

Skladištiti pod ključem.

Odložiti sadržaj u/na skladu s propisima o zbrinjavanju opasnog otpada - predajom tvrtki ovlaštenoj za skupljanje te vrste otpada.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Osposobljeni profesionalni korisnici - suzbijanje miševa i štakora - u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Mus musculus
Uobičajeno ime: kućni miš
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene	u zatvorenom prostoru u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca - Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce ili za primjenu na prekrivena i zaštićena mjesta koja osiguravaju istu razinu zaštite ne-ciljnih vrsta i ljudi.
Broj i vremenski raspored primjena	Protiv miševa - do 50 g mamca po mjestu postavljanja; Protiv štakora - do 100 g mamca po mjestu postavljanja. - Mamac spreman za uporabu - Miševi - Jaka infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara. Štakori - Jaka infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra. - Blaga infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Označena plastična (PP) kanta s unutarnjom plastičnom (PE) oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg. Označeno pakiranje od vlaknastog kartona s unutarnjom PE oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovцем koji se skida, za miševe od 50 g - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovцем koji se skida, za štakore od 100 g - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovцем koji se skida, od 50 g za miševe u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovцем koji se skida, od 100 g za štakore u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg. Označene plastične (HDPE) cjevčice (za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja) od 600 g u označenoj kartonskoj kutiji ili označenoj plastičnoj (PP) kanti - 5 kg do 15 kg. Označena plastična (PE) vreća (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Na kraju provedene deratizacije sve neiskorištene mamce ukloniti i zbrinuti u skladu sa Zakonom o otpadu i važećim lokalnim propisima kako bi se spriječilo otrovanje ljudi i ne-ciljnih vrsta.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije tretiranja treba obavijestiti sve moguće prolaznike (na primjer korisnike tretiranog područja i njegovog okruženja) o provođenju deratizacijskih mjera.
- U obzir treba uzeti preventivne kontrolne mjere (začepiti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamca i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Sakupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svake kontrole mjesta postavljanja mamaca, kako bi se spriječilo sekundarno otrovanje.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za povremenu (pulsnu) primjenu.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti 5.4.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti 5.5.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Osposobljeni profesionalni korisnici - suzbijanje miševa i štakora - na otvorenom u blizini zgrada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: kućni miš
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Znanstveno ime: *Rattus norvegicus*
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene	na otvorenom na otvorenom oko zgrada
Načini primjene	primjena mamaca - Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce ili za primjenu na prekrivena i zaštićena mjesta koja osiguravaju istu razinu zaštite ne-ciljnih vrsta i ljudi.
Broj i vremenski raspored primjena	Protiv miševa - do 50 g mamca po mjestu postavljanja; Protiv štakora - do 100 g mamca po mjestu postavljanja. - Mamac spreman za uporabu. - Miševi - Jaka infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara. Štakori - Jaka infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra. - Blaga infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara.
Kategorije korisnika	osposobljeni profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Označena plastična (PP) kanta s unutarnjom plastičnom (PE) oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg. Označeno pakiranje od vlaknastog kartona s unutarnjom PE oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, za miševe od 50 g - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, za štakore od 100 g - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, od 50 g za miševe u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, od 100 g za štakore u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg. Označene plastične (HDPE) cjevčice (za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja) od 600 g u označenoj kartonskoj kutiji ili označenoj plastičnoj (PP) kanti - 5 kg do 15 kg. Označena plastična (PE) vreća (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg.

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.
- Zamijeniti svaki postavljeni mamac koji je oštetila voda ili je kontaminiran zemljom.
- Na kraju provedene deratizacije ukloniti sve neiskorištene mamce.
- Za uporabu na otvorenom: mjesta postavljanja mamaca trebaju biti prekrivena i smještena na mjesta na kojima je minimalna mogućnost izloženosti ne-ciljnih vrsta.

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ako je to moguće, prije tretiranja treba obavijestiti sve moguće prolaznike (na primjer korisnike tretiranog područja i njegovog okruženja) o provođenju deratizacijskih mjera.
- U obzir treba uzeti preventivne kontrolne mjere (začepiti rupe, ukloniti hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamca i smanjila vjerojatnost ponovne pojave glodavaca.
- Sakupiti i zbrinuti uginule glodavce kod svake kontrole mjesta postavljanja mamaca, kako bi se spriječilo sekundarno otrovanje.
- Proizvod ne koristiti kao trajni mamac za prevenciju infestacije glodavcima ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Ne koristiti proizvod za povremenu (pulsnu) primjenu.
- Ovaj proizvod ne primjenjivati izravno u jazbine.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (npr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti u 5.4.

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti u 5.5.

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Amaterska uporaba – kućni miševi – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije relevantno za rodenticide.

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: *Mus musculus*
Uobičajeno ime: kućni miš
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene	u zatvorenom prostoru u zatvorenom prostoru
Načini primjene	primjena mamaca - Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce.
Broj i vremenski raspored primjena	do 50 g mamca po mjestu postavljanja - - - Miševi - Jaka infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Označena PP prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce osigurana od neovlaštenog otvaranja s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 50 g. Označeni plastični (PP, PE, HDPE) lončić osiguran od otvaranja od strane djece s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 50 g. Označena kutija od vlaknatice sa sistemom za ponovno zatvaranje i unutarnjom plastičnom (PE) vrećom s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 50 g. Označena plastična (PP) kanta sa sistemom za ponovno zatvaranje i unutarnjom plastičnom (PE) vrećom s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 50 g. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida – do 50 g. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida u kartonskoj kutiji – do 50 g. Označena plastična (PE) vreća s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - za miševe – do 50 g.

4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti 5.2.

4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti 5.3.

4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti 5.4.

4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti 5.5.

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Amaterska uporaba – štakori – u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije značajno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

U zatvorenom prostoru.

Načini primjene

primjena mamaca -

Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce.

Broj i vremenski raspored primjena

do 100 g mamca po mjestu postavljanja - - -

Štakori

- Jaka infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra.
- Blaga infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara.

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Označena PP prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce osigurana od neovlaštenog otvaranja s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označeni plastični (PP, PE, HDPE) lončić osiguran od otvaranja od strane djece s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označena kutija od vlaknatice sa sistemom za ponovno zatvaranje i unutarnjom plastičnom (PE) vrećom s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označena plastična (PP) kanta sa sistemom za ponovno zatvaranje i unutarnjom plastičnom (PE) vrećom s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida – do 100 g.
Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida u kartonskoj kutiji – do 100 g.
Označena plastična (PE) vreća s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - za štakore – do 150 g.

4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.

4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti 5.2.

4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti 5.3.

4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti 5.4.

4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti 5.5.

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Amaterska uporaba - štakori - na otvorenom u blizini zgrada

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije značajno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Rattus norvegicus Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	na otvorenom Na otvorenom, u blizini zgrade.
Načini primjene	primjena mamaca - Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce.

Broj i vremenski raspored primjena

do 100 g mamca po mjestu postavljanja - - -

Štakori

- Jaka infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra.
- Blaga infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara.

Kategorije korisnika

Široka javnost (amaterska uporaba)

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Označena PP prethodno napunjena zaštitna kutija za mamce osigurana od neovlaštenog otvaranja s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označeni plastični (PP, PE, HDPE) lončić osiguran od otvaranja od strane djece s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označena kutija od vlaknatice sa sistemom za ponovno zatvaranje i unutarnjom plastičnom (PE) vrećom s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označena plastična (PP) kanta sa sistemom za ponovno zatvaranje i unutarnjom plastičnom (PE) vrećom s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - do 100 g.
Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida – do 100 g.
Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida u kartonskoj kutiji – do 100 g.
Označena plastična (PE) vreća s 10/15 g mamca u vrećicama od filter papira - za štakore – do 150 g.

4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Postaviti kutije s mamcima na područja koja ne mogu biti poplavljena.
- Zamijeniti svaki postavljeni mamac koji je oštetila voda ili je onečišćen tlom.
- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.

4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti 5.2.

4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti 5.3.

4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti 5.4.

4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti 5.4.

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Profesionalni korisnici - suzbijanje miševa i štakora - u zatvorenom prostoru

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Nije značajno za rodenticide.
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Uobičajeno ime: kućni kiš Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Uobičajeno ime: smeđi štakor Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke
Područje primjene	u zatvorenom prostoru U zatvorenom prostoru.
Načini primjene	primjena mamaca -

	Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce.
Broj i vremenski raspored primjena	<p>Protiv miševa - do 50 g mamca po mjestu postavljanja; Protiv štakora - do 100 g mamca po mjestu postavljanja. - - -</p> <p>Miševi - Jaka infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svaka 2 metra. - Blaga infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara.</p> <p>Štakori - Jaka infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra. - Blaga infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara.</p>
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	<p>Označena plastična (PP) kanta s unutarnjom plastičnom (PE) oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg. Označeno pakiranje od vlaknastog kartona s unutarnjom PE oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, za miševe od 50 g - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, za štakore od 100 g - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, od 50 g za miševe u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg. Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovcem koji se skida, od 100 g za štakore u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg. Označene plastične (HDPE) cjevčice (za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja) od 600 g u označenoj kartonskoj kutiji ili označenoj plastičnoj (PE) kanti - 5 kg do 15 kg. Označena plastična (PE) vreća (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg.</p>

4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Miševi

- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema potrebi.

Štakori

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.
- Slijediti dodatne preporuke relevantnog Koda najbolje prakse.

4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Vidjeti 5.2.

4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti 5.4.

4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti 5.5.

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Profesionalni korisnici - suzbijanje miševa i štakora - na otvorenom u blizini zgrada

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 14: Rodenticidi (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

Nije značajno za rodenticide.

Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Mus musculus
Uobičajeno ime: kućni miš
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Znanstveno ime: Rattus norvegicus
Uobičajeno ime: smeđi štakor
Stadij razvoja: mlade i odrasle jedinke

Područje primjene

na otvorenom

Na otvorenom, u blizini zgrade.

Načini primjene

primjena mamaca -

Mamci spremni za uporabu, namijenjeni za postavljanje u zaštitne (deratizacijske) kutije za mamce.

Broj i vremenski raspored primjena

Protiv miševa - do 50 g mamca po mjestu postavljanja; Protiv štakora - do 100 g mamca po mjestu postavljanja. - - -

Miševi

- Jaka infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svaka 2 metra.
- Blaga infestacija: do 50 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metara.

Štakori

- Jaka infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 5 metra.
- Blaga infestacija: do 100 g mamca po mjestu postavljanja svakih 10 metara.

Kategorije korisnika

profesionalac

Veličine pakiranja i ambalažni materijal

Označena plastična (PP) kanta s unutarnjom plastičnom (PE) oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg.

Označeno pakiranje od vlaknastog kartona s unutarnjom PE oblogom (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg.

Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovom koji se skida, za miševe od 50 g - 5 kg do 15 kg.

Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovom koji se skida, za štakore od 100 g - 5 kg do 15 kg.

Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovom koji se skida, od 50 g za miševe u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg.

Označeni plastični (PET) pladanj s označenim pokrovom koji se skida, od 100 g za štakore u kartonskoj kutiji - 5 kg do 15 kg.

Označene plastične (HDPE) cjevčice (za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja) od 600 g u označenoj kartonskoj kutiji ili označenoj plastičnoj (PP) kanti - 5 kg do 15 kg.

Označena plastična (PE) vreća (10/15 g mamca u papirnatim čajnim vrećicama) - 5 kg do 15 kg.

4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Mamac zaštititi od nepovoljnih vremenskih uvjeta (npr. kiše, snijega, itd.). Mjesta postavljanja mamca ne smiju se nalaziti u zoni poplavlivanja.

Miševi

- Kutije s mamcem treba provjeriti barem svaka 2 do 3 dana u početku tretmana i nakon toga najmanje jednom tjedno te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac treba ponovno napuniti prema

potrebi.

Štakori

- Kutije s mamcem treba provjeriti 5 do 7 dana od početku tretmana i barem jednom tjedno nakon toga te provjeriti je li mamac prihvaćen, jesu li kutije s mamcem netaknute te ukloniti tijela uginulih glodavaca. Mamac ponovno dopuniti prema potrebi.
- Zamijeniti svaki postavljeni mamac koji je oštetila voda ili je onečišćen tlom.
- Slijediti dodatne upute Koda najbolje prakse.

4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Ovaj proizvod ne primjenjivati izravno u jazbine.

4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Kod postavljanja mamca u blizini vodotoka (pr. rijeka, jezera, kanala, nasipa, kanala za navodnjavanje) ili sustava odvodnje osigurati da mamac ne dođe u dodir s vodom.

4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti 5.4.

4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti 5.5.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije trebaju biti pričvršćene na tlo ili druge strukturne predmete.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.
- Mamac treba osigurati kako se ne bi mogao odvući iz kutije za mamce.
- Proizvod treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica navest će nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu).
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda oprati ruke i izravno izloženu kožu.
- O učestalosti pregleda tretiranog područja odlučuje izvođač na temelju provedene procjene početkom primjene. Ta bi učestalost trebala biti usklađena s preporukama iz mjerodavnog kodeksa najboljeg iskustva.
- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Ne otvarati vrećice s mamcem.
- Koristiti špatulu (lopaticu) za čišćenje mamca nakon tretmana (za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja).

Opća javnost

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Prije uporabe rodenticidnih pripravaka treba razmotriti ne-kemijske kontrolne mjere (pr. zamke).
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Gdje je moguće, zaštitne kutije trebaju biti pričvršćene na tlo ili druge strukturne predmete.
- Ne otvarati vrećice s mamcem.
- Proizvod treba postaviti izvan dosega djece, ptica, kućnih ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Ne postavljati kutije s mamcima u blizinu sustava za odvodnju vode gdje mogu doći u kontakt s vodom.
- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda oprati ruke i izravno izloženu kožu.
- Na kraju tretmana ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.

Profesionalni korisnici:

- Prije uporabe pročitati i slijediti upute o uporabi proizvoda, kao i sve informacije koje prate proizvod ili su dostupne na mjestu prodaje.
- Pregledati detaljno infestirano područje i provesti procjenu lokacije prije postavljanja mamca kako bi se utvrdile vrste glodavaca, mjesta na kojima se primjećuje njihova aktivnost, najvjerojatniji uzrok i jačina infestacije.
- Ukloniti izvore hrane koji su dostupni glodavcima (npr. rasuto žito ili otpadke od hrane). Osim toga, ne treba čistiti infestirano područje neposredno prije tretiranja, jer to može uznemiriti populaciju glodavaca i otežati da glodavci prihvate postavljeni mamac kao izvor hrane.
- Proizvod treba koristiti kao dio programa integriranog suzbijanja štetnika (IPM) koji treba uključivati, između ostalog, higijenske mjere te, gdje je to moguće, i fizikalne mjere suzbijanja.
- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Proizvod postaviti na mjesta u neposrednoj blizini mjesta gdje su uočene aktivnosti glodavaca (npr. staze kretanja, mjesta skrivanja, hranjenja, rupe glodavaca, itd.).
- Ako je moguće, kutije s mamcem treba učvrstiti na tlo ili druge površine.
- Kutije s mamcem trebaju biti jasno označene da sadrže rodenticide te da se ne smiju premještati ili otvarati.
- Ako se proizvod koristi na javnim površinama, tretirana područja trebaju se označiti tijekom deratizacije te je pored mamaca potrebno postaviti obavijest o rizicima od primarnog i sekundarnog otrovanja antikoagulantnim rodenticidom, kao i navesti mjere koje je potrebno poduzeti u slučaju otrovanja, sve mora biti vidljivo na cijelom području na kojem se provodi deratizacija.
- Mamac treba učvrstiti kako se ne bi mogao odvući iz kutije s mamcem.
- Proizvod postaviti izvan dosega djece, ptica, ljubimaca, domaćih životinja i drugih ne-ciljnih životinja.
- Proizvod postaviti dalje od hrane, pića i hrane za životinje, kao i od predmeta i površina koje su u kontaktu s navedenim.
- Tijekom rukovanja proizvodom treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica navest će nositelj odobrenja u

informacijama o proizvodu).

- Pri uporabi proizvoda ne jesti, piti ni pušiti. Nakon uporabe proizvoda operite ruke i izravno izloženu kožu.
- Ako je potrošnja mamaca relativno mala u odnosu na veličinu infestacije, treba razmotriti premještanje mamca na druge lokacije ili promijeniti formulaciju mamca.
- Ako se konzumiranje mamaca nastavi i nakon perioda od 35 dana i ne primjećuje se smanjenje aktivnosti glodavaca, potrebno je utvrditi vjerojatni uzrok tome. Kada se drugi razlozi isključe, postoji sumnja na otpornost glodavaca; tada treba razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ili jačih antikoagulantnih rodenticida, ili zamke kao alternativne mjere za suzbijanje glodavaca.
- Na kraju tretmana ukloniti preostale mamce ili kutije s mamcem.
- Ne otvarati vrećice s mamcem.
- Koristiti špatulu (lopaticu) za čišćenje mamca nakon tretmana (za primjenu pomoću aplikacijskog pištolja).

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Profesionalni korisnici:

- Ako je to moguće, prije početka tretmana obavijestiti sve moguće prolaznike o provođenju deratizacijskih mjera.
- Ne upotrebljavati u područjima gdje se može očekivati pojava rezistencije na aktivnu tvar.
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Za sprječavanje pojave otpornosti, ne izmjenjivati proizvod sa drugim antikoagulantnim rodenticidom slične ili slabije jačine. Za zamjenu proizvoda razmotriti primjenu ne-antikoagulantnog rodenticida ako je moguće ili jačeg antikoagulantnog rodenticida.
- Između primjena ne prati vodom deratizacijske kutije ili posude koje se upotrebljavalo na prekrivenim i zaštićenim mjestima s mamcima.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod namijenjen samo za osposobljene profesionalne korisnike koji imaju certifikat o završenoj odgovarajućoj edukaciji (npr. "samo za osposobljene profesionalne korisnike").

Opća javnost

- Razmotriti mogućnost primjene preventivnih mjera (zatvoriti rupe, uklonite hranu i piće što je dalje moguće) da bi se poboljšala konzumacija mamaca i smanjila vjerojatnost ponovne invazije.
- Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana. Ako proizvod do kraja deratizacijskog postupka nije učinkovit (aktivnost glodavaca je i dalje primjetna), informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno uputiti korisnika da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Sakupiti i zbrinuti uginule glodavce tijekom deratizacije, najmanje kod svake kontrole mjesta postavljanja mamaca.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

Profesionalni korisnici:

- Ako je moguće, prije tretiranja obavijestiti sve moguće prolaznike (na primjer korisnike) o kampanji za suzbijanje glodavaca.
- Kako bi se smanjio rizik od sekundarnog otrovanja, redovito treba tražiti i uklanjati uginule glodavce tijekom tretiranja (barem dva puta tjedno).
- Proizvode ne koristiti dulje od 35 dana bez provođenja procjene infestacije i učinkovitosti tretiranja.
- Ne koristiti mamce koji sadrže antikoagulantne aktivne tvari kao trajne mamce za sprječavanje infestacije glodavaca ili nadzor aktivnosti glodavaca.
- Informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) moraju jasno navoditi da je proizvod nije namijenjen za opću uporabu (npr. "samo za profesionalne korisnike").
- Uporaba ovog proizvoda trebala bi suzbiti glodavce u roku od 35 dana. Ako proizvod do kraja deratizacijskog postupka nije učinkovit (aktivnost glodavaca je i dalje primjetna), informacije o proizvodu (tj. uputa za uporabu i/ili deklaracija) trebaju jasno uputiti korisnika da potraži savjet od dobavljača proizvoda ili nazove službu za suzbijanje glodavaca (DDD).
- Kutije za mamce ne prati vodom između primjena.
- Uginule glodavce zbrinuti u skladu s lokalnim propisima.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

- Ovaj proizvod sadrži antikoagulantnu tvar. Ako se proguta, simptomi se mogu pojaviti s odgodom i mogu uključivati krvarenje iz nosa i desni. U teškim slučajevima, mogu se pojaviti modrice i krv u urinu i fecesu.

- Antidot: Vitamin K1 - primjenjuje samo medicinsko/veterinarsko osoblje.

- U slučaju:

- Dodira s kožom - oprati kožu vodom, a zatim sapunom i vodom.
- Dodira s očima - isprati oči tekućinom za ispiranje očiju ili vodom, držati kapke otvorenima, ispirati najmanje 10 minuta.
- Gutanja - oprezno isprati usta vodom. Osobi koja je u nesvijesti nikada ništa ne davati na usta. Ne izazivati povraćanje. Ako se proguta, odmah potražiti savjet liječnika i pokazati spremnik proizvoda ili deklaraciju. Ako je životinja progutala proizvod, potražiti pomoć veterinaru.

- Zaštitne kutije moraju biti označene sa sljedećim informacijama: "ne pomicati; ne otvarati"; "sadrži rodenticid"; "naziv proizvoda ili broj odobrenja"; "aktivna tvar: difenakum" i "u slučaju nesreće, nazvati Centar za kontrolu otrovanja na tel. 01/2348-342".

- Opasno za divlje životinje.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Osposobljeni profesionalni korisnici:

- Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom. Tijekom uklanjanja i odlaganja proizvoda na kraju tretmana treba nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije (materijal rukavica navest će nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu) i koristiti špatulu (lopaticu).

Opća javnost

- Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.

Profesionalni korisnici:

- Na kraju provedene deratizacije treba neiskorištene mamce i ambalažu ukloniti u skladu sa Zakonom o otpadu i Uredbom za postupanje s opasnim otpadom.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati na suhom, hladnom i dobro ventiliranom mjestu. Spremnik čuvati zatvoren i dalje od izravnog sunčevog svjetla. Čuvati izvan dohvata djece, ptica, kućnih ljubimaca i domaćih životinja.
Rok valjanosti: 24 mjeseca

6. Ostale informacije

- Antikoagulantni rodenticidi imaju odgođeni učinak djelovanja koji se može uočiti od 4 do 10 dana nakon konzumiranja mamca.

- Glodavci mogu prenositi bolesti. Uginule glodavce ne dirati golim rukama, koristiti rukavice ili hvataljke kod sakupljanja i zbrinjavanja lešina.

- Proizvod sadrži gorku tvar i boju.

P280 Nositi zaštitne rukavice. (samo profesionalni korisnici)