

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: DERATION PARAFFINATO

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2013/0003/MRA/ IT/2012/00073 AUT

Numărul curent R4BP 3: RO-0001646-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	1
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	2
3. Fraze de pericol și de precauție	2
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	3
4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	4
4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	4
4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	4
4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	4
4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	5
4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	5
4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	5
4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	5
4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	5
4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	6
4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	6
4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	7
4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	7
4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	7
4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	8
4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	8

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	8
4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	8
4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	8
4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	10
4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	10
4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	10
4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	10
4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	10
4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	11
4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	11
4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	11
4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	12
4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	12
5. Direcții generale de utilizare	12
5.1. Instrucțiuni de utilizare	12
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	13
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	13
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	13
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	13
6. Alte informații	14

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

DERATION PARAFFINATO

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	COLKIM S.R.L.
	Adresa	Via Piemonte, 50 40064 Ozzano Emilia Italia
Numărul curent	RO/2013/0003/MRA/ IT/2012/00073 AUT	
Numărul curent R4BP 3	RO-0001646-0000	
Data autorizației	14/12/2012	
Data de expirare a autorizației	31/12/2022	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	COLKIM S.R.L.
Adresa producătorului	VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia
Adresa locurilor de producție	VIA PIEMONTE, 50 40064 OZZANO DELL'EMILIA (BO) Italia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	12 - Bromodiolonă
Numele producătorului	ACTIVA S.R.L.
Adresa producătorului	Via Feltre, 32 20132 MILAN Italia
Adresa locurilor de producție	Dr. Tezza S.r.l. - via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria di Zevio Italia

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Substanța activă	28772-56-7	249-205-9	0.005

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol	<p>Poate dăuna fătului.</p> <p>Provoacă leziuni ale organelor SANGE în caz de expunere prelungită sau repetată .</p>
Fraze de precauție	<p>A nu se manipula decât după ce au fost citite și înțelese toate măsurile de securitate.</p> <p>Purtați mănuși de protecție.</p> <p>ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere:Consultați medicul.</p> <p>Nu inspirați praful.</p> <p>Aruncați conținutul la reglementarilor nationale si internationale.</p>

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Soareci de casa- interior – profesioniști

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti
Domeniul de utilizare	de interior INTERIOR
Metoda (metodele) de aplicare	În cutii cu momeală - momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	40 gr de produs pentru punct de momeala - 0 - daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Produs de momeală: unități de 20 gr Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Statiile de momeala trebuie sa fie vizitate cel putin la 2-3 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta rozatoarele moarte. Reumpleti cand este necesar.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

--

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când Amplasarea stațiilor de momeală este aproape de sistemele de scurgere, asigurați-vă ca momeala nu este în contact cu apa.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

--

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: până la 24 de luni

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Sobolani - profesioniști - interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulți Rattus rattus-Black rat-de la tineri la adulți
Domeniul de utilizare	de interior INTERIOR
Metoda (metodele) de aplicare	În cutii cu momeală - momeala gata de utilizare – stații momeala rezistente
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	60-100 gr de produs pentru punct de momeala - 0 - daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanța minimă a acestora trebuie să fie de 5 metri.

Categoria (categoriile) de utilizatori

industrial
profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Produs de momeală: unități de 20 gr
Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg până la 25 kg
Material de ambalare: compoziție de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilina); plastic; carton

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Statiile de momeala trebuie vizitate între 5 – 7 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămâna după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, dacă stațiile de momeala sunt intacte și pentru a îndepărta sobolanii morți. Reumpleți, când este necesar.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare**4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului**

Când
Amplasarea stațiilor de momeala este aproape de sistemele de scurgere, asigurați-vă că momeala nu este în contact cu apa.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia**4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare**

Viata de raft: până la 24 de luni

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Soareci de casă și sobolani – profesioniști - în exterior în jurul clădirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulti
Domeniul de utilizare	în aer liber in exterior in jurul cladirilor
Metoda (metodele) de aplicare	În cutii cu momeală - momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Soareci de casa: 40 gr de produs pentru punct de momeala; Sobolani: 60-100 gr de produs pentru punct de momeala - 0 - daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Produs de momeală: unități de 20 gr Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- protejati momeala de conditiile atmosferice (de ex. ploaie, zapada,etc.) Amplasati statiile de momeala in zone care nu se inunda.
- statiile de momeala trebuie sa fie vizitate (pentru soareci cel putin la fiecare 2-3 zile), (pentru sobolani numai 5 – 7 zile dupa inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, daca statiile de momeala sunt intacte si pentru a indeparta animalele moarte. Reumpleti, cand este necesar.
- Inlocuiti momeala din statiile de momeala in care momela a fost deteriorata de apa sau contaminata de murdarie.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu aplicati acest produs direct in zonele de locuinte

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când

Amplasarea stațiilor de momeala este aproape de suprafețele de apă: canale, diguri, canale /santuri de irigație) sau sistemele de scurgere, asigurați-vă ca momeala nu este în contact cu apa.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: 24 luni

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Soareci de casă și sobolani – profesioniști instruiți - în interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulți Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulți Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulți
Domeniul de utilizare	de interior interior
Metoda (metodele) de aplicare	În cutii cu momeală - momeala gata de utilizare – stații momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite și protejate, cât timp oferă același nivel de protecție pentru speciile care nu sunt țintă și pentru oameni, ca stații fixe rezistente de momeala.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	SOARECI - 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicată : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scăzută de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanentă 60-100 gr momeala pentru punct de momeala - 0 - This page contains the following errors: error on line 1 at column 280: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error. SOARECI 20-40 gr produs pentru punct de momeala

	SOBOLANI
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Produs de momeală: unități de 20 gr Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg până la 25 kg Material de ambalare: compoziție de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilina); plastic; carton

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Îndepărtați produsul rămas la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanentă :

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului , informați orice trecători posibili (de ex. utilizatori ai zonei tratate și împrejurimilor, cu privire la campania de control a rozătoarelor.
- Luați în considerare măsurile de prevenție (de ex., găuri de intrare, îndepărtați hrana potențială și băuturile cât mai departe posibil), pentru a îmbunătăți consumul și a reduce riscul de reinvăzie.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, cautați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandărilor furnizate de codul de bună practică.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente în locurile specifice, cu un risc potențial de reinvăzie , când alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folosiți produsul pentru tratamente de pompare.

În cazul unei momeli permanente:

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Când se amplasează puncte de momeală aproape de sistemul de canalizare și scurgere , asigurați-vă ca momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft: 24 luni

Folosiți condiții specifice de depozitare și de viață a raft a produsului, în condiții normale de depozitare care nu sunt necesare , când condițiile de depozitare și viața de raft ale produsului în condiții normale de depozitare sunt implementate, așa cum este detaliat în secțiunea " Instrucții generale de utilizare (profesioniști pregătiți).

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Soareci de casa si sobolani – profesioniști instruiți - in exterior in jurul cladirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Mus musculus-House mouse-de la tineri la adulti Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti Rattus rattus-Roof rat-de la tineri la adulti
Domeniul de utilizare	în aer liber in exterior in jurul cladirilor
Metoda (metodele) de aplicare	În cutii cu momeală - momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru oameni , ca statii fixe rezistente de momeala.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	SOARECI - 20-40 gr produs pentru punct de momeala; SOBOLANI - Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala - 0 - This page contains the following errors:error on line 1 at column 287: Entity 'nbsp' not defined Below is a rendering of the page up to the first error. SOARECI 20-40 gr produs pentru punct de momeala SOBOLANI
Categoria (categoriile) de utilizatori	industrial instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Produs de momeală: unități de 20 gr Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilina); plastic; carton

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Indepartati produsul ramas, la finalul perioadei de folosire
Pentru momeala permanenta :

4.5.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului, informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil) pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.

In cazul unei momeli permanente:

4.5.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa.

4.5.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

4.5.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft:24 luni

Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea " Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Sobolani – profesionisti instruiti - in exterior zone deschise

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Rattus norvegicus-Brown rat-de la tineri la adulti

Rattus rattus- Roof rat-de la tineri la adulti

Domeniul de utilizare	<p>în aer liber</p> <p>in exterior zone deschise</p>
Metoda (metodele) de aplicare	<p>În cutii cu momeală - momeala gata de utilizare – statii momeala rezistente sau puncte de momeala acoperite si protejate , cat timp ofera acelasi nivel de protectie pentru speciile care nu sunt tinta si pentru mamen, ca statii fixe rezistente de momeala.</p>
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	<p>60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala - 0 - Infestare ridicata : 60-100 gr produs pentru punct de momeala; infestare scazuta de 40-60 gr de momeala pentru punct de momeala, Momeala permanenta 60-100 gr momeala pentru punct de momeala</p> <p>daca sunt necesare mai multe puncte de momeala, distanta minima a acestora trebuie sa fie de 5 metri.</p>
Categoria (categoriile) de utilizatori	<p>industrial</p> <p>instruiți profesional</p>
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Produs de momeală: unități de 20 gr</p> <p>Dimensiune material de ambalare: pachetele minime sunt de 1,5 kg pana la 25 kg Material de ambalare: compozitie de plastic – strat triplu (Poliester PET met/polietilna); plastic; carton</p>

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Indepartati produsul ramas la finalul perioadei de folosire:

4.6.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Unde este posibil, anterior tratamentului informati orice trecatori posibili (de ex. utilizari ai zonei tratate si imprejurimilor, cu privire la campania de control a rozatoarelor.
- Luati in considerare masurile de preventie (de ex., gauri de intrare, indepartati hrana potentiala si bauturile cat mai departe posibil) pentru a imbunatati consumul si a reduce riscul de reinvazie.
- Pentru a reduce riscul de otravire secundara, cautati si indepartati rozatoarele moarte in timpul tratamentului la intervale frecvente, conform recomandarilor furnizate de codul de buna practica.
- Produsele pot fi folosite la tratamente permanente in locurile specifice, cu un risc potential de reinvazie cand alte metode de control s-au dovedit insuficiente.
- Nu folositi produsul pentru tratamente de pompare.
- Nu aplicati produsul direct in cartiere.

In cazul unei momeli permanente:

4.6.3 În functie de modul de utilizare, particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instructiuni de prim ajutor si masuri de urgenta pentru protectia mediului

Cand se amplaseaza puncte de momeala aproape sistemul de canalizare si scurgere , asigurati-va ca momeala nu intra in contact cu apa

4.6.4 În functie de modul de utilizare instructiunile pentru eliminarea in siguranta a produsului si ambalajul acestuia

4.6.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Viata de raft:24 luni

Folositi conditii specifice de depozitare si de viata a raft a produsului, in conditii normale de depozitare care nu sunt necesare , cand conditiile de depozitare si viata de raft ale produsului in conditii normale de depozitare sunt implementate, asa cum este detaliat in sectiunea " Indicatii generale de utilizare (profesionisti pregatiti).

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

- Cititi si urmati informatiile despre produs ca si orice alte informatii care insotesc produsul sau care sunt furnizate la punctul de vanzare inainte de a-l folosi.

- realizati un sondaj, inainte de a pune momeala, asupra zonei infestate si o evaluare in acele locuri pentru a identifica speciile de rozatoare, locul lor de activitate si pentru a determina cauza si extinderea infestarii.

- Indepartati hrana , care poate fi gasita usor de rozatoare (grau imprastiat sau resturi de mancare). In afara de acest aspect, nu curatati zona infestata chiar inainte de tratament, pentru ca aceasta face ca populatia de rozatoare sa fie deranjata si , in acest caz, acceptarea momelii devine mai dificila.

- Produsul trebuie sa fie folosit ca parte a unui sistem de management al infestarii (IPM), care include printre altele, masuri de igiena si, unde este posibil, metode fizice de control.

- Luati in considerare masuri preventive (de ex. gauri de intrare, indepartati mancarea si bautura), pentru a imbunatati inghitirea produsului si pentru a reduce posibilitatea unei reinvazii. Statiile de momeala trebuie sa fie amplasate in imediata vecinatate a locurilor unde a fost observata anterior activitatea rozatoarelor (alei , locuri in care isi fac cuibul, loturi de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).

- Produsul trebuie amplasat in imediata vecinatate a locurilor in care rozatoarele au fost observate anterior, locuri unde isi au cuibul, locuri de hrana pentru animale, gauri, cartiere, etc.).

- Unde se poate, momeala trebuie asezata pe sol sau pe alte structuri.

- Momeala trebuie sa aiba o eticheta clar scrisa, ca sa se vada ca contine rodenticide si ca nu trebuie mutata sau deschisa (vezi sectiunea 5.3 pentru informatii care trebuie prezentate pe eticheta.).

- Cand produsul este folosit in zone publice, zonele tratate trebuie marcate int impul perioadei tratamentului si trebuie sa existe o notificare , care sa explice riscul de otravire primara sau secundara prin natioagulant, ca si sa se indice primele masuri care trebuie luate in caz de otravire, care sa fie disponibile impreuna cu momeala.

- Momeala trebuie sa fi securizata, incat sa nu poata fi trasa din statia de momeala.

- Amplasati produsul incat sa nu poata fi atins de copii, pasari, animale de companie si animale de ferma si alte animale care nu sunt tinta.

- Amplasati produsul departe de hrana pentru consum, bauturi si hrana pentru animale, ca si departe de ustensile sau suprafete care intra in contact cu acestea.

- Purtati manusi de protectie rezistente la substante chimice (cauciuc) in timpul manuirii produsului.

- Cand folositi produsul, nu mancati, nu beti si nici nu fumati. Spalati-va pe maini si pe pielea direct expusa , dupa ce ati folosit produsul.

- Frecventa vizitelor in zonele tratate trebuie sa fie la discretia operatorului, conform sondajelor efectuate la inceputul tratamentului. Aceasta frecventa trebuie sa fie conforma cu recomandarile furnizate de codul valabil de buna practica.

- Daca ingerarea momelii este scazuta , fata de dimensiunea aparenta a infestarii, considerati inlocuirea punctelor de momeala in alte locuri si posibilitatea de a schimba formula momelii.

- Daca dupa o perioada de 35 de zile de tratament , momeala continua sa fie consumata si activitatea rozatoarelor nu este micsorata, atunci trebuie stabilita cauza. Daca se exclud alte elemente , se pare ca rozatoarele sunt rezistente si trebuie luat in considerare un rodenticid non-anticoagulant, acolo unde se poate, sau se va folosi un rodenticid mai puternic. De asemenea, considerati folosirea de capcane ca o alterantiva a masurii de control.

- Indepartati momeala care ramane in statiile de momeala dupa terminarea tratamentului.

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Produsul contine substante anticoagulante, daca sunt ingerate, simptomele, care pot fi intarziate, includ sangerari nazale si ale gingiilor. In cazuri severe, pot aparea invinetirea si aparitia sangelui in materiile fecale si in urina.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La finalul tratamentului, aruncati momeala, care nu a fost consumata, si ambalajul, conform cerintelor locale.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Depozitati într-un loc uscat, racoros si bine ventilat. Tineti containerul inchis si departe de lumina directa a soarelui.
Depozitati in locuri departe de accesul copiilor, pasarilor, animalelor de companie si animalelor de ferma.
Viata de raft: 24 de luni.

6. Alte informații

Din cauza modului tarziu de actionare, rodenticidul anticoagulant poate dura de la 4 la 10 zile ca sa fie eficient dupa consumul efectiv al momelii.
Rozatoarele sunt purtatoare de boli. Un atingeti rozatoarele moarte cu mainile goale, folositi manusi sau folositi unelte, cum sunt clestii, cand le aruncati.
Produsul contine un agent amar si o vopsea.