



**NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS
PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS**

**BIOCIDINIO PRODUKTO AUTORIZACIJOS
LIUDIJIMAS Nr. (10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28)**

Išduotas 2019 m. sausio 30 d., galioja iki 2023 m. vasario 15 d.

Asmens, kuriam išduotas liudijimas, pavadinimas, adresas

Rentokil Initial Limited, Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).

Biocidinio produkto tipas

14 produktų tipas. Rodenticidas.

Biocidinio produkto pavadinimas

Talon Soft.

Biocidinio produkto gamintojo pavadinimas, adresas

Rentokil Initial Supplies, Webber Road, UK - L33 7SR Liverpool (Jungtinė Karalystė).

Veikliųjų medžiagų pavadinimai, CAS ir EB numeriai

Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5.

Specialiosios autorizacijos sąlygos

Tik profesionaliesiems vartotojams. Negali būti naudojamas augalų auginimo vietose (žemės ūkio paskirties laukuose, šiltnamiuose, miškuose) augalams ir augaliniams produktams apsaugoti. Kitos specialiosios autorizacijos sąlygos pateikiamos šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto ženklিনimas

Privaloma biocidinio produkto ženklিনimo informacija pateikiama šio liudijimo priede.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo paieškos nuoroda

A14PAP503030/A.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo Nr. UK-2015-0910 (DOC. 2017/380511) suderintos charakteristikų santraukos pripažinimas.

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-13382(A-14PAP573030-18-123) panaikinamas. Biocidiniai produktai, kurių ženklিনime nurodytas biocidinių produktų autorizacijos Nr. (10-14 17.5)BSV-13382(A-14PAP573030-18-123) su atitinkamais pakeitimais, gali būti tiekiami rinkai iki 2019 m. liepos 28 d. ir naudojami iki 2020 m. sausio 24 d.

Vilniaus departamento direktorė

A.V.

Rolanda Lingienė

Liudijimą gavau

Biocidinio produkto autorizacijos liudijimo
Nr. (10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28)
priedas

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Talon Soft

14 produkto tipas – Rodenticidai (kenkėjų kontrolė)

Autorizacijos liudijimo numeris:
(10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28)

R4BP objekto numeris: LT-0008135-0000

1. ADMINISTRACINĖ INFORMACIJA

1.1. Produkto prekinis (-iai) pavadinimas (-ai)

| | |
|----------------------|------------|
| Prekinis pavadinimas | Talon Soft |
|----------------------|------------|

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

| | | |
|---|---|---|
| Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas | Pavadinimas | Rentokil Initial Limited |
| | Adresas | Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija). |
| Autorizacijos liudijimo numeris | (10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28) | |
| <i>R4BP objekto numeris</i> | LT-0008135-0000 | |
| Autorizacijos liudijimo data | 2019-01-30 | |
| Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data | 2023-02-15 | |

1.3. Produkto gamintojas (-ai)

| | |
|-----------------------|---|
| Gamintojo pavadinimas | Rentokil Initial Supplies |
| Gamintojo adresas | Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside, L33 7SR Liverpool Jungtinė Karalystė |
| Gamybos vieta | Webber Road, Knowsley Industrial Park, Kirkby, Merseyside, L33 7SR Liverpool Jungtinė Karalystė |

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

| | |
|-----------------------|--|
| Veiklioji medžiaga | Brodifakumas |
| Gamintojo pavadinimas | Syngenta Crop Protection AG |
| Gamintojo adresas | Schwarzwaldallee 215, CH-4002 Basel Šveicarija |
| Gamybos vieta | BASF plc., Lower Road, Halebank, WA8 8NS Widnes Jungtinė Karalystė |

2. PRODUKTO SUDĖTIS IR FORMULIACIJOS TIPAS

2.1. Kiekybinė ir kokybinė informacija apie produkto sudėtį

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|------------|----------------|
| Brodifakumas | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)- | Veiklioji medžiaga | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0.005 |

| Bendrasis pavadinimas | IUPAC pavadinimas | Funkcinė paskirtis | CAS numeris | EB numeris | Kiekis (proc.) |
|-----------------------|--|--------------------|-------------|------------|----------------|
| | 1,2,3,4-tetrahydro - 1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | | | | |

2.2. Formuliacijos tipas

PA - Pasta

3. PAVOJINGUMO IR ATSARGUMO FRAZĖS

| | |
|-------------------------|---|
| Piktogramos | GHS 08 |
| Signalinis žodis | Pavojinga |
| Pavojingumo kategorijos | Toksinis poveikis reprodukcijai (1A, 1B pavojaus kategorija) Specifinis toksiškumas konkrečiam organui (kartotinis poveikis) (2 pavojaus kategorija) |
| Pavojingumo frazės | Gali pakenkti negimusiam kūdikiui. Gali pakenkti organams (kraujas) jeigu medžiaga veikia ilgai arba kartotinai .. |
| Atsargumo frazės | Prieš naudojimą gauti specialias instrukcijas. Nenaudoti, jeigu neperskaityti ar nesuprasti visi saugos įspėjimai. Esant sąlyčiui arba jeigu numanomas sąlytis: Kreiptis į gydytoją. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją. Laikyti užrakintą. turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius reglamentus. |

4. AUTORIZUOTAS (-I) NAUDOJIMAS (-AI)

4.1. Naudokite aprašymą

Lentelė 1. Naudojimas 1 – 1 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Parengti profesionalūs naudotojai – Viduje

| | |
|--|--|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijos) | Mus musculus House mouse suaugusiems ir jauniklius |

| | |
|--|--|
| | Rattus norvegicus Brown rat suaugusiems ir jauniklius |
| Naudojimo sritis | vidaus Viduje |
| Naudojimo metodas (-ai) | Jauko formos Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Jauko produktai: - Pelėms: esant dideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. Žiurkėms: esant dideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. |
| Vartotojų kategorija (-os) | Apmokytas profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg. |

4.1.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.1.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, kenkėjų naikinimo laikotarpiu, stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, laikydamiesi atitinkamos gerosios

praktikos. Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

4.1.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.1.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. Skyrių 5.4 Parengti profesionalūs naudotojai

4.1.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. Skyrių 5.5

4.2. Naudokite aprašymą

Lentelė 2. Naudojimas 2 – 2 naudojimo būdas– Pelės ir (arba) žiurkės – Parengti profesionalūs naudotojai – Lauke prie pastatų

| | |
|--|--|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | Mus musculus House mouse suaugusiems ir jauniklius Rattus norvegicus Brown rat suaugusiems ir jauniklius |
| Naudojimo sritis | lauko Lauke aplink pastatus |
| Naudojimo metodas (-ai) | Jauko formos Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. Uždengtose ir apsaugotose masalo vietose. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | Jauko produktai: - Pelėms: |

| | |
|---------------------------------------|---|
| | <p>esant dideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m.</p> <p>esant nedideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.</p> <p>Žiurkėms:</p> <p>esant dideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m.</p> <p>esant nedideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m.</p> |
| Vartotojų kategorija (-os) | Apmokytas profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg. |

4.2.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo įvairių oro sąlygų. Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Jei išdėliotą masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite produkto likučius.

Masalo vietas turi būti uždengtos ir išdėstytos tokiose vietose, kad sumažintų masalo poveikį gyvūnų rūšims, kurioms jis neskirtas.

Laikykitės visų papildomų instrukcijų, remiantis atitinkama gerąją praktiką.

4.2.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

-

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Siekiant sumažinti antrinio apsinuodijimo riziką, kenkėjų naikinimo laikotarpiu, stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus, laikydamiesi atitinkamos gerosios praktikos.

Nenaudokite masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Šis produktas nėra tinkamas naudojimui su pertraukomis (kas kelias dienas).

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.2.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį,*

pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.2.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. Skyrių 5.4 Tik parengtiems profesionaliems naudotojams

4.2.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. Skyrių 5.5

4.3. Naudokite aprašymą

Lentelė 3. Naudojimas 3 – 3 naudojimo būdas – Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Viduje

| | |
|--|---|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | Mus musculus House mouse Adults and juveniles Rattus norvegicus Brown rat Adults and juveniles |
| Naudojimo sritis | vidaus Viduje |
| Naudojimo metodas (-ai) | - Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse. |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | - - Pelėms: esant dideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. Žiurkėms: esant dideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliame paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Vartotojų kategorija (-os) | Profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg. |

4.3.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

4.3.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Žr. Skyrių 5.2 Profesionalūs naudotojai

4.3.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite įrengti masalo vietą šalia vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.3.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. Skyrių 5.4 Profesionalūs naudotojai

4.3.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. Skyrių 5.5

4.4. **Naudokite aprašymą**

Lentelė 4. Naudojimas 4 – 4 naudojimo būdas– Naminės pelės ir (arba) žiurkės – Profesionalūs naudotojai – Lauke prie pastatų

| | |
|--|----------------------|
| Produkto tipas | PT 14 - Rodenticidai |
| Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas | Graužikams netaikoma |

| | |
|--|---|
| Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas) | Mus musculus House mouse Adults and juveniles Rattus norvegicus Brown rat Adults and juveniles |
| Naudojimo sritis | lauko Lauke prie pastatų |
| Naudojimo metodas (-ai) | -- Paruoštas naudojimui masalas, skirtas naudoti nesugadinamose ir saugiose masalo dėžutėse |
| Taikymo koeficientas (-ai) ir dažnumas | - - Pelėms: esant dideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliam paplitimui naudoti 8 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. Žiurkėms: esant dideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 5 m. esant nedideliam paplitimui naudoti 50-200 g. vienoje masalo vietoje kas 10 m. |
| Vartotojų kategorija (-os) | Profesionalas |
| Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga | Masalas 300 g didelio tankio polietileno (HDPE) kasetėje, kuri naudojama su paskirstymo švirškštu 3 - 10 kg. |

4.4.1. *Specifinės naudojimo instrukcijos*

Saugokite masalą nuo įvairių oro sąlygų (pvz., lietus, sniegas ir t. t.). Išdėliokite masalo dėžutes, tokiose vietose, kurių negalėtų užtvindyti vanduo.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 2–3 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Masalo dėžutės turėtų būti tikrinamos tik 5–7 dienos po to, kai padedamas masalas, o vėliau ne rečiau kaip kartą per savaitę, patikrinant, ar yra masalo, ar masalo dėžutės nepažeistos, bei surenkant kritusius graužikus. Papildykite dėžutes masalu, jei reikia.

Jei masalo dėžutėje esantį masalą sugadino vanduo ar purvas, pakeiskite jį nauju.

4.4.2. *Specifinės rizikos valdymo priemonės*

Nedėkite šio produkto tiesiai į graužikų urvus.

4.4.3. *Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką*

Jei norite išdėlioti masalą šalia paviršinių vandens telkinių (pvz., upių, tvenkinių, vandens kanalų, užtvankų, žemės drėkinimo griovių) ar vandens drenažo sistemos, įsitikinkite, kad bus išvengta masalo kontakto su vandeniu.

4.4.4. *Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos*

Žr. Skyrių 5.4 Profesionalūs naudotojai

4.4.5. *Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis*

Žr. Skyrių 5.5

5. BENDRIEJI NAUDOJIMO NURODYMAI¹

5.1. Naudojimo instrukcijos

Parengti profesionalūs naudotojai

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymusi ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

¹ Šiame skirsnyje pateiktos naudojimo instrukcijos, rizikos mažinimo priemonės ir kiti naudojimo nurodymai galioja bet kuriam autorizuotam naudojimui.

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojamas viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo išstempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo maisto, ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių

Naudodami produktą, mūvėkite apsaugines, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (autorizacijos liudijimo turėtojas pridedamoje informacijoje turi aiškiai nurodyti iš ko turi būti pagamintos pirštinės).

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Kenkėjų naikinimo specialistas, atsižvelgdamas į pradžioje atliktą situacijos įvertinimą, nusprendžia, kaip dažnai tikrinti kenkėjų paplitimo vietą ir masalo vietas. Tikrinimo dažnumas turi būti nustatytas pagal atitinkamą gerąją praktiką.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo naudojimo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Naudokitės mentele nuvalant, šalinant masalą.

Profesionalūs naudotojai

Prieš perkant ar pradėdami naudoti produktą, perskaityti visą su produktu susijusią pateiktą informaciją.

Prieš pradėdami naudoti masalą, išstirkite kenkėjų paplitimo vietą ir atlikite joje patikrinimus, kad išsiaiškintumėte graužikų rūšį, jų didžiausio aktyvumo vietas, paplitimo priežastį ir mastą.

Pašalinkite graužikams pasiekiamą ir prieinamą maistą (pvz., išpiltus grūdus ar maisto atliekas). Prieš pradėdami naikinimą, nevalykite kenkėjais užkrėstų vietų - tai tik sutrikdys graužikų populiaciją ir sumažins masalo suvartojimą.

Produktą rekomenduojama naudoti tik kaip vieną iš galimų integruotos kenkėjų kontrolės metodų, derinamų su higienos reikalavimų laikymu ir, jei įmanoma, fizinėmis kontrolės priemonėmis.

Siekdami užtikrinti produkto suvartojimą ir sumažinti kenkėjų invazijos atsinaujinimo tikimybę, apsvarstykite visas galimas prevencines kontrolės priemones (pvz., užkimškite visas angas, pašalinkite visus maisto bei gėrimų likučius).

Įrenkite masalo dėžutes šalia tų vietų, kuriose esate pastebėję graužikus (pvz., prie kenkėjų takų, lizduose, ūkiuose, įvairiose pastatų angose, urvuose ir pan.).

Jei įmanoma, masalo dėžutės turėtų būti pritvirtintos prie žemės ar kitų statinių.

Masalo dėžutės turi būti aiškiai pažymėtos, kad jų viduje esantis produktas yra rodenticidas ir, kad masalo dėžutę draudžiama judinti ar atidaryti (informacija nurodyta 5.3 punkte turi būti pateikta etiketėse).

Tais atvejais, kai produktas naudojama viešose vietose, atitinkamos vietos turi būti pažymėtos įspėjamaisiais ženklais, o prie masalo turi būti pateikiamas informacinis pranešimas, kuriame būtų nurodytos pirminio ar antrinio apsinuodijimo antikoaguliantais pasekmės bei pirmosios pagalbos priemonės, kurių būtina imtis apsinuodijimo atveju.

Masalas turi būti pritvirtintas taip, kad graužikai negalėtų jo ištempti iš masalo vietos.

Įrenkite masalo vietas vaikams, paukščiams, naminiams gyvūnams, gyvuliams ir kitiems gyvūnams nepasiekiamoje vietoje.

Įrenkite masalo vietas atokiau nuo ėdesio, gėralo ar šėrimo vietų, taip pat atokiau nuo visų su šiomis vietomis susijusių reikmenų ar paviršių.

Produkto naudojimo metu nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. Po produkto naudojimo nusiplaukite rankas ir kitas nepridengtas kūno vietas.

Jei masalo sunaudojimas, palyginti su paplitimo mastu, yra ganėtinai mažas, rekomenduojama pakeisti masalo vietas ir apsvarstyti kitokios sudėties masalo naudojimą.

Jei po 35 dienų nuo kenkėjų naikinimo pradžios graužikai vis dar ėda masalą, o jų aktyvumas taip ir nesumažėjo, būtina nustatyti galimą to priežastį. Jei atmetėte visas galimas priežastis, tikėtina, kad kai kurie graužikai tapo atsparūs. Tokiu atveju, jei yra galimybė, rekomenduojama naudoti ne antikoaguliantų pagrindu pagamintus arba stipresnius rodenticidus. Taip pat apsvarstykite galimybę naudoti spąstus, kaip alternatyvią kontrolės priemonę.

Baigę naikinti kenkėjus, pašalinkite masalo likučius ir visas likusias masalo dėžutes.

Naudokitės mentele nuvalant, šalinant masalą.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Parengti profesionalūs naudotojai

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina aiškiai nurodyti, kad produktas skirtas kvalifikuotiems profesionaliesiems vartotojams: juridiniams ar fiziniams asmenims, turintiems visuomenės sveikatos priežiūros veiklos licenciją verstis kenkėjų kontrole (dezinsekcija, dezinfekcija, deratizacija).

Nenaudokite produkto tose vietose, kuriose tikėtinas atsparumas veikliajai medžiagai.

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienai, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite kelių skirtingo stiprumo ar kelių silpnesnių antikoagulantų kaip atsparumo reguliavimo priemonės. Jei norite pakeisti produktą, naudokite rodenticidus, kurių sudėtyje nėra antikoagulantų, arba stipresnio poveikio antikoagulantinius rodenticidus.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių ar kitų įrankių, naudojamų uždengtose ir apsaugotose masalo vietose.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Profesionalūs naudotojai

Jei įmanoma, prieš pradėdami naikinti graužikus, praneškite apie tai visiems pašaliniam asmenims, esantiems graužikų naikinimo vietoje ir aplinkinėse teritorijose.

Siekdami apsaugoti kitus gyvius nuo antrinio apsinuodijimo, kenkėjų naikinimo laikotarpiu stenkitės kuo dažniau rasti ir pašalinti visus kritusius graužikus (bent du kartus per savaitę).

Produktas neturėtų būti naudojamas ilgiau nei 35 dienai, prieš tai neįvertinus likusios graužikų populiacijos masto bei priemonės veiksmingumo.

Nenaudokite antikoagulantinio masalo graužikų aktyvumo stebėjimui ar kaip nuolatinės prevencinės priemonės.

Produkto etiketėje ar informaciniame lapelyje būtina nurodyti tokią informaciją:

- Produktas nėra skirtas neprofesionaliems vartotojams (pvz. „tik profesionaliesiems vartotojams“).

Šis produktas graužikus išnaikina maždaug per 35 dienas. Šio produkto etiketėje arba informaciniame lapelyje turi būti pateiktos rekomendacijos, kad tuo atveju, jei naikinimo programos pabaigoje produktas pasirodė esantis nepakankamai veiksmingas (t. y. vis dar pastebimi aktyvūs graužikai), naudotojas turėtų kreiptis į produkto tiekėją arba susisiekti su kenkėjų kontrolės tarnyba.

Masalo naudojimo laikotarpiu neplaukite masalo dėžučių.

Pašalinkite kritusius graužikus laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Sudėtyje yra antikoagulantinių medžiagų. Prarijus – iškart arba vėliau gali pasireikšti tokie simptomai kaip kraujuojanti nosis ar dantenos. Rimtais atvejais ant kūno gali atsirasti mėlynės, o išmatose arba šlapime gali pasirodyti kraujas.

Priešnuodis: vitaminas K1, paskirtas tik kvalifikuoto gydytojo/ veterinaro.

- Po kontakto su oda - iš pradžių nuplaukite odą vandeniu, o tada nuplaukite muilu ir vandeniu.

- Patekus į akis - visuomet pasitikrinkite ir išsiimkite kontaktinius lęšius, skalaukite akis akių skalavimui skirtu skysčiu arba vandeniu, bent 10 minučių pabūkite atmerktomis akimis.

- Patekus į burną - atsargiai praskalaukite burną su vandeniu. Niekada nedėkite nieko į sąmonę praradusio žmogaus burną. Neskatininkite vėmimo. Prariję, nedelsdami kreipkitės į gydytoją ir parodykite jam produkto pakuotę ar etiketę. Jei produktą prarijo augintis, kreipkitės į veterinarą chirurgą.

Ant masalo dėžučių būtina nurodyti tokią informaciją: "nejudinti ir neatidarinėti"; "pakuotės viduje yra rodenticidų"; "nelaimingo atsitikimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą tel. (8 5) 236 2052, mob. 8687 53 378, faksas 8~5 236 21 42, el. paštas akib@sam.lt."; taip pat nurodyti produkto pavadinimą ir autorizacijos numerį, veikliąsias medžiagas.

Produktas pavojingas laukiniams gyvūnams.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Baigę naikinti kenkėjus, išmeskite nesunaudotą masalą ir pakuotę laikantis LR Atliekų tvarkymo įstatymo ir kitų teisės aktų.

Atliekų tvarkymo reikalavimai: laikantis atliekų hierarchijos nustatytųjų prioritetų, pirmiausia turi būti vengiama atliekų susidarymo ir taikomos kitos atliekų prevencijos priemonės, o atliekos, kurių neįmanoma išvengti, paruošiamos pakartotiniam naudojimui, perdirbamos ar kitaip naudojamos tokiais būdais, kad kuo mažiau jų būtų šalinama sąvartynuose ir kituose atliekų šalinimo įrenginiuose.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Laikykitė sausoje, vėsioje ir gerai vėdinamoje vietoje. Pakuotė turi bŭti sandariai uždaryta ir laikoma atokiau nuo tiesioginiŭ saulės spinduliŭ.

Laikykitė vaikams, paukšėiams, naminiams augintiniams bei gyvuliams nepasiekiamoje vietoje.

6. KITA INFORMACIJA

Antikoagulantŭ veikimo laikas yra ganėtinai ilgas - grauŭikui prarijus masalą, jis pradeda veikti tik po 4 – 10 dienŭ.

Grauŭikai yra potencialŭs ligŭ platintojai. Nelieskite negyvŭ grauŭikŭ plikomis rankomis - dėvėkite pirštines arba naudokite specialius įrankius (ŭnyples).

Šio produkto sudėtyje yra daŭŭ ir karėiŭjŭ medŭziagŭ.

Etiketėje turi bŭti nurodoma:

Sudėtis: Brodifakumas, CAS Nr. 56073-10-0, EB Nr. 259-980-5, 0,005 %.

Partijos numeris:

Tinkamumo laikas iki (12 mėnesiŭ nuo pagaminimo datos):

Pakuotė (kg/g):

Gamintojas: Rentokil Initial Supplies, Webber Road, UK - L33 7SR Liverpool (Jungtinė Karalystė).

Liudijimas išduotas:

Rentokil Initial Limited, Hazel House, Millenium Park, Naas, Co Kildare (Airija).

Biocidinio produkto autorizacijos

liudijimas Nr. (10-14 17.5)BSV-2095(A-14PAP503030/A-19-28), galioja iki 2023-02-15.