



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E, DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO
Ufficio 1 – Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Classif: I.5.i.d.2/373

Allegati: 1 decreto + 2 allegati

Ministero della Salute

0033437-P-14/06/2018-DGDMF-MDS-P

DGDMF

0033437-P-14/06/2018

I.5.i.d.2/2012/373



285351213

SPETT.LE
BLEU LINE S.r.l.
Via Virgilio 28
Zona Industriale Villanova
47122 FORLÌ

**OGGETTO: Prodotto biocida BRODIBLEU PASTA
Trasmissione decreto di rinnovo.**

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del biocida indicato in oggetto n. IT/2014/00228/AUT.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
Dr.ssa Paola D'Alessandro

Referente tecnico: Raffaella Perrone – 06.5994 2520
email: r.perrone@sanita.it
F.G.



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

UFFICIO I ex DGDFM- Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO I

I.5.i.d.2/373

VISTA la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

VISTA la Direttiva 2010/10/UE della Commissione del 9 febbraio 2010 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

VISTO il Regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

VISTO in particolare, l'articolo 31 del regolamento n. 528/2012 relativo al rinnovo delle autorizzazioni nazionali;

VISTO il decreto direttoriale dell'8 settembre 2014 e successive modificazioni, con il quale è stato autorizzato con il numero di autorizzazione IT/2014/00228/AUT il prodotto biocida denominato BRODIBLEU PASTA di cui è titolare la società Bleu Line S.r.l., con sede legale in Via Virgilio, 28, Z.I. Villanova, 47122, Forlì;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del brodifacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14;

VISTA l'istanza di rinnovo BC-TQ018519-10;

DECRETA

La registrazione del biocida denominato BRODIBLEU PASTA, autorizzazione numero IT/2014/00228/AUT – ASSET NUMBER IT-0006690-0000 è rinnovata fino al 31 dicembre 2022.

E' approvato e fa parte integrante del presente decreto il sommario delle caratteristiche del prodotto (**allegato 1**).

Si allega copia delle etichette. Le modifiche a tali etichette non rientranti tra quelle indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013, possono essere apportate dalla società titolare autonomamente e sotto la propria responsabilità. (**allegato 2**).

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla società interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, 12 GIU. 2018

IL DIRETTORE DELL' UFFICIO I
(Dr.ssa Paola D'Allesandro)



1. Administrative information

1.1. Trade names of the product

Market area Trade name(s)
Italy BRODIBLEU PASTA

1.2. Authorisation holder

Authorisation number

Not defined

Date of the authorisation

Not defined

Expiry date of the authorisation

Not defined

Name and address of the authorisation holder Name Address Not defined
Not defined

1.3. Manufacturers of the product

Name of the manufacturer BLEU LINE S.r.l.
Address of the manufacturer Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) Italy
Location of manufacturing sites FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - C/da Ripoli 64023 Mosciano S Angelo (TE) Italy
INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia, 25 35020 Arre (PD) Italy
UNICHEM d.o.o. - Sinja Gorica 2 SI-1360 Vrhnika Slovenia
BIOSOL ITALIA S.r.l.s. - Via Nettunense Km 23,400 04011 Aprilia (LT) Italy
SELECTA S.r.l. (packaging operations only) - Via Tacito, 9 20094 Corsico (MI) Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

BAS number: 11

Name of the manufacturer Acliva S.r.l.

Address of the manufacturer Via Feltre, 32 20132 Milano Italy

Location of manufacturing sites Dr Tezza S.r.l. - Via Tre Ponti, 22 37050 S.Maria di Zevio (VR) Italy

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

BAS number	EC number	CAS number	Common name	IUPAC name	Function	Content (%)
11	259-980-5	56073-10-0	Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Active Substance	0.005
-			Denatonium benzoate		Bittering agent	0.001

2.2. Type of formulation

RB - Bait (ready for use)

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements May damage the unborn child.
May cause damage to organs (*blood*) through prolonged or repeated exposure.

Precautionary statements Keep out of reach of children.

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

Wear protective gloves.

IF exposed or concerned: Get medical advice.

Dispose of contents to special waste in accordance with national regulations.

4. Authorised use(s)

4.1. House mice - professional - indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides.		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	Indoor Industrial, Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations		
Rate:	40 g of bait per bait point. If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
Dilution:	0%		
Timing:	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
Pack sizes and packaging material	Bait product of 20 g units		
	1,5-3-5-10-20-25 kg		
	Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg		
	Packaging material: Plastic composite-triple layer (polyester/PET met/polyethylene)		
Type of packaging			
Size/Volume of the packaging			
Material of the packaging			
Type and material of closure(s)			
Compatibility of the product with the proposed packaging material (Yes/No)			
Labelled or printed			
Bottle			
1,5-3-5 kg			
Plastic composite (HDPE)			
Bottle			
sealed			
Yes			
Labelled or printed Bag/Sack			
1,5-3-5-10-20-25 kg			
Plastic composite			
Prefabricated bags or			
serial production bags, both thermal welded			
Yes			
Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner			
1,5-3-5-10 kg – max size			
inner liner 10 kg			
Plastic composite			
Prefabricated bags or			
serial production bags, both thermal welded			
Yes			
Labelled plastic Bucket			
1,5-3-5-10-20-25 kg			
Labelled plastic (HDPE) Bucket			
Rectangular or truncated cone bucket sealed			
Yes			
Labelled plastic Bucket- with inner plastic liner			
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg			
Labelled plastic (HDPE) Bucket			
Rectangular or truncated cone bucket			
sealed			
Yes			

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner
 1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each
 Carton+plastic composite
 Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded
 Yes

Labelled or printed
 Cardboard with inner plastic liner
 1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each
 Carton+plastic composite
 Prefabricated cardboard
 Yes

4.1.1. Use-specific instructions for use

The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Use-specific risk mitigation measures are not necessary when risk mitigation measures, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months.

4.2. Rats - professional - indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides.		
Field(s) of use	Indoor Indoor		
Category(ies) of users	Industrial, Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations		
Rate:	60-100 g of bait per bait point. If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
Dilution:	0%		
Timing:	If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
Pack sizes and packaging material	Bait product of 20 g units		

1,5-3-5-10-20-25 kg

Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg

Packaging
material: Plastic composite-triple layer (polyester/PET
met/polyethylene)

Type of packaging

**Size/Volume of the
packaging**

Material of the packaging

**Type and material
of closure(s)**

**Compatibility of the product with the proposed
packaging material (Yes/No)**

Labelled or printed Bottle
1,5-3-5 kg
Plastic composite (HDPE)
Bottle sealed
Yes

Labelled or printed Bag/Sack
1,5-3-5-10-20-25
kg
Plastic composite
Prefabricated bags or serial production
bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed Bag/Sack-
with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10
kg
Plastic composite
Prefabricated bags or serial production
bags, both thermal welded
Yes

Labelled plastic
Bucket

1,5-3-5-10-20-25 kg

Labelled plastic (HDPE) Bucket

Rectangular or truncated cone bucket sealed

Yes

Labelled plastic Bucket- with
inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg
Labelled plastic (HDPE) Bucket
Rectangular or truncated cone bucket
sealed
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic
inner liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg
each
Carton+plastic composite
Prefabricated bags or serial
production bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed
Cardboard with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic
bags of up to 10 kg each
Carton+plastic composite
Prefabricated cardboard
Yes

4.2.1. Use-specific instructions for use

The
bait stations should be visited only 5 to 7 days at the beginning of the
treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is
accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait
when necessary.

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

Use-specific
risk mitigation measures are not necessary when risk mitigation measures, as
detailed in the section "General directions for use (professionals)", are
implemented.

4.2.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When
placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact
with water is avoided.

4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use
specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not
necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging,
as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are
implemented.

4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage**Use**

specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months.

4.3. House mice and rats - professional - outdoor around buildings

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)												
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides.												
Field(s) of use	Outdoor Outdoor around buildings												
Category(ies) of users	Industrial, Professional												
Target organisms	<table border="0"> <thead> <tr> <th>Scientific name</th> <th>Common name</th> <th>Development stage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Mus musculus</td> <td>House mouse</td> <td>Juveniles to adults</td> </tr> <tr> <td>Rattus norvegicus</td> <td>Brown rat</td> <td>Juveniles to adults</td> </tr> <tr> <td>Rattus rattus</td> <td>Roof rat</td> <td>Juveniles to adults</td> </tr> </tbody> </table>	Scientific name	Common name	Development stage	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
Scientific name	Common name	Development stage											
Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults											
Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults											
Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults											
Application method(s)													
Method	Bait application												
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations.												
Rate:	House mouse: 40 g of bait per bait point. Rats: 60-100 g of bait per bait point. If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.												
Dilution:	0%												
Timing:	If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters												
Pack sizes and packaging material	Bait product of 20 g units												
1,5-3-5-10-20-25 kg													
Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg													
Packaging material: Plastic composite-triple layer (polyester/PET met/polyethylene)													
Type of packaging													
Size/Volume of the packaging													
Material of the packaging													
Type and material of closure(s)													
Compatibility of the product with the proposed packaging material (Yes/No)													
Labelled or printed Bottle													
1,5-3-5 kg													
Plastic composite (HDPE)													
Bottle sealed													
Yes													
Labelled or printed Bag/Sack													
1,5-3-5-10-20-25 kg													
Plastic composite													
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded													
Yes													
Labelled or printed Bag/Sack with inner plastic liner													
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg													
Plastic composite													
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded													
Yes													
Labelled plastic Bucket													
1,5-3-5-10-20-25 kg													
Labelled plastic (HDPE) Bucket													
Rectangular or truncated cone bucket sealed													
Yes													

Labelled plastic Bucket- with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg
Labelled plastic (HDPE) Bucket
Rectangular or truncated cone bucket
sealed
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each
Carton+plastic composite
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each
Carton+plastic composite
Prefabricated cardboard
Yes

4.3.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions (e.g. rain, snow, etc.). Place the bait stations in areas not liable to flooding.
- The bait stations should be visited [for mice - at least every 2 to 3 days at] [for rats - only 5 to 7 days after] the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.
- Replace any bait in a bait station in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

Do not apply this product directly in the burrows.

4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait stations close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months.

4.4. House mice and rats - trained professionals - indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides.		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	Trained professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description			

Ready-to-use
bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected
baiting points as long as they provide the same level of protection for
non-target species and humans as tamper-resistant bait station.

Rate: Rats:-High
infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait
per baiting point. Mice: 40 g of bait per baiting
point.

Dilution: 0%

Timing: Rats:-High
infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait
per baiting point. Mice: 40 g of bait per baiting point

Pack sizes and packaging material Bait product of 20 g
units

1,5-3-5-10-20-25 kg

Where applicable, package is restricted
to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg

Packaging
material: Plastic composite-triple layer (polyester/PET
met/polyethylene)

Type of packaging

**Size/Volume of the
packaging**

Material of the packaging

**Type and material
of closure(s)**

**Compatibility of the product with the proposed
packaging material (Yes/No)**

Labelled or printed Bottle
1,5-3-5 kg
Plastic composite (HDPE)
Bottle sealed
Yes

Labelled or printed Bag/Sack
1,5-3-5-10-20-25
kg
Plastic composite
Prefabricated bags or serial production
bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed Bag/Sack-
with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10
kg
Plastic composite
Prefabricated bags or serial production
bags, both thermal welded
Yes

Labelled plastic
Bucket

1,5-3-5-10-20-25 kg

Labelled plastic (HDPE) Bucket

Rectangular or truncated cone bucket sealed

Yes

Labelled plastic Bucket- with
inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg
Labelled plastic (HDPE) Bucket
Rectangular or truncated cone bucket
sealed
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic
inner liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg
each
Carton+plastic composite
Prefabricated bags or serial
production bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed
Cardboard with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic
bags of up to 10 kg each
Carton+plastic composite
Prefabricated cardboard
Yes

4.4.1. Use-specific instructions for use

Remove
the remaining product at the end of treatment period

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign

- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvansion.

- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.

- Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.

- Do not use the product in pulsed baiting treatments.

4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When
placing bait points close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use
specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Use
specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

Shelf life 24 months.

4.5. Mice and rats - trained professionals - outdoor around buildings

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides.		
Field(s) of use	Outdoor Outdoor around buildings.		
Category(ies) of users	Trained professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait station.		
Rate: baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait per baiting point.	Rats:- High infestation: 100 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait per baiting point.		
Dilution:	0%		
Timing:	Rats:- High infestation. 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait per baiting point.		
Pack sizes and packaging material	Bait product of 20 g units 1,5-3-5-10-20-25 kg		

Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg

Packaging material: Plastic composite-triple layer (polyester/PET met/polyethylene)

Type of packaging

Size/Volume of the packaging

Material of the packaging

Type and material of closure(s)

Compatibility of the product with the proposed packaging material (Yes/No)

Labelled or printed Bottle
1,5-3-5 kg
Plastic composite (HDPE)
Bottle sealed
Yes

Labelled or printed Bag/Sack
1,5-3-5-10-20-25 kg
Plastic composite
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg
Plastic composite
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded
Yes

Labelled plastic Bucket
1,5-3-5-10-20-25 kg

Labelled plastic (HDPE) Bucket

Rectangular or truncated cone bucket sealed

Yes

Labelled plastic Bucket- with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg
Labelled plastic (HDPE) Bucket
Rectangular or truncated cone bucket sealed
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each
Carton+plastic composite
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded
Yes

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each
Carton+plastic composite
Prefabricated cardboard
Yes

4.5.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions. Place the baiting points in areas not liable to flooding.

- Replace any bait in baiting points in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.

- Remove the remaining product at the end of treatment period.

For application in covered and protected bait points:

- For outdoor use, baiting points must be covered and placed in strategic sites to minimise the exposure to non-target species

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign.

- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.

- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.

- Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.

- Do not use the product in pulsed baiting treatments.

- Do not apply this product directly in the burrows.

4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait points close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months.

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

For professionals:

- Read and follow the product information as well as any information accompanying the product or provided at the point of sale before using it.

- Carry out a pre-baiting survey of the infested area and an on-site assessment in order to identify the rodent species, their places of activity and determine the likely cause and the extent of the infestation.

- Remove food which is readily attainable for rodents (e.g. spilled grain or food waste). Apart from this, do not clean up the infested area just before the treatment, as this only disturbs the rodent population and makes bait acceptance more difficult to achieve.

- The product should only be used as part of an integrated pest management (IPM) system, including, amongst others, hygiene measures and, where possible, physical methods of control.

- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.

- Bait stations should be placed in the immediate vicinity of places where rodent activity has been previously observed (e.g. travel paths, nesting sites, feedlots, holes, burrows etc.).

- Where possible, bait stations must be fixed to the ground or other structures.

- Bait stations must be clearly labelled to show they contain rodenticides and that they must not be moved or opened (see section 5.3 for the information to be shown on the label)

- When the product is being used in public areas, the areas treated should be marked during the treatment period and a notice explaining the risk of primary or secondary poisoning by the anticoagulant as well as indicating the first measures to be taken in case of poisoning must be made available alongside the baits.

- Bait should be secured so that it cannot be dragged away from the bait station.
- Place the product out of the reach of children, birds, pets and farm animals and other non-target animals.
- Place the product away from food, drink and animal feeding stuffs, as well as from utensils or surfaces that have contact with these.
- Wear protective chemical resistant gloves (rubber) during product handling phase.
- When using the product do not eat, drink or smoke. Wash hands and directly exposed skin after using the product
- If bait uptake is low relative to the apparent size of the infestation, consider the replacement of bait stations to further places and the possibility to change to another bait formulation.
- If after a treatment period of 35 days baits are continued to be consumed and no decline in rodent activity can be observed, the likely cause has to be determined. Where other elements have been excluded, it is likely that there are resistant rodents so consider the use of a non-anticoagulant rodenticide, where available, or a more potent anticoagulant rodenticide. Also consider the use of traps as an alternative control measure.
- Remove the remaining bait or the bait stations at the end of the treatment period.
- Do not open the sachets containing the bait.

For trained professionals:

- Read and follow the product information as well as any information accompanying the product or provided at the point of sale before using it.
- Carry out a pre-baiting survey of the infested area and an on-site assessment in order to identify the rodent species, their places of activity and determine the likely cause and the extent of the infestation.
- Remove food which is readily attainable for rodents (e.g. spilled grain or food waste). Apart from this, do not clean up the infested area just before the treatment, as this only disturbs the rodent population and makes bait acceptance more difficult to achieve.
- The product should only be used as part of an integrated pest management (IPM) system, including, amongst others, hygiene measures and, where possible, physical methods of control.
- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinfestation.
- The product should be placed in the immediate vicinity of places where rodent activity has been previously explored (e.g. travel paths, nesting sites, feedlots, holes, burrows etc.).
- Where possible, bait stations must be fixed to the ground or other structures.
- Bait stations must be clearly labelled to show they contain rodenticides and that they must not be moved or opened (see section 5.3 for the information to be shown on the label).
- When the product is being used in public areas, the areas treated should be marked during the treatment period and a notice explaining the risk of primary or secondary poisoning by the anticoagulant as well as indicating the first measures to be taken in case of poisoning must be made available alongside the baits
- Bait should be secured so that it cannot be dragged away from the bait station.
- Place the product out of the reach of children, birds, pets and farm animals and other non-target animals.
- Place the product away from food, drink and animal feeding stuffs, as well as from utensils or surfaces that have contact with these.
- Wear protective chemical resistant gloves (rubber) during product handling phase.
- When using the product do not eat, drink or smoke. Wash hands and directly exposed skin after using the product.
- The frequency of visits to the treated area should be at the discretion of the operator, in the light of the survey conducted at the outset of the treatment. That frequency should be consistent with the recommendations provided by the relevant code of best practice
- If bait uptake is low relative to the apparent size of the infestation, consider the replacement of bait points to further places and the possibility to change to another bait formulation.
- If after a treatment period of 35 days baits are continued to be consumed and no decline in rodent activity can be observed, the likely cause has to be determined. Where other elements have been excluded, it is likely that there are resistant rodent so consider the use of a non-anticoagulant rodenticide, where available, or a more potent anticoagulant rodenticide. Also consider the use of traps as an alternative control measure.
- Remove the remaining bait or the bait stations at the end of the treatment period.

- Do not open the sachets containing the bait.

5.2. Risk mitigation measures

For professionals:

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign.
- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents at frequent intervals during treatment (e.g. at least twice a week).
- Products shall not be used beyond 35 days without an evaluation of the state of the infestation and of the efficacy of the treatment.
- Do not use baits containing anticoagulant active substances as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.
- The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly show that: the product shall not be supplied to the general public (e.g. "for professionals only"); the product shall be used in adequate tamper resistant bait stations (e.g. "use in tamper resistant bait stations only"); users shall properly label bait stations with the information referred to in section 5.3 of the SPC (e.g. label bait stations according to the product recommendations).
- Using this product should eliminate rodents within 35 days. The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly recommend that in case of suspected lack of efficacy by the end of the treatment (i.e. rodent activity is still observed), the user should seek advice from the product supplier or call a pest control service.
- Do not wash the bait stations with water between applications.
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

For Trained professionals:

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders about the rodent control campaign.
- The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly show that the product shall only be supplied to trained professional users holding certification demonstrating compliance with the applicable training requirements (e.g. "for trained professionals only").
- Do not use in areas where resistance to the active substance can be suspected.
- Products shall not be used beyond 35 days without an evaluation of the state of the infestation and of the efficacy of the treatment
- Do not rotate the use of different anticoagulants with comparable or weaker potency for resistance management purposes. For rotational use, consider using a non-anticoagulant rodenticide, if available, or a more potent anticoagulant.
- Do not wash the bait stations or utensils used in covered and protected bait points with water between applications
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

This product contains an anticoagulant substance. If ingested, symptoms, which may be delayed, may include nosebleed and bleeding gums. In severe cases, there may be bruising and blood present in the faeces or urine.

- Antidote:
Vitamin K1 administered by medical/veterinary personnel only.

- In case of:

Dermal exposure, wash skin with water and then with water and soap.

Eye exposure, rinse eyes with eyes-rinse liquid or water, keep eyes lids open at least 10 minutes.

Oral exposure, rinse mouth carefully with water.
Never give anything by mouth to unconscious person. Do not provoke vomiting. If swallowed, seek medical advice immediately and show the product's container or label. Contact a veterinary surgeon in case of ingestion by a pet.

- Bait stations must be labelled with the following information: "do not move or open"; "contains a rodenticide"; "product name or authorisation number"; "active substance" and "in case of incident, call a poison centre".

- Hazardous to wildlife.

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

At the end of the treatment, dispose the uneaten bait and the packaging in accordance with local requirements.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Store in a dry, cool and well ventilated place. Keep the container closed and away from direct sunlight.

- Store in places prevented from the access of children, birds, pets and farm animals.

- Shelf life: 24 months.

6. Other information

- Because of their delayed mode of action, anticoagulant rodenticides may take from 4 to 10 days to be effective after effective consumption of the bait.

- Rodents can be disease carriers. Do not touch dead rodents with bare hands, use gloves or use tools such as tongs when disposing them.

- This product contains a bittering agent and a dye.

BRODIBLEU PASTA

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta fresca

USO PROFESSIONALE

CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI

AREA DI UTILIZZO: INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) g 0,005

Denatonio Benzoato (N° CAS 3734-33-6) g 0,001

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può nuocere al feto. Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente nei rifiuti speciali secondo le normative nazionali.

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della Salute n.
IT/2014/00228/AUT

Titolare dell'autorizzazione:

BLEU LINE S.r.l. - Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova -
47122 Forlì (FC) Tel 0543 754430

Officina di produzione:

FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - C/da Ripoli - 64023 Mosciano
S. Angelo (TE)
BIOSOL ITALIA SRLS - Via Nettunense Km 23, 400 -
04011 Aprilia (LT)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia 25 -
35020 Arre (PD)

UNICHEM d.o.o. (S.r.l.) - Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika
(Slovenia)

Officina di confezionamento secondario:

SELECTA S.r.l. - Via Tacito 9 - 20094 Corsico (MI)

Confezione: 1,5-3-5-10-20-25 kg (contenente esche in
pasta fresca in carta alimentare pronte all'uso da 20g cia-
scuna)

Validità: 2 anni

Lotto n. del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRODIBLEU PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formula-

Etichetta e Foglio Illustrativo

zione consiste in una pasta fresca appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

BRODIBLEU PASTA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

BRODIBLEU PASTA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

ORGANISMI TARGET

Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti e Ratto nero (*Rattus rattus*) sia giovani che adulti.

MODALITÀ APPLICATIVE

BRODIBLEU PASTA è un'esca pronta all'uso in forma di pasta fresca, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

INDICAZIONI PER L'USO E AVVERTENZE

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.

Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.

BLEU LINE SRL
Legale Rappresentante
Bazzocchi Giovanni

Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di reinfestazione.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.

I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.

Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.

Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.

Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determi-

narne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.

Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche.

Non aprire i sacchetti contenenti l'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Pericoloso per la fauna selvatica.

DOSI E MODI IMPIEGO

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*).

Posizionare 40 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 g ciascuna. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Posizionare 60-100 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 g ciascuna.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il con-

sumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Uso all'esterno, intorno agli edifici Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*).

Posizionare 40 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 2 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 g ciascuna. Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

Non applicare direttamente nelle tane.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

Uso all'esterno, intorno agli edifici Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Posizionare 60-100 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 3-5 esche in pasta fresca pronte all'uso da 20 g ciascuna.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i

corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

Non applicare direttamente nelle tane.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso.

Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere a intervalli frequenti i roditori morti durante il trattamento (ad esempio almeno due volte la settimana).

Il prodotto non deve essere usato per oltre 35 giorni senza una valutazione dello stato di infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non utilizzare le esche contenenti sostanze attive anticoagulanti come esche permanenti per scopi preventivi o di monitoraggio delle attività dei roditori.

Quando si collocano punti esca vicino alle acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali, dighe, fossi di irrigazione) o sistemi di drenaggio dell'acqua, assicurarsi che l'esca non venga a contatto con acqua.

L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni relative al prodotto (ad esempio etichetta e/o fogli illustrativi) devono chiaramente suggerire che in caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio si osserva ancora attività di roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere suggerimenti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di disinfezione.

Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche.

Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente.

Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole.

Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.

I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.

Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.

ISTO SI APPROVA
IL FARMACISTA
FRANCESCO PERRONI

BLEU LINE SRL
Legale Rappresentante
Bazzocchi Giovanni

BRODIBLEU PASTA

Esca Rodenticida pronta all'uso in forma di pasta

USO PROFESSIONALE

CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI FORMATI

AREA DI UTILIZZO: INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI

Composizione:

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) g 0,005

Denatonio Benzoato (N° CAS 3734-33-6) g 0,001

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

Può nuocere al feto. Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente nei rifiuti speciali secondo le normative nazionali.

PRODOTTO BIOCIDA (PT14)

Autorizzazione del Ministero della Salute n.
IT/2014/00228/AUT

Titolare dell'autorizzazione:

BLEU LINE S.r.l. - Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova -
47122 Forlì (FC) Tel 0543 754430

Officina di produzione

FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - C/da Ripoli - 64023 Mosciano
S. Angelo (TE)

BIOSOL ITALIA SRLS - Via Nettunense Km 23, 400 - 04011
Aprilia (LT)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia 25 - 35020 Arre
(PD)

UNICHEM d.o.o. (S.r.l.) - Sinja Gorica 2, SI-1360 Vrhnika
(Slovenia)

Officina di confezionamento secondario:

SELECTA S.r.l. - Via Tacito 9 - 20094 Corsico (MI)

Confezione: 1,5-3-5-10-20-25 kg (contenente esche in pasta in carta alimentare pronte all'uso da 20g ciascuna)

Validità: 2 anni

Lotto n. del

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

BRODIBLEU PASTA è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in una pasta appetibile per le specie di rodi-

Etichetta e Foglio Illustrativo

tori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

BRODIBLEU PASTA contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

BRODIBLEU PASTA può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali (civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini, ed aree esterne di pertinenza).

ORGANISMI TARGET

Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti, Ratto nero (*Rattus rattus*), sia giovani che adulti.

MODALITÀ APPLICATIVE

BRODIBLEU PASTA è un'esca pronta all'uso in forma di pasta, da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione o in punti esca coperti e protetti dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

INDICAZIONI PER L'USO E AVVERTENZE

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.

Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.

Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tut-

BLEU LINE SRL
Legge 488/1999 art. 28

te le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di re-infestazione.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.

I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.

Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.

Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.

La frequenza delle visite all'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce del sopralluogo condotto all'inizio del trattamento. La frequenza deve essere conforme alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.

Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinare la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.

Raccogliere il prodotto o i contenitori per esche rimanenti alla fine del periodo di trattamento.

Non aprire i sacchetti contenenti l'esca.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Pericoloso per la fauna selvatica.

DOSI E MODI IMPIEGO

Uso all'interno di edifici Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*):

in caso di alta infestazione: posizionare 100 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 5 esche in pasta pronte all'uso da 20 g ciascuna. In caso di bassa infestazione: posizionare 60 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 3 esche in pasta pronte all'uso da 20 g ciascuna.

Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 40 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 g ciascuna.

Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento.

Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti.

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).

Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori.

Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

Uso all'esterno, intorno agli edifici Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*):

In caso di alta infestazione: posizionare 100 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 5 esche in pasta pronte all'uso da 20 g ciascuna.

in caso di bassa infestazione: posizionare 60 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 3 esche in pasta pronte all'uso da 20 g ciascuna.

Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 40 g di BRODIBLEU PASTA per contenitore, pari a 2 esche in pasta pronte all'uso da 20 g ciascuna.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento.

Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti: per uso esterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio.

Non utilizzare questo prodotto direttamente nelle tane.

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di re-infestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).

Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori. Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso.

Non impiegare in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva.

Non usare i prodotti oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace.

Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e protetti.

Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente.

Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.

I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.

Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.

STAMPATO IN ITALIA
DISTRIBUITO DA
BLEU LINE SRL
Via F.lli. Rosselli, 10
00197 Roma

BLEU LINE SRL

Legale Rappresentante
Balzani G. Gianni