

Resumo das características do produto biocida (SPC BP)

Nome do produto: Deosan Activate Pre RTU AG108

Tipo(s) do produto: TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

TP 03 - Higiene veterinária

Número da autorização: EU-0019228-0000

**Número de referência do ativo
R4BP 3:** EU-0019228-0003

Índice

Informação administrativa	1
1.1. Nome comercial do produto	1
1.2. Titular da Autorização	1
1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas	1
1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)	1
2. Composição e formulação do produto	3
2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida	3
2.2. Tipo de formulação	3
3. Advertências de perigo e recomendações de prudência	3
4. Utilização(ões) autorizada(s)	4
5. Orientações gerais para a utilização	26
5.1. Instruções de utilização	26
5.2. Medidas de redução do risco	26
5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente	27
5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem	27
5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento	27
6. Outras informações	28

Informação administrativa

1.1. Nome comercial do produto

Deosan Activate Pre RTU AG108

Deosan Activate Pre RTU

1.2. Titular da Autorização

Nome e endereço do titular da autorização

Nome

Diversey Europe Operations B.V.

Endereço

Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Holanda

Número da autorização

EU-0019228-0000 1-2

Número de referência do ativo R4BP 3

EU-0019228-0003

Data da autorização

03/04/2019

Data de caducidade da autorização

31/03/2029

1.3. Fabricante(s) dos produtos biocidas

1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa

1319 - Iodo

Nome do fabricante

ACF Minera S.A.

Endereço do fabricante

San Martin No 499 1100000 Iquique Chile

Localização das instalações de fabrico

Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substância ativa

1319 - Iodo

Nome do fabricante

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Endereço do fabricante

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Chile

Localização das instalações de fabrico

Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Chile

Substância ativa

1319 - Iodo

Nome do fabricante

Cosayach Nitratos S.A.

Endereço do fabricante

Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Chile

Localização das instalações de fabrico

S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Chile

Substância ativa

1319 - Iodo

Nome do fabricante

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.

Endereço do fabricante

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japão

Localização das instalações de fabrico

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japão

Substância ativa

1319 - Iodo

Nome do fabricante

ISE Chemicals Corporation

Endereço do fabricante

3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Japão

Localização das instalações de fabrico

Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Japão

Substância ativa	1319 - Iodo
Nome do fabricante	Atacama Minerals SCM
Endereço do fabricante	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Chile
Localização das instalações de fabrico	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Chile

2. Composição e formulação do produto

2.1. Informações qualitativas e quantitativas sobre a composição do produto biocida

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Iodo		Substância ativa	7553-56-2	231-442-4	0,3

2.2. Tipo de formulação

AL - Qualquer outro líquido

3. Advertências de perigo e recomendações de prudência

Advertências de perigo	Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Recomendações de prudência	Se for necessário consultar um médico, mostre-lhe a embalagem ou o rótulo. Manter fora do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Eliminar o conteúdo em de acordo com a legislação nacional. Eliminar o recipiente em de acordo com a legislação nacional.

4. Utilização(ões) autorizada(s)

4.1 Descrição do uso

Utilização 1 - Uso # 12 Utilização N.º 12 Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual por imersão (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão manual - - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por imersão.
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal /aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD

Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD
Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.1.1 Instruções específicas de utilização

Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por imersão
Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.
3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.
Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal /aplicação

4.1.2 Medidas de mitigação do risco específicas

No caso de ser necessária a combinação de desinfecção pré e pós ordenha, deverá considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha.

4.1.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.1.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2 Descrição do uso

Utilização 2 - Uso # 13 – Utilização N.º 13 – Desinfecção pré-ordenha, aplicação manual por espuma (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias
Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo)
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Leveduras
Nome comum: Leveduras
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Interior

Interior

Método(s) de aplicação

Aplicação de espuma -

Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha
Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por espuma.

Frequência de aplicação e dosagem

A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. -

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.
Aplicar um máximo de 5 ml de produto/ animal / aplicação

Categoria(s) de utilizadores

Profissional

Capacidade e material da embalagem

Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD.
Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD.
Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE.

4.2.1 Instruções específicas de utilização

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

Aplicar diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de aplicação de espuma manual.

3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/ animal /aplicação

4.2.2 Medidas de mitigação do risco específicas

No caso de ser necessária a combinação de desinfecção pré e pós ordenha, deverá considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha.

4.2.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.2.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3 Descrição do uso

Utilização 3 - Uso # 14 - Utilização N.º 14 Desinfecção pré-ordenha, pulverização manual (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados
Campos de utilização	Interior interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através do método de pulverização manual.
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/ animal/ aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.3.1 Instruções específicas de utilização

Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pré-ordenha por pulverização.
Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.
3 aplicações pré-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.3.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização dentro da informação sobre o produto)
No caso de ser necessária uma combinação de desinfecção pré e pós ordenha, deverá considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha.

4.3.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.3.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4 Descrição do uso

Utilização 4 - Uso # 15 – Utilização N.º 15 – Desinfecção pós-ordenha, imersão manual (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias
Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo)
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Leveduras
Nome comum: Leveduras
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização	Interior Indoor
Método(s) de aplicação	Imersão manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão.
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal/ aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.4.1 Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão.
Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.
3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.
Aplicar um máximo de 10 ml de produto/animal/aplicação

4.4.2 Medidas de mitigação do risco específicas

No caso de ser necessária uma combinação de desinfecção pré e pós ordenha, deverá considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha

4.4.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.4.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5 Descrição do uso

Utilização 5 - Uso # 16 - Utilização N.º 16 – Desinfecção pós-ordenha, manual, aplicação de espuma (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias
Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo)

Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Leveduras
Nome comum: Leveduras
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Interior

Interior

Método(s) de aplicação

Aplicação de espuma manual -

Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha
Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através de aplicação manual de espuma.

Frequência de aplicação e dosagem

A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. -

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/ animal / aplicação

Categoria(s) de utilizadores

Profissional

Capacidade e material da embalagem

Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD
Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD
Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.5.1 Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de aplicação manual de espuma . Fórmula pronta a

utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 5 ml de produto/ animal /aplicação

4.5.2 Medidas de mitigação do risco específicas

No caso de ser necessária uma combinação de desinfecção pré e pós ordenha,deverá considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha.

4.5.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.5.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6 Descrição do uso

Utilização 6 - Uso # 17 – Utilização N.º 17 – Desinfecção pós-ordenha, manual por pulverização (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias
Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo)
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Leveduras
Nome comum: Leveduras
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização manual - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicação manual diretamente nos tetos do animal pós-ordenha por pulverização.
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/ animal / aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.6.1 Instruções específicas de utilização

Aplicação manual. diretamente nos tetos do animal pós-ordenha por pulverização.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/ animal /aplicação

4.6.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

No caso de ser necessária uma combinação de desinfecção pré e pós ordenha, deverá considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha.

4.6.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.6.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7 Descrição do uso

Utilização 7 - Uso # 18 – Utilização N.º 18 – Desinfecção pós-ordenha, pulverização automática (não pode ser combinada com a desinfecção pré-ordenha) (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Pulverização automática - - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de pulverização automática. .
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 5 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Não deve ser combinado com desinfecção pré-ordenha à base de iodo. Aplicar um máximo de 15 ml de produto/ animal / aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.7.1 Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de pulverização automática.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

5 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Não deve ser combinado com desinfecção pré-ordenha à base de iodo.

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/ animal /aplicação

4.7.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.7.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8 Descrição do uso

Utilização 8 - Uso # 19 Utilização N.º 19 – Desinfecção pós-ordenha, imersão semiautomática (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Imersão semiautomática - - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática.
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia. Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal / aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.8.1 Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pós-ordenha através do método de imersão semiautomática. Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.
3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia.
Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal /aplicação

4.8.2 Medidas de mitigação do risco específicas

No caso de ser necessária uma combinação de desinfecção pré e pós ordenha, deve considerar-se a utilização de outro produto que não contenha iodo para a desinfecção pré-ordenha/pós-ordenha

4.8.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.8.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9 Descrição do uso

Utilização 9 - Uso # 20 Utilização N.º 20 – Desinfecção pré e pós-ordenha, pulverização manual (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias
Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo)

Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Leveduras
Nome comum: Leveduras
Estadio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Interior

Interior

Método(s) de aplicação

Imersão manual -

Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através de métodos de imersão manual

Frequência de aplicação e dosagem

A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. -

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal /aplicação

Categoria(s) de utilizadores

Profissional

Capacidade e material da embalagem

Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD

Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD

Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.9.1 Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré-ordenha através de métodos de imersão manual.
Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.
3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 10 ml de produto/ animal /aplicação

4.9.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

4.9.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.9.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10 Descrição do uso

Utilização 10 - Uso # 21 Utilização N.º 21 Desinfecção pré e pós-ordenha, aplicação manual de espuma (líquido RTU)

Tipo de produto	TP 03 - Higiene veterinária
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	-
Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)	Nome científico: Bactérias Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo) Estadio de desenvolvimento: Sem dados Nome científico: Leveduras Nome comum: Leveduras Estadio de desenvolvimento: Sem dados
Campos de utilização	Interior Interior
Método(s) de aplicação	Aplicação de espuma manual - - Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através do método de aplicação manual de espuma .
Frequência de aplicação e dosagem	A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p). - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - 3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total). Aplicar um máximo de 5 ml de produto/ animal / aplicação
Categoria(s) de utilizadores	Profissional
Capacidade e material da embalagem	Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.10.1 Instruções específicas de utilização

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.
Aplicar diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através do método de aplicação manual de espuma
3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).
Aplicar um máximo de 5 ml de produto/ animal /aplicação

4.10.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)

4.10.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.10.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11 Descrição do uso

Utilização 11 - Uso # 22 –Utilização N.º 22 – Desinfecção pré e pós-ordenha, pulverização manual (líquido RTU)

Tipo de produto

TP 03 - Higiene veterinária

Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada

-

Organismo(s) alvo (incluindo o estágio de desenvolvimento)

Nome científico: Bactérias
Nome comum: Bactérias (Gram-positivo e Gram-negativo)
Estádio de desenvolvimento: Sem dados

Nome científico: Leveduras
Nome comum: Leveduras
Estádio de desenvolvimento: Sem dados

Campos de utilização

Interior

interior

Método(s) de aplicação

Pulverização manual -

Desinfetante de tetos, para aplicação direta em animais em lactação, pré e pós-ordenha
Aplicado manual diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha por pulverização .

Frequência de aplicação e dosagem

Na utilização de uma concentração de iodo de 3000 mg/kg (0,3% p/p) - Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar. - -

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/ animal/ aplicação

Categoria(s) de utilizadores

Profissional

Capacidade e material da embalagem

Recipiente de 1, 5 e 20 litros de PEAD ou f-PEAD
Cilindro de 200 litros de PEAD ou f-PEAD

Recipiente para Granel (IBC) de 950 litros de PEAD ou f-HPDE

4.11.1 Instruções específicas de utilização

Aplicado diretamente nos tetos do animal pré e pós-ordenha através do método de pulverização manual.

Fórmula pronta a utilizar contendo 0,3% p/p de iodo. Não diluir antes de utilizar.

3 aplicações pré-ordenha e 3 aplicações pós-ordenha, por animal, por dia (até 5 aplicações no total).

Aplicar um máximo de 15 ml de produto/animal/aplicação

4.11.2 Medidas de mitigação do risco específicas

Use luvas de proteção resistentes a químicos durante a fase de manuseamento do produto (material das luvas a ser especificado pelo detentor da autorização de acordo com a informação sobre o produto)
Use calçado de proteção adequado (EN 13832) quando aplicar o produto.

Deve usar-se um fato de proteção (pelo menos tipo 6, EN 13034)

4.11.3 Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11.4 Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

4.11.5 Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Ver secção 5 - Instruções gerais de utilização

5. Orientações gerais para a utilização

5.1. Instruções de utilização

O produto deve ser colocado a uma temperatura de >20°C antes de utilizar

Pré-ordenha:

Aplicar o produto em todo o comprimento de cada teto.

Para uma utilização eficaz contra bactérias e leveduras o produto deve ser deixado em contacto com a pele durante, pelo menos 30 segundos.

Após um tempo de contacto apropriado, remova bem o produto utilizando uma toalha de papel/pano descartável para garantir que os tetos estão limpos e secos.

A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p).

Pós-ordenha:

Cubra todo o comprimento de cada teto com o produto, imediatamente após ordenha.

Para garantir um tempo de contacto suficiente, deve ter-se cuidado para que o produto não seja removido após aplicação (por ex., manter as vacas em pé, pelo menos, durante 5 minutos)

A concentração de utilização de iodo é de 3000 mg/kg (0,3% p/p).

5.2. Medidas de redução do risco

Recomenda-se a utilização de uma bomba de dosagem para encher o produto no equipamento de aplicação. O produto não contém Substâncias Potencialmente Perigosas

5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Inalação: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal. Contacto com a pele: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal. Contacto com os olhos: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal. Ingestão: Sem efeitos ou sintomas conhecidos em condições de utilização normal

Após inalação: Forneça ar fresco, consulte um médico em caso de sintomas.

Após contacto com a pele: Lavar imediatamente com água e sabão passar bem por água.

Após contacto com os olhos: Passe os olhos abertos por água corrente durante vários minutos (pelo menos 15 minutos). Após

ingestão: Lave a boca com água e depois beba bastante água. Contactar imediatamente um médico.

Se for necessário consultar um médico leve a embalagem do produto e o rótulo

Estabilidade e reatividade:

Reatividade: Sem riscos reativos conhecidos em condições de armazenamento em condições de utilização normais. Estabilidade

química: Estável em condições de armazenamento e utilização normais.

Possibilidade de reações perigosas: Sem reações perigosas conhecidas em condições de armazenamento e utilização normais.

Condições a evitar: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais.

Produtos de decomposição perigosos: Nenhum conhecido em condições de armazenamento e utilização normais. Precauções ambientais:

Dique para recolha de derrames de líquidos grandes.

Contenha ou absorva o derrame com material inerte e depois coloque num recipiente adequado. Evite que os produtos derramados entrem em drenos, esgotos e águas subterrâneas.

Recalha em contentores fechados e adequados para eliminação.

Não volte a por os materiais derramados no contentor original.

5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Os contentores vazios devem ser enxaguados três vezes antes da eliminação

As toalhas de papel utilizadas para secar os tetos dos animais e remover o produto dos mesmos devem ser eliminadas como lixo indiferenciado/doméstico.

Não descarregar produto não diluído para o esgoto.

5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento

Guardar apenas no recipiente original, fechado
Proteger de congelação
Não armazenar a temperaturas acima de 30 °C
Prazo de validade 24 meses.

6. Outras informações

Nenhum