

Povzetek lastnosti biocidnega proizvoda

Ime prvič avtoriziranega proizvoda: LuxSpray 50

Vrsta(-e) proizvoda(-ov): Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Številka dovoljenja: EU-0020125-0000

Referenčna številka vnosa v R4BP 3: EU-0020125-0006

Kazalo

Upravne informacije	1
1.1. Trgovska imena proizvoda	1
1.2. Imetnik dovoljenja	1
1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov	1
1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi	2
2. Sestava in formulacija proizvoda	2
2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki	3
4. Dovoljena(e) uporaba	3
5. Splošna navodila za uporabo	23
5.1. Navodila za uporabo	24
5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja	24
5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja	24
5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže	24
5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja	24
6. Druge informacije	25

Upravne informacije

1.1. Trgovska imena proizvoda

LuxSpray 50, Silkidip, Ceanodine, IoSpray 10, Maxadine RTU, Diamond Superdip, Kristal Iocare Post, KiwiDip, Superdip Excel, loguard RTU, Shepherd's IoSpray 50

1.2. Imetnik dovoljenja

Ime in naslov imetnika dovoljenja	Ime in priimek	GEA Farm Technologies GmbH
	Naslov	Siemensstraße 25-27 59199 Bönen Nemčija
Številka dovoljenja	EU-0020125-0000 1-2	

Referenčna številka vnosa v R4BP 3

EU-0020125-0006

Datum dovoljenja

19/11/2019

Datum izteka veljavnosti dovoljenja

31/10/2029

1.3. Proizvajalec(-ci) biocidnih proizvodov

Ime proizvajalca	GEA Farm Technologies
Naslov proizvajalca	Wylye Works BA12 9HT Warminster Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	Wylye Works, Watery Lane BA12 9HT Warminster Združeno kraljestvo
	Gewerbestraße 5 5325 Plainfeld Avstrija
	ul. Ołowiana 10 85-461 Bydgoszcz Poljska

1.4. Proizvajalec(ci) aktivne(ih) snovi

Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	SQM Europe N.V.
Naslov proizvajalca	St Pietersvliet 7, bus 8 2000 Antwerp Belgija
Lokacije proizvodnje	Sociedad Quimica y Minera SA, Los Militares, Las Condes 4290 Piso 4 Santiago Čile
Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	Nihon Tennen Gas Co., Ltd (Via Mitsui & Co Europe PLC)
Naslov proizvajalca	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Japonska
Lokacije proizvodnje	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun, 299-4205 Chosei-Gun Japonska
Aktivna snov	1319 - Jod
Ime proizvajalca	Norkem Ltd
Naslov proizvajalca	Norkem House, Bexton Lane, WA16 9FB Knutsford Združeno kraljestvo
Lokacije proizvodnje	OFICINA CALA CALA S/N neznana POZO ALMONTE Čile

2. Sestava in formulacija proizvoda

2.1. Kvalitativni in kvantitativni podatki o sestavi biocidnega proizvoda

Splošno ime	Ime IUPAC	Funkcija	Številka CAS	Številka EC	Vsebnost (%)
Jod		Aktivna snov	7553-56-2	231-442-4	0,5
C9-11 alkoholni etoksilat	C9-11 alkohol s 6 moli etoksilata. Na voljo so različne blagovne znamke, vključno z "imbentinom C-91-060".	Neaktivna snov	68439-46-3	614-482-0	0,56

2.2. Vrsta formulacije

AL- druge tekočine, ki se uporabljajo nerazredčene

3. Stavki o nevarnosti in previdnostni stavki

Stavki o nevarnosti

Lahko je jedko za kovine.
Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki.

Previdnostni stavki

Preprečiti sproščanje v okolje.
Odstraniti vsebino v skladu z lokalnimi predpisi.
Odstraniti posodo v skladu z lokalnimi predpisi.
Prestreči razlito tekočino.

4. Dovoljena(e) uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Uporaba # 2.1 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo pred molžo - pomakanje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, pred molžo, po metodi pomakanja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: vse

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: kvasovke
Razvojni stadij: vse

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Notranji

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprti sistem: obdelava s pomakanjem v skodelico
Podroben opis:

Uporaba s skodelico za pomakanje: s tradicionalno posodo za pomakanje z

	<p>nepovratnimi ventili. Proizvod RTU dajte v rezervoar. Odvijte del aplikatorja. Stisnite rezervoar, da napolnite aplikator. Pokrijte spodnji dve tretjini vsakega seska z raztopino.</p> <p>Neuporabljeno raztopino zavržite po vsaki molži. Ista raztopina se lahko uporabi pri več živalih med isto molžo.</p>
<p>Odmerki in pogostost uporabe</p>	<p>Odmerek: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi na posamezno aplikacijo, krave in bivolice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml)</p> <p>Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,30% (m/m) joda.</p> <p>Število in časovni razpored uporabe:</p> <p>2 aplikaciji pred molžo na žival na dan.</p>
<p>Skupina(-e) uporabnikov</p>	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
<p>Velikosti in material embalaže</p>	<p>Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda, plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda Plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l Posoda, plastika: HDPE, 5 l Posoda, plastika: HDPE, 5 l</p> <p>Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.</p>

4.1.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

--

4.1.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

V primeru kombinacije dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba za naknadno molžo preučiti uporabo drugega proizvoda, ki ne vsebuje joda.

4.1.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.1.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 2.1.5.4

4.1.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Uporaba # 2.2 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo pred molžo - pršenje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, pred molžo, po metodi pršenja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: vse

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: kvasovke
Razvojni stadij: vse

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Notranji

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem: pršenje
Podroben opis:

Uporaba s pnevmatskim razpršilcem: polnilni sistem pršilnega sistema je nameščen v posodi s proizvodom RTU. Proizvod RTU se črpa v pršilno cevko, ki se nahaja v molznem prostoru. Pršilno cevko nato uporabimo za pokrivanje spodnjih dveh tretjin seskov s proizvodom RTU.

Uporaba z ročnim sprožilnim razpršilom: napolnite razpršilno posodo s proizvodom RTU.

Uporabite sprožilno razpršilo, da pokrijete dve tretjini vsakega seska s proizvodom RTU.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi na posamezno aplikacijo, krave in bivolice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml)
Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,30% (m/m) joda.

Število in časovni razpored uporabe:
2 aplikaciji pred molžo na žival na dan.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Posoda, plastika: HDPE, 10 l

Posoda, plastika: HDPE, 20 l

Posoda, plastika: HDPE, 25 l

Sod, plastika: HDPE, 200 l

Posoda, plastika: HDPE, 10 l

Posoda Plastika: HDPE, 20 l

Posoda, plastika: HDPE, 25 l

Sod, plastika: HDPE, 200 l

IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l

IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l

Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.

4.2.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej 5.1

4.2.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri uporabi proizvoda z ročnim razprševanjem nosite zaščitne rokavice, ki so odporne na kemikalije (material za rokavice določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodni).

V primeru, da je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba pri naknadni molži upoštevati dezinfekcijo drugega proizvoda, ki ne vsebuje joda.

4.2.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.2.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 2.5.4

4.2.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.3 Opis uporabe

Uporaba 3 - Uporaba # 2.3 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo pred molžo - penjenje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, pred molžo, po metodi penjenja.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: vse Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: vse
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranji
Način(-i) uporabe	Metoda: Nanos pene Podroben opis: Nanos s penjenjem, posoda za peno: Kot za skodelico za pomakanje, vendar, ko se stisne, tekočina steče skozi fine mreže in z mešanjem z zrakom tvori peno. Ta se nato nanese na dve tretjini vimena. Ista raztopina se lahko uporabi pri več živalih med isto molžo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerki: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi na posamezno aplikacijo, krave in bivolice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml) Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,30% (m/m) joda. Število in časovni razpored uporabe: 2 aplikaciji pred molžo na žival na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni

Velikosti in material embalaže

Posoda, plastika: HDPE, 10 l

Posoda, plastika: HDPE, 20 l

Posoda, plastika: HDPE, 25 l

Sod, plastika: HDPE, 200 l

Posoda, plastika: HDPE, 10 l

Posoda Plastika: HDPE, 20 l

Posoda, plastika: HDPE, 25 l

Sod, plastika: HDPE, 200 l

IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l

IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l

Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.

4.3.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Glej 5.1

4.3.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

V primeru, da je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba pri naknadni molži upoštevati dezinfekcijo drugega proizvoda, ki ne vsebuje joda.

4.3.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.3.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.3.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.4 Opis uporabe

Uporaba 4 - Uporaba # 2.4 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo po molži - pomakanje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, po molži, po metodi pomakanja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: vse

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: kvasovke
Razvojni stadij: vse

Področje uporabe

Način(-i) uporabe	<p>Notranjost, znotraj</p> <p>Notranji</p> <hr/> <p>Metoda: Odpri sistem: obdelava s pomakanjem Podroben opis: Uporaba s skodelico za pomakanje: s tradicionalno posodo za pomakanje z nepovratnimi ventili. Proizvod RTU dajte v rezervoar. Odvijte del aplikatorja. Stisnite rezervoar, da napolnite aplikator. Pokrijte spodnji dve tretjini vsakega seska z raztopino.</p> <p>Neuporabljeno raztopino zavržite po vsaki molži. Ista raztopina se lahko uporabi pri več živalih med isto molžo.</p>
Odmerki in pogostost uporabe	<p>Odmerek: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi na posamezno aplikacijo, krave in bivovice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml) Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,50% (m/m) joda. Število in časovni raspored uporabe:</p> <p>2 aplikaciji po molži na žival na dan.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
Velikosti in material embalaže	<p>Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda, plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda Plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l Posoda, plastika: HDPE, 5 l Posoda, plastika: HDPE, 5 l</p> <p>Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so aravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.</p>

4.4.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Takoj po molži potopite vsaj 2/3 dolžine seska s proizvodom RTU. Za zagotovitev zadostnega kontaktnega časa je treba paziti, da se proizvod po uporabi ne odstrani (npr. krave naj stojijo najmanj 5 minut).

4.4.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

V primeru, da je potrebna kombinacija dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba pri predhodni molži upoštevati dezinfekcijo drugega proizvoda, ki ne vsebuje joda.

4.4.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.4.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.4.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.5 Opis uporabe

Uporaba 5 - Uporaba # 2.5 -Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo po molži - pršenje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, po molži, po metodi pršenja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: vse

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: kvasovke

Razvojni stadij: vse

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Notranji

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem: pršenje
Podroben opis:

Uporaba s pnevmatskim razpršilcem: polnilni sistem pršilnega sistema je nameščen v posodi s proizvodom RTU. Proizvod RTU se črpa v pršilno cevko, ki se nahaja v molznem prostoru. Pršilno cevko nato uporabimo za pokrivanje spodnjih dveh tretjin seskov s proizvodom RTU.

Uporaba z ročnim sprožilnim razpršilom: napolnite razpršilno posodo s proizvodom RTU.

Uporabite sprožilno razpršilo, da pokrijete dve tretjini vsakega seska s proizvodom RTU.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerki: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi na posamezno uporabo, krave in bivolice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml)

Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,50% (m/m) joda.

Število in časovni razpored uporabe:
2 aplikaciji po molži na žival na dan.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Posoda, plastika: HDPE, 10 l
Posoda, plastika: HDPE, 20 l
Posoda, plastika: HDPE, 25 l
Soda, plastika: HDPE, 200 l
Posoda, plastika: HDPE, 10 l
Posoda, plastika: HDPE, 20 l
Posoda, plastika: HDPE, 25 l
Soda, plastika: HDPE, 200 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele)

prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.

4.5.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Takoj po molži popršite vsaj 2/3 dolžine seska s proizvodom RTU.

Za zagotovitev zadostnega kontaktnega časa delovanja je treba paziti, da se proizvod po uporabi ne odstrani (npr. krave naj stojijo najmanj 5 minut).

4.5.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri uporabi proizvoda z ročnim razprševanjem nosite zaščitne rokavice in škornje, ki so odporne na kemikalije (material za rokavice določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip 6, EN 13034).

V primeru kombinacije dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba za predhodno molžo preučiti uporabo drugega proizvoda, ki ne vsebuje joda.

4.5.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.5.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.5.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

5.5

4.6 Opis uporabe

Uporaba 6 - Uporaba # 2.6 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo po molži - penjenje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, po molži, po metodi penjenja.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: vse Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: vse
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranji
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem: nanos pene Podroben opis: Nanos s penjenjem, posoda za peno: Kot za skodelico za pomakanje, vendar, ko se stisne, tekočina steče skozi fine mreže in z mešanjem z zrakom tvori peno. Ta se nato nanese na dve tretjini vimena. Ista raztopina se lahko uporabi pri več živalih med isto molžo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi za posamezno uporabo, krave in bivoličice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml) Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,50% (m/m) joda. Število in časovni raspored uporabe: 2 aplikaciji po molži na žival na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni
Velikosti in material embalaže	Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda, plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l Posoda, plastika: HDPE, 10 l

Posoda Plastika: HDPE, 20 l
Posoda, plastika: HDPE, 25 l
Sod, plastika: HDPE, 200 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.

4.6.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Takoj po molži potopite vsaj 2/3 dolžine seska s proizvodom RTU.

Za zagotovitev zadostnega kontaktnega časa delovanja je treba paziti, da se proizvod po uporabi ne odstrani (npr. krave naj stojijo najmanj 5 minut).

4.6.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

V primeru kombinacije dezinfekcije pred molžo in po njej, je treba za predhodno molžo preučiti uporabo drugega proizvoda, ki ne vsebuje joda.

4.6.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.6.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.6.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.7 Opis uporabe

Uporaba 7 - Uporaba # 2.7 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo pred molžo in po njej - pomakanje

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)
Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno	Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, pred molžo in po njej, po metodi pomakanja.
Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)	Znanstveno ime: Bakterije Splošno ime: Bakterije Razvojni stadij: vse Znanstveno ime: kvasovke Splošno ime: kvasovke Razvojni stadij: vse
Področje uporabe	Notranjost, znotraj Notranji
Način(-i) uporabe	Metoda: Odprt sistem: pomakanje Podroben opis: Uporaba s skodelico za pomakanje: s tradicionalno posodo za pomakanje z nepovratnimi ventili. Proizvod RTU dajte v rezervoar. Odvijte del aplikatorja. Stisnite rezervoar, da napolnite aplikator. Pokrijte spodnji dve tretjini vsakega seska z raztopino. Neuporabljeno raztopino zavržite po vsaki molži. Ista raztopina se lahko uporabi pri več živalih med isto molžo.
Odmerki in pogostost uporabe	Odmerek: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi za posamezno uporabo, krave in bivolice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml) Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,30% (m/m) joda. Število in časovni razpored uporabe: 2 aplikaciji pred molžo na žival na dan. 2 aplikaciji po molži na žival na dan.
Skupina(-e) uporabnikov	Strokovnjak z licenco Poklicni
Velikosti in material embalaže	Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda, plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l

Sod, plastika: HDPE, 200 l
Posoda, plastika: HDPE, 10 l
Posoda Plastika: HDPE, 20 l
Posoda, plastika: HDPE, 25 l
Sod, plastika: HDPE, 200 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.

4.7.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Po molži:

Takoj po molži potopite vsaj 2/3 dolžine seska s proizvodom RTU.

Za zagotovitev zadostnega kontaktnega časa delovanja je treba paziti, da se proizvod po uporabi ne odstrani (npr. krave naj stojijo najmanj 5 minut).

4.7.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri uporabi proizvoda s potapljanjem nosite zaščitne rokavice, ki so odporne na kemikalije (material za rokavice določiti imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu).

Ta proizvod se lahko uporablja za kombinirano dezinfekcijo pred molžo in po njej, vendar se ne sme uporabljati v kombinaciji z drugim proizvodom na osnovi joda.

4.7.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.7.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.7.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.8 Opis uporabe

Uporaba 8 - Uporaba # 2.8 - Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo pred molžo in po njej - pršenje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, pred molžo in po njej, po metodi pršenja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: vse

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: kvasovke
Razvojni stadij: vse

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Notranji

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem: pršenje
Podroben opis:

Uporaba s pnevmatskim razpršilcem: polnilni sistem pršilnega sistema je nameščen v posodi s proizvodom RTU.

Proizvod RTU se črpa v pršilno cevko, ki se nahaja v molznem prostoru. Pršilno cevko nato uporabimo za pokrivanje spodnjih dveh tretjin seskov s proizvodom RTU.

Uporaba z ročnim sprožilnim razpršilom: napolnite razpršilno posodo s proizvodom RTU.

Uporabite sprožilno razpršilo, da pokrijete dve tretjini vsakega seska s proizvodom RTU.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerki: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi za posamezno uporabo, krave in bivolice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml)
Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,30% (m/m) joda.
Število in časovni raspored uporabe:

	<p>2 aplikaciji pred molžo na žival na dan. 2 aplikaciji po molži na žival na dan.</p>
Skupina(-e) uporabnikov	<p>Strokovnjak z licenco</p> <p>Poklicni</p>
Velikosti in material embalaže	<p>Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda, plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l Posoda, plastika: HDPE, 10 l Posoda Plastika: HDPE, 20 l Posoda, plastika: HDPE, 25 l Sod, plastika: HDPE, 200 l IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l Posoda, plastika: HDPE, 5 l Posoda, plastika: HDPE, 5 l</p> <p>Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.</p>

4.8.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Po molži:

Takoj po molži potopite vsaj 2/3 dolžine seska s proizvodom RTU.

Za zagotovitev zadostnega kontaktnega časa delovanja je treba paziti, da se proizvod po uporabi ne odstrani (npr. krave naj stojijo najmanj 5 minut).

4.8.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri uporabi proizvoda z ročnim razprševanjem nosite zaščitne rokavice in škornje, ki so odporne na kemikalije (material za rokavice določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu).

Nositi je treba zaščitni kombinezon (vsaj tip 6, EN 13034).

Proizvod se lahko uporabi v kombinaciji dezinfekcije pred molžo in po njej, vendar se ne sme uporabljati v kombinaciji z drugim proizvodom na osnovi joda.

4.8.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.8.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.8.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

4.9 Opis uporabe

Uporaba 9 - Uporaba # 2.9 -Proizvodi RTU - Profesionalna RTU tekočina, za uporabo pred molžo in po njej - penjenje

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvodov 03 - Veterinarska higiena (razkužila)

Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno

Veterinarska higiena (dezinfekcijsko sredstvo) za neposredno nanašanje na živalske seske, pred molžo in po njej, z uporabo metode penjenja.

Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo)

Znanstveno ime: Bakterije
Splošno ime: Bakterije
Razvojni stadij: vse

Znanstveno ime: kvasovke
Splošno ime: kvasovke
Razvojni stadij: vse

Področje uporabe

Notranjost, znotraj

Notranji

Način(-i) uporabe

Metoda: Odprt sistem: nanos pene
Podroben opis:

Nanos s penjenjem, posoda za peno: Kot za skodelico za pomakanje, vendar, ko se stisne, tekočina steče skozi fine mreže in z mešanjem z zrakom tvori peno. Ta se nato nanese na dve tretjini vimena.
Ista raztopina se lahko uporabi pri več živalih med isto molžo.

Odmerki in pogostost uporabe

Odmerek: Količina proizvoda RTU, ki se uporabi za posamezno uporabo, krave in bivoličice: od 3 do 10 ml (priporočeno 5 ml) - ovce od 1,5 do 5 ml (priporočeno 1,5 ml) - koze od 2,5 do 6 ml (priporočeno 2,5 ml)
Redčenje (%): Pripravljena za uporabo. Uporabna koncentracija : 0,16–0,30% (m/m) joda.

Število in časovni razpored uporabe:

2 aplikaciji pred molžo na žival na dan.

2 aplikaciji po molži na žival na dan.

Skupina(-e) uporabnikov

Strokovnjak z licenco

Poklicni

Velikosti in material embalaže

Posoda, plastika: HDPE, 10 l
Posoda, plastika: HDPE, 20 l
Posoda, plastika: HDPE, 25 l
Sod, plastika: HDPE, 200 l
Posoda, plastika: HDPE, 10 l
Posoda, plastika: HDPE, 20 l
Posoda, plastika: HDPE, 25 l
Sod, plastika: HDPE, 200 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
IBC (vmesni kontejner za razsuti tovor), plastika: HDPE, 1000 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l
Posoda, plastika: HDPE, 5 l

Vse posode razen 200 l (200 kg) in 1000 l (1000 kg) so lahko srebrne ali naravne (bele prosojne) barve. 200 l (200 kg) sodi so srebrne ali modre barve. IBC so naravne barve. Vse posode so zaprte s pokrovčki ali zamaški, ki so zaščiteni pred ponarejanjem in so certificirani po UN standardu.

4.9.1 Uporba - posebna navodila za uporabo

Po molži:

Takoj po molži potopite vsaj 2/3 dolžine seska v proizvod RTU. Za zagotovitev zadostnega kontaktnega časa delovanja je treba paziti, da se proizvod po uporabi ne odstrani (npr. krave naj stojijo najmanj 5 minut).

4.9.2 Uporaba - posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

Pri uporabi proizvoda s penjenjem nosite zaščitne rokavice, ki so odporne na kemikalije (material za rokavice določi imetnik dovoljenja v okviru informacij o proizvodu).

Proizvod se lahko uporabi v kombinaciji dezinfekcije pred molžo in po njej, vendar se ne sme uporabljati v kombinaciji z drugim proizvodom na osnovi joda.

4.9.3 Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Glej 5.3

4.9.4 Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Glej 5.4

4.9.5 Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

Glej 5.5

5. Splošna navodila za uporabo

5.1. Navodila za uporabo

Hranite zunaj dosega otrok.
Pred uporabo vedno preberite etiketo ali navodilo in upoštevajte vsa navodila.
Temperatura proizvoda pred uporabo naj bo nad 20° C.
Proizvod se lahko uporablja v celotnem obdobju laktacije.
Pred pritrditvijo molznega grozda odstranite vse ostanke sesanja z brisačo za enkratno uporabo ali krpo za ponovno uporabo. Na posamezno kravo se uporabi ena krpo.
Za učinkovito uporabo proti bakterijam in kvasovkam je treba proizvod pustiti delovati v stiku s kožo najmanj 60 sekund.

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

Glejte poglavje 4.2 ustrezne uporabe

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

Pred ponovno uporabo odstranite in operite onesnažena oblačila.

Pri vdihavanju: v primeru nenamernega vdihavanja hlapov zaradi pregrevanja ali izgorevanja pojdite na svež zrak. Če se ne počutite dobro, poiščite zdravniško pomoč.

Pri stiku s kožo: previdno izperite z vodo in milom. Če draženje kože ne preneha, se posvetujte z zdravnikom.

Pri stiku z očmi: takoj izpirajte z obilo vode, tudi pod vekami, najmanj 15 minut. Poiščite zdravniško pomoč pri očesnem specialistu.

Pri zaužitju: izpirajte usta in popijte veliko vode. Nezavestni osebi nikoli ne dajajte ničesar v usta. Posvetujte se z zdravnikom.

Večja razlitja je treba obvladati s kompletom za razlitje kemikalij, vpiti v vpojnim materialom, kot je diatomejska zemlja, in odstraniti kot nevaren odpadek.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

Po končani dezinfekciji odstranite neuporabljen proizvod in embalažo v skladu z lokalnimi zahtevami oziroma veljavnimi predpisi. Uporabljeni proizvod se lahko odstrani v komunalno kanalizacijo ali odloži na gnojnico, odvisno od veljavnih predpisov. Izogibajte se izpustu v individualno čistilno napravo za odpadne vode na kmetijah.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

Zaščitite pred mrazom
Ne shranjujte pri temperaturi nad 30 °C
Rok uporabnosti 12 mesecev

6. Druge informacije

--