



Bratislava, 13. septembra 2022
Naša značka: 13588/2022-4320-90010
Ref. číslo: bio/3540/O/22/DW

DODATOK č. 2
k rozhodnutiu o obnove autorizácie biocídneho výrobku
č. SK14-MRS-007
Názov výrobku: BROS Zrno proti myšiam a krysám

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) oznamením administratívnych zmien identifikačné číslo BC-UA079369-27 predloženým dňa 24. augusta 2022 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovaných podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 1, Oddiel 1, položka 4 ako „*Zmena v názve alebo adrese držiteľa autorizácie, ktorý zotrvava v EHP.*“ a Hlava 1, Oddiel 2, položka 2 ako „*Zmena názvu, administratívnych údajov alebo miesta formulovania týkajúca sa formulátora biocídneho výrobku, pričom zloženie biocídneho výrobku a proces formulovania sa nemenia.*“ došlo podľa článku 6 ods. 3, druhý pododsek nariadenia o zmenách k zmene biocídneho výrobku. V zmysle článku 6 ods. 4 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o obnove autorizácie č. bio/874/O/18/RM zo dňa 3. apríla 2018, zmenené dodatkom č. 1 bio/4519/O/20/DP zo dňa 09. novembra 2020 mení v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/874/O/18/RM zo dňa 3. apríla 2018, zmenené dodatkom č. 1 bio/4519/O/20/DP zo dňa 09. novembra 2020 o obnove autorizácie biocídneho výrobku **BROS Zrno proti myšiam a krysám** sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
generálny riaditeľ
Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Karpia 24, 61-619 Poznań, Polsko**

Príloha 1

Bratislava, 13. septembra 2022
Naša značka: 13588/2022-4320-90010
Ref. číslo: bio/3540/O/22/DW

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	BROS Zrno proti myšiam a krysám
Obchodný názov výrobku	BROS zrno na myši a potkany

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov Adresa	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Karpia 24, 61-619 Poznań, Poľsko
Číslo autorizácie	SK14-MRS-007	
R4BP žiadosť o obnovu autorizácie č.	BC-FX016211-34	
Dátum obnovy autorizácie	03. apríla 2018	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	01. januára 2023	

1.3. Výrobcovia výrobku

Názov výrobcu	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa výrobcu	C/Tres Rieres, 10, 08292 Espanreguera (Barcelona), Španielsko
Miesto výrobných priestorov	C/Tres Rieres, 10, 08292 Espanreguera (Barcelona), Španielsko
Názov výrobcu	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adresa výrobcu	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Poľsko
Miesto výrobných priestorov	ul. Karpia 24, 61-619 Poznań, Poľsko ul. Swarzędzka 17, 62-006 Janikowo, Poľsko

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Bromadiolón
Názov výrobcu	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa výrobcu	C/Tres Rieres, 10, 08292 Espanreguera (Barcelona), Španielsko
Miesto výrobných priestorov	C/Tres Rieres, 10, 08292 Espanreguera (Barcelona), Španielsko

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Bromadiolón	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-	Účinná látka	28772-56-7	249-205-9	0,0029

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
	hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one				

2.2. Typ úpravy

Návnada na okamžité použitie: zrno

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov (krv) pri dlhšej alebo opakovanej expozícii .
Bezpečnostné upozornenia	P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pred použitím si prečítajte etiketu. P260 Nevdychujte prach. P280 Noste ochranné rukavice. P314 Ak pocit'ujete zdravotné problémy, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad v registrovanom zariadení alebo podniku v súlade s platnými právnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 - Myš domová a potkan hnedý – široká verejnosť – vo vnútri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedý Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 60g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 100g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5-10 m (v prípade veľkého zamorenia 5m, v prípade malého zamorenia 10m).
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Maximálna veľkosť balíčka 150 g Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 150 g

	Gramy/kg návnady na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 100 g Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC.
--	---

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite 5.2.

4.1.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite 5.3.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 5.5

4.2. Opis použitia

Použitie 2 - Potkan hnedy – široká verejnosť – Vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: Potkan hnedy Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov.
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: 100g návnady na deratizačnú stanicu. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5-10 m (v prípade veľkého zamorenia 5m, v prípade malého zamorenia 10m).
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosť balenia a obalový materiál	Maximálna veľkosť balíčka 150 g Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 150 g Gramy/kg návnady na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od

	10 do 100 g Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC.
--	---

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najskôr 5-7 dní po začatí deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite 5.2.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite 5.3.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 5.5

4.3. Opis použitia

Tabuľka 3. Použit' # 3 – Použitie č. 3 - Myš domová – Profesionáli – vo vnútri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, v sáčkoch alebo vo forme voľne sypaných zŕn.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 60g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5-10 m (v prípade veľkého zamorenia 5m, v prípade malého zamorenia 10m).
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový	Minimálna veľkosť balíčka 3 kg

materiál	Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 10 kg Gramy/kg nástrahy na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 60 g Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fláše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný vo forme voľne sypaných zŕn priamo vo vnútri ďalšieho obalu uvedeného vyššie.
----------	--

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Do držíte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite 5.2.

4.3.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanливosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 5.5

4.4. Opis použitia

Použitie 4 - Potkan hnedy – Profesionáli – vo vnútri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: potkan hnedy Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, v sáčkoch alebo vo forme voľne sypaných zŕn.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: 100g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5-10 m (v prípade veľkého zamorenia 5m, v prípade malého zamorenia 10m).

Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Minimálna veľkosť balíčka 3 kg Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 10 kg Gramy/kg nástrahy na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 100 g Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný vo forme voľne sypaných zŕn priamo vo vnútri ďalšieho obalu uvedeného vyššie.</p>

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najskôr 5-7 dní po začatí deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplnite návnadu.

Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Pozrite 5.2.

4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanливosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 5.5

4.5. Opis použitia

Použitie 5 - Myš domová a/alebo potkan hnedy – Profesionáli – Vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<p>Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: potkan hnedy Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci</p> <p>Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci</p>
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov.
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch

	Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, v sáčoch alebo vo forme voľne sypaných zŕn.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 60g návnady na deratizačnú staničku. Potkany: 100g návnady na deratizačnú staničku. Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými staničkami by mala byť 5-10 m (v prípade veľkého zamorenia 5m, v prípade malého zamorenia 10m).
Kategória používateľov	Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balíčka 3 kg Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 10 kg Gramy/kg nástrahy na jedno zabalene vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 100 g Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC. Okrem toho môže byť prípravok dodávaný vo forme voľne sypaných zŕn priamo vo vnútri ďalšieho obalu uvedeného vyššie.

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh). Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrdzí zaplavenie.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni (myši) a najskôr 5-7 dní (potkany) po začatí deratizácie, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.5.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlochoch.

4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 5.5

4.6. Opis použitia

Použitie 6 - Myš domová a/alebo potkan hnedy – Vyškolení profesionáli – vo vnútri

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
-------------	-------------------------------

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cielové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: potkan hnedý Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vnútorné
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, v sáčkoch alebo vo forme voľne sypaných zŕn.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: deratizačná stanička s 60-100g návnady na jedno návnadové miesto. Potkany: deratizačná stanička s 100-200g návnady na jedno návnadové miesto.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balíčka 3 kg Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 10kg. Gramy/kg návnady na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 100g. Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný vo forme voľne sypaných zŕn priamo vo vnútri ďalšieho obalu uvedeného vyššie.

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.
Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.6.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Výrobok by sa mal používať len vo vnútri a na miestach, ku ktorým sa nedostanú deti ani zvieratá, pre ktoré nie je návnada určená.

4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri 5.5

4.7. Opis použitia

Použitie 7 - Myš domová a/alebo potkan hnedý – Vyškolení profesionáli – Vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: potkan hnedý Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: Myš domová Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, v sáčkoch alebo vo forme voľne sypaných zŕn.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: deratizačná stanička s 60-100g návnady na jedno návnadové miesto. Potkany: deratizačná stanička s 100-200g návnady na jedno návnadové miesto.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balíčka 3 kg Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 10kg. Gramy/kg návnady na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 100g. Obalový materiál: vrecká, vrecia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný vo forme voľne sypaných zŕn priamo vo vnútri ďalšieho obalu uvedeného vyššie.

4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh). Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.7.2. Opatrenia na zniernenie rizika špecifické pre dané použitie

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hľadavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.
Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.
Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.
Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu s vodou.

4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite 5.4.

4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite 5.5

4.8. Opis použitia

Použitie 8 - Potkan hnédý – Vyškolení profesionáli – Otvorené plochy vonku a skládky odpadu

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Nerelevantné pre rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: potkan hnédý Vývojové štadium: Nedospelí jedinci a dospelí jedinci
Oblasti použitia	Vonkajšie Otvorené plochy vonku a skládky odpadu.
Spôsob aplikácie	Spôsob: v návnadových boxoch Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii, v sáčkoch alebo vo forme voľne sypaných zŕn.
Dávkovanie a frekvencia	Aplikačná dávka: Potkany: deratizačná stanička s 100-200g návnady na jedno návnadové miesto.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionál
Veľkosti balenia a obalový materiál	Minimálna veľkosť balíčka 3 kg Počet vreciek zabalených v jednom balení: do 10kg. Gramy/kg návnady na jedno zabalené vrecko: jednotlivé sáčky s obsahom od 10 do 100g. Obalový materiál: vrecká, vrečia, vedrá, tuby, fl'aše a sáčky. Materiál: Kartón + PET alebo LDPE, PE alebo PP alebo PET alebo LDPE alebo PET / PET MET / PE alebo PET / ALU / PE alebo PET / PE alebo PA / PE, HDPE, PVC. Okrem toho môže byť výrobok dodávaný vo forme voľne sypaných zŕn priamo vo vnútri ďalšieho obalu uvedeného vyššie.

4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh). Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Dodržujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.8.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Nepoužívajte tento výrobok priamo v brlohoch.

4.8.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo ku kontaktu s vodou.

4.8.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Pozrite 5.4.

4.8.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Pozrite 5.5.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Široká verejnosť:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnutelné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti oblasti, kde bola pozorovaná aktivita hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Ked' je to možné, deratizačné staničky musia byť pripojené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Neotvárajte vrecúška s návnadou.

Umiestnite deratizačné staničky mimo dosahu detí, vtákov, domáčich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných nerieľových zvierat.

Umiestnite deratizačné staničky mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

Profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku

alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hladavce ľahko dosiahnutel'né (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozšiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Deratizačné staničky by mali byť umiestnené do bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Ked' to je možné, musia byť deratizačné staničky pripojené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Ked' sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtahnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domáčich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných nerieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návady.

Ak sú návady po období deratizácie 35 dní ďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hladavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulančného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Na konci procesu odstraňte zvyšnú návadu a deratizačné staničky.

Pokyny na použitie, ktoré sú špecifické pre danú návadu:

Návnada vo vreckách: neotvárajte vrecká obsahujúce návadu.

Vol'né sypané zrná: umiestnite návadu do deratizačnej staničky s použitím dávkovacieho zariadenia.

Špecifikujte metódy na minimalizáciu prachu (napr. utieranie za mokra).

Vyškolení profesionáli:

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Pred umiestnením návady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hladavce ľahko dosiahnutel'né (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návady.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Ked' to je možné, musia byť deratizačné staničky pripojené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Ked' sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtahnúť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domáčich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných nerieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi

prichádzajú do styku.

Počas manipulácie s výrobkom nosť ochranné rukavice odolné voči chemickým látkam.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Frekvencia kontroly deratizovanej oblasti by mala byť ponechaná na vlastné uváženie vykonávateľa vzhľadom na prieskum vykonaný na začiatku deratizácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami príslušného kódexu osvedčených postupov.

Ak je príjem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.

Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní naďalej konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné príčiny, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídú bez antikoagulantu, ak je dostupný, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídú. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

Pokyny na použitie, ktoré sú špecifické pre danú návnadu:

Návnada vo vreckách: – neotvárajte vrecká, ktoré obsahujú návnadu.

Volné sypané zrná: umiestnite návnadu do deratizačnej staničky s použitím dávkovacieho zariadenia.

Špecifikujte metódy na minimalizáciu prachu (napr. utieranie za mokra).

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Široká verejnosť:

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Nepoužívajte antikoagulantné rodenticídy ako trvalé návnady (napr. na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na zisťovanie aktivity hlodavcov).

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)
- používateľia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčania o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Profesionáli:

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne).

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“)
- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“)
- používateľia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčania o výrobku“)

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Vyškolení profesionáli:

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

V informáciach o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistencia na účinnú látku.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnatelnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistence.

Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantrného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou deratizačné staničky ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehľnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dásná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátku: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym alebo veterinárny personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
- zasiahnutia očí vždy skontrolujte a vyberte kontaktné šošovky, vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
- orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí.

Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehľnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. V prípade potreby kontaktujte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66. Ak výrobok prehltne domáce zvieratá, spojte sa s veterinárny lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“, „obsahuje rodenticíd“, „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody volajte Národné toxikologické informačné centrum v Bratislave, tel. č.: 02/547 741 66“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonzumovanú návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Odporuča sa používanie rukavíc.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat. Doba trvanlivosti: 2 roky.

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticidy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

Tento výrobok obsahuje horkú látka a farbivo.