



TERVISEAMET

Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
Szállás u. 6
H-1107 Budapest
Ungari

23.05.2022 nr 10.1-5/22/234-1

Eesti riikliku loa EE-NAMR2017-0081 muutmine

Terviseamet muudab (NA-AAT: BC-LY075703-02) vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklile 48 biotsiidi **Protect rodentitsiid graanulid** riiklikku luba EE-NAMR2017-0081 ja asendab loa lisa käesoleva otsuse lisas (lisatud) toodud biotsiidi omaduste kokkuvõttega.

Pikendatakse loa kehtivusaega lõppkuupäevaga 01.07.2024.

Biotsiidi kättesaadavaks tegemisel peab järgima Euroopa parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artiklite 69 ja 72 nõudeid ja heakskiidetud biotsiidi omaduste kokkuvõtet.

Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 52 kohaselt on alates otsusest ajapikendus asjaomase biotsiidi olemasolevate varude turul kättesaadavaks tegemiseks 180 päeva ning nende kasutamiseks täiendavalt 180 päeva.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Enda Veskimäe
osakonnajuhataja
kemikaaliohutuse osakond

Lisa: Loa number EE-NAMR2017-0081 biotsiidi omaduste kokkuvõte, 22 lehel

ET

LISA

Biotsiidi omaduste kokkuvõte

Protect rodentitsiid graanulid

Tooteliik 14. Rodentitsiidid (kahjuritõrje)

Loa number: EE-NAMR2017-0081

R4BP registrinumber: EE-0013598-0000

1. HALDUSTEAVE

1.1. Toote kaubanduslik(ud) nimetus(ed)

Kaubanduslik nimetus	Protect rodentitsiid graanulid
----------------------	--------------------------------

1.2. Loaomanik

Loaomaniku nimi ja aadress	Nimi	Bábolna Bioenvironmental Centre Ltd.
	Aadress	Szállás u. 6., H-1107 Budapest Ungari
Loa number	EE-NAMR2017-0081	
<i>R4BP registrinumbr</i>	EE-0013598-0000	
Loa andmise kuupäev	11/06/2013	
Loa kehtivusaja lõppkuupäev	01/07/2024	

1.3. Toote tootja(d)

Tootja nimi	Babolna Bio Ltd
Tootja aadress	Szállás utca 6, 1107 Budapest Ungari
Tootmiskohtade asukoht	Köves J út 1-3, 2943 Bábolna Ungari

1.4. Toimeaine(te) tootja(d)

Toimeaine	Bromadioloon
Tootja nimi	Dr Tezza
Tootja aadress	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio Itaalia
Tootmiskohtade asukoht	Via Tre Ponti, 37050 S. Maria di Zevio Itaalia

2. TOOTE KOOSTIS JA OLEK

2.1. Kvalitatiivne ja kvantitatiivne teave toote koostise kohta

Tavanimetus	IUPAC nimetus	Funktsioon	CAS number	EÜ number	Sisaldus (%)
Bromadioloon	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Toimeaine	28772-56-7	249-205-9	0,0027

2.2. Oleku kirjeldus

RB - Sööt (kasutusvalmis)

3. OHU- JA HOIATUSLAUSED

Ohulaused	Võib kahjustada elundeid (verd) pikaajalisel või korduval kokkupuutel .
-----------	---

Hoiatuslaused	Mitte käidelda enne ohutusnõuetega tutvumist ja nendest arusaamist. Kanda kaitsekindaid. Kokkupuute või kokkupuutekahtluse korral:Pöörduda arsti poole. Hoida lukustatult. Sisu kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.
---------------	---

4. LUBATUD KASUTUSALA(D)

4.1. Kasutusala kirjeldus

Tabel 1. Kasutus # 1 – koduhiired - tavatarbijad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: koduhiir Arengustaadium: juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskohat	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Koostis: rodentitsiid graanulitena.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Söödaalus: 1 söödaalus 75 g või 90 g mürksöödaga söödama ja kohta.Kui on vajalik kasutada mitut söödama ja, peab minimaalne söödama jate vaheline kaugus olema 5 meetrit. Filterpaberist või plastikust

	<p>kotike: 20-100 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: -</p>
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 g filterpaberiga kaetud sööta paberkarbis või plastkotikeses. 1-2 alust paberkarbis või plastkotikeses. Kuni 150 g. • Kartongkarbis filterpaberist kotikesed, mis sisaldavad 10, 20, 25 või 50 g sööta. Kuni 150 g. • 20 või 25 g filterpaberi kotikesed, 2 kotikest plastikust söödakarbis. 1 või 2 karpi paberkarbis. • Pappkarbis, plastkotikeses või metallkarbis plastikust või aroomi läbilaskvad kotikesed, mis sisaldavad 50, 100 või 150 g sööta. Kuni 150 g. • Plastist kotike, mis sisaldab 100 või 150 g sööta, kartongkarbis. Kuni 150 g. • Plastist kotike, mis sisaldab 50, 100 või 150 g sööta (ühekordne annus). Kuni 150 g.

4.1.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puutunud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.

4.1.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

-

4.1.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

-

4.1.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.1.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.2. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 2. Kasutus # 2 – rotid - tavatarbijad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: <i>Rattus norvegicus</i> Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskohat	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas Koostis: rodentitsiid graanulitena.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: Söödaalus: 1 söödaalus 150g mürksöödaga või 2 söödaalust 75g või 90g mürksöödaga söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Filterpaberist või plastikust kotike: 150 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Lahjendus (%): -

	Kasutamise arv ja ajastus: -
Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 g filterpaberiga kaetud sööta paberkarbis või plastkotikeses. 1-2 alust paberkarbis või plastkotikeses. Kuni 150 g. • Kartongkarbis filterpaberist kotikesed, mis sisaldavad 10, 20, 25 või 50 g sööta. Kuni 150 g. • 20 või 25 g filterpaberi kotikesed, 2 kotikest plastikust söödakarbis. 1 või 2 karpi paberkarbis. • Pappkarbis, plastkotikeses või metallkarbis plastikust või aroomi läbilaskvad kotikesed, mis sisaldavad 50, 100 või 150 g sööta. Kuni 150 g. • Plastist kotike, mis sisaldab 100 või 150 g sööta, kartongkarbis. Kuni 150 g. • Plastist kotike, mis sisaldab 50, 100 või 150 g sööta (ühekordne annus). Kuni 150 g.

4.2.1. *Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid*

Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje alguses alles viie kuni seitsme päeva möödumisel ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürgsööta on puutunud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürgsööta.

4.2.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

-

4.2.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

-

4.2.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.2.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.3. Kasutusala kirjeldus

Tabel 3. Kasutus # 3 – rotid - tavatarbijad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskohat	Välitingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Koostis: rodentitsiid graanulitena.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	Kasutusmäär: 1 söödaalus 150g mürksöödaga või 2 söödaalust 75g või 90g mürksöödaga söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Filterpaberist või plastikust kotike: 150 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Lahjendus (%): - Kasutamise arv ja ajastus: -

Kasutajarühm(ad)	Tavatarbija (mittekutseline kasutaja)
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 g filterpaberiga kaetud sööta paberkarbis või plastkotikeses. 1-2 alust paberkarbis või plastkotikeses. Kuni 150 g. • Kartongkarbis filterpaberist kotikesed, mis sisaldavad 10, 20, 25 või 50 g sööta. Kuni 150 g. • 20 või 25 g filterpaberi kotikesed, 2 kotikest plastikust söödakarbis. 1 või 2 karpi paberkarbis. • Pappkarbis, plastkotikeses või metallkarbis plastikust või aroomi läbilaskvad kotikesed, mis sisaldavad 50, 100 või 150 g sööta. Kuni 150 g. • plastist kotike, mis sisaldab 100 või 150 g sööta, kartongkarbis. Kuni 150 g. • Plastist kotike, mis sisaldab 50, 100 või 150 g sööta (ühikordne annus). Kuni 150 g.

4.3.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.

Vahetada söödamajas olev mürgsööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.

Söödamajad tuleb üle vaadata tõrje algusest alates alles viie kuni seitsme päeva möödumisel ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürgsööta on puutunud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürgsööta.

4.3.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

-

4.3.3. Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed

hädaolukorras.

-

4.3.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.3.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.4. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 4. Kasutus # 4 – koduhiired - kutselised kasutajad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: <i>Mus musculus</i> Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskoh	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Koostis: rodentitsiid graanulitena.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Lahtine mürksööt: 50-100 g söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Söödaalus: 1 söödaalus 75g või 90g mürksöödaga söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Filterpaberist kotike: 20-100 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: -</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 või 175 g filterpaberiga kaetud sööta, paberkarbis. Kuni 20 kg. • Filterpaberi kotikesed, mis sisaldavad 20, 25 või 50 g sööta, pappkarbis. Kuni 20 kg. • Lahtiselt plastämbris. Kuni 20 kg. • Lahtiselt pabertünnis. Kuni 30 kg. • Lahtiselt plastkotikestes pappkarbis. Kuni 25 kg. • Lahtiselt paberkotis. Kuni 25 kg.

4.4.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata alles 2-3 päeva möödudes ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puutunud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.

- Järgida asjaomase heade tavade põhimõtte kohaseid lisajuhiseid.

4.4.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.4.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.4.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.4.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.5. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 5. Kasutus # 5 – rotid - kutselised kasutajad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskoh	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürgsööt kasutamiseks muukimiskindlas söödajas. Koostis: rodentitsiid graanulitena.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: Lahtine mürksööt: 200-250 g mürksööta söödama ja kohta. Kui on vaja kasutada rohkem kui ühte söödama ja, siis minimaalne söödama jate vahekaugus on 7 m (näri liste kõrge arvukuse korral) kuni 10 m (näri liste madala arvukuse korral). Söödaalus: 1 söödaalus 125g, 150g või 175g mürksöödaga või 2 söödaalust 75g või 100g mürksöödaga söödama ja kohta. Kui on vaja kasutada rohkem kui ühte söödama ja, siis minimaalne söödama jate vahekaugus on 7 m (näri liste kõrge arvukuse korral) kuni 10 m (näri liste madala arvukuse korral). Filterpaberist kotike: 200-240 g mürksööta söödama ja kohta. Kui on vaja kasutada rohkem kui ühte söödama ja, siis minimaalne söödama jate vahekaugus on 7 m (näri liste kõrge arvukuse korral) kuni 10 m (näri liste madala arvukuse korral).</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: -</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plast, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 või 175 g filterpaberiga kaetud sööta, paberkarbis. Kuni 20 kg. • Filterpaberi kotikesed, mis sisaldavad 20, 25 või 50 g sööta, pappkarbis. Kuni 20 kg. • Lahtiselt plastämbris. Kuni 20 kg. • Lahtiselt pabertünnis. Kuni 30 kg. • Lahtiselt plastkotikestes pappkarbis. Kuni 25 kg. • Lahtiselt paberkotis. Kuni 25 kg.

4.5.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata alles alates 5-7 päeva möödudes ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on puutunud ja söödama jate on kahjustamata, ning eemaldada näri liste laibad.

- Vajadusel lisada mürksööta.

- Järgida asjaomase heade tavade põhimõtte kohaseid lisajuhiseid.

4.5.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

-

4.5.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Söödamajade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.5.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.5.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.6. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 6. Kasutus # 6 – koduhiired/rotid - kutselised kasutajad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskoh	Välitingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürgsööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Koostis: rodentitsiid graanulitena.

Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: - Hiirte tõrjeks: Lahtine mürksööt: 50-100 g sööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Söödaalus: 1 söödaalus 75g või 90g mürksöödaga söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. Filterpaberist kotike: 20-100 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vajalik kasutada mitut söödamaja, peab minimaalne söödamajade vaheline kaugus olema 5 meetrit. - Rottide tõrjeks: Lahtine mürksööt: 200-240 g söödamaja kohta. Kui on vaja kasutada rohkem kui ühte söödamaja, siis minimaalne söödamajade vahekaugus on 7 m (näriliste kõrge arvukuse korral) kuni 10 m (näriliste madala arvukuse korral). Söödaalus: 1 söödaalus 125g, 150g või 175g mürksöödaga või 2 söödaalust 75g või 100g mürksöödaga söödamaja kohta. Kui on vaja kasutada rohkem kui ühte söödamaja, siis minimaalne söödamajade vahekaugus on 7 m (näriliste kõrge arvukuse korral) kuni 10 m (näriliste madala arvukuse korral). Filterpaberist kotike: 200-240 g mürksööta söödamaja kohta. Kui on vaja kasutada rohkem kui ühte söödamaja, siis minimaalne söödamajade vahekaugus on 7 m (näriliste kõrge arvukuse korral) kuni 10 m (näriliste madala arvukuse korral).</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: -</p>
Kasutajarühm(ad)	Kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 või 175 g filterpaberiga kaetud sööta, paberkarbis. Kuni 20 kg. • Filterpaberi kotikesed, mis sisaldavad 20, 25 või 50 g sööta, pappkarbis. Kuni 20 kg. • Lahtiselt plastämbris. Kuni 20 kg. • Lahtiselt pabertünnis. Kuni 30 kg. • Lahtiselt plastkotikestes pappkarbis. Kuni 25 kg. • Lahtiselt paberkotis. Kuni 25 kg.

4.6.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Kaitsta mürksööta ilmastikuolude (nt vihm, lumi jne) eest. Asetada söödamajad kohtadesse, kus ei teki üleujutust.

- Söödamajad tuleb tõrjet alustades üle vaadata, hiirte puhul – vähemalt iga kahe-kolme päeva tagant, rottide puhul – alles viie kuni seitsme päeva möödumisel ning edaspidi vähemalt kord nädalas, et kontrollida, kas mürksööta on kasutatud ja söödamajad on kahjustamata, ning eemaldada näriliste laibad. Vajadusel lisada mürksööta.

- Vahetada söödamajas olev mürksööt välja, kui see on saanud veekahjustusi või saastunud mustuse tõttu.

- Järgida asjaomase heade tavade põhimõtte kohaseid lisajuhiseid.

4.6.2. *Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed*

Mitte asetada toodet otse urgu.

4.6.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Söödamajade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.6.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.6.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.7. **Kasutusala kirjeldus**

Tabel 7. Kasutus # 7 – koduhiired/rotid - kahjuritõrjujad - siseruumis

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskoht	Sisetingimustes Siseruumis
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus: Kasutusvalmis mürgsööt kasutamiseks muukimiskindlas söödamajas. Kaetud ja kaitstud söödakohad seni, kuni need pakuvad mittedihtliikidele ja

	inimestele samaväärset kaitset kui muukimiskindlad söödamajad.
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: - Hiirte tõrjeks: Lahtine mürksööt: 50-100 g söödamaja kohta. Söödaalus: 1 söödaalus 75g või 90g mürksöödaga söödamaja kohta. Filterpaberist kotike: 20-100 g mürksööta söödamaja kohta. - Rottide tõrjeks: Lahtine mürksööt: 200-240 g söödakoha kohta. Söödaalus: 1 söödaalus 125g, 150g või 175g mürksöödaga või 2 söödaalust 75g või 100g mürksöödaga söödamaja kohta. Filterpaberist kotike: 200-250 g mürksööta söödamaja kohta. Pidevalt väljapandav mürksööt: 50-250g söödamaja kohta.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: -</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 või 175 g filterpaberiga kaetud sööta, paberkarbis. Kuni 20 kg. • Filterpaberi kotikesed, mis sisaldavad 20, 25 või 50 g sööta, pappkarbis. Kuni 20 kg. • Lahtiselt plastämbris. Kuni 20 kg. • Lahtiselt pabertünnis. Kuni 30 kg. • Lahtiselt plastkotikestes pappkarbis. Kuni 25 kg. • Lahtiselt paberkotis. Kuni 25 kg.

4.7.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

- Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.

Pidevalt väljapandav mürksööt

- Võimaluse korral on soovitatav tõrjeala üle vaadata vähemalt iga nelja nädala tagant, et vältida resistentse populatsiooni teket.

- Järgida asjaomase heade tavade põhimõtte kohaseid lisajuhiseid.

4.7.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid)

kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva heade tavade põhimõttega].

- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada korduvsissetungi tõenäosust.
- Teise mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase heade tavade põhimõtte kohaste soovitusetega.
- Pidevalt väljapandavat mürgsööta kasutada ainult suure korduvsissetungi potentsiaaliga kohtades, kus teised tõrjemeetodid ei toimi.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürgsöödana.

Pidevalt väljapandav mürgsööta:

- Pidevalt väljapandavat mürgsööta kasutada ainult suure korduvsissetungi potentsiaaliga kohtades, kus teised tõrjemeetodid ei toimi.
- Pidevalt väljapandava mürgsöödaga kahjuritõrje läbiviimise plaani tuleb lisada integreeritud kahjuritõrje programm (IPM) ning korduvleviku riski hindamise kohaselt korrapäraselt läbi vaadata.

4.7.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Söödakohtade asetamisel veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürgsööda sattumist vette.

4.7.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.7.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

4.8. Kasutusala kirjeldus

Tabel 8. Kasutus # 8 – koduhiired/rotid - kahjuritõrjujad - väliskeskkonnas hoonete ümber

Tooteliik	Tooteliik 14 - Rodentitsiidid (kahjuritõrje)
Vajadusel lubatud kasutusala täpne kirjeldus	Pole kohane rodentitsiididele.
Sihtorganism(id) (sh arengujärgus)	Teaduslik nimetus: Rattus norvegicus Tavanimetus: Rändrott Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud Teaduslik nimetus: Mus musculus Tavanimetus: Koduhiir Arengustaadium: Juveniilid ja täiskasvanud
Kasutuskoht	Välistingimustes Väliskeskkonnas hoonete ümber
Kasutusmeetod(id)	Meetod: Kasutamine söödana Üksikasjalik kirjeldus:

	<p>Kasutusvalmis mürksööt kasutamiseks muukimiskindlas söödajas.</p> <p>Kaetud ja kaitstud söödakohad : seni, kuni need pakuvad mittesihikliikidele ja inimestele samaväärset kaitset kui muukimiskindlad söödajad.</p>
Kasutuskogus(ed) ja sagedus	<p>Kasutusmäär: -Hiirte tõrjeks: Lahtine mürksööt: 50-100 g söödaja kohta. Söödaalus: 1 söödaalus 75g või 90g mürksöödaga söödaja kohta. Filterpaberist kotike: 20-100 g mürksööta söödaja kohta. Rottide tõrjeks: Lahtine mürksööt: 200-250 g söödaja kohta. Söödaalus: 1 söödaalus 125g, 150g või 175g mürksöödaga või 2 söödaalust 75g või 100g mürksöödaga söödaja kohta. Filterpaberist kotike: 200-240 g mürksööta söödaja kohta. Pidevalt väljapandav mürksööt: 50-250g söödaja kohta.</p> <p>Lahjendus (%): -</p> <p>Kasutamise arv ja ajastus: -</p>
Kasutajarühm(ad)	Väljaõppe saanud kutseline kasutaja
Pakendi suurused ja pakendimaterjal	<ul style="list-style-type: none"> • Plastalus, mis sisaldab 75, 90, 125, 150 või 175 g filterpaberiga kaetud sööta, paberkarbis. Kuni 20 kg. • Filterpaberi kotikesed, mis sisaldavad 20, 25 või 50 g sööta, pappkarbis. Kuni 20 kg. • Lahtiselt plastämbris. Kuni 20 kg. • Lahtiselt pabertünnis. Kuni 30 kg. • Lahtiselt plastkotikestes pappkarbis. Kuni 25 kg. • Lahtiselt paberkotis. Kuni 25 kg.

4.8.1. Kasutusala spetsiifilised kasutusjuhendid

Eemaldada kasutamata mürksööt tõrje lõpus.

Pidevalt väljapandav mürksööt:

Võimaluse korral on soovitatav tõrjeala üle vaadata vähemalt iga nelja nädala tagant, et vältida resistentse populatsiooni teket.

- Järgida asjaomase heade tavade põhimõtte kohaseid lisajuhiseid.

Kaetud ja kaitstud söödakohad:

- Väliskeskkonnas kasutamisel katta ja asetada söödakohad strateegilistesse kohtadesse, et vähendada kokkupuudet mitte sihtloomadega.

- Järgida asjaomase heade tavade põhimõtte kohaseid lisajuhiseid.

4.8.2. Kasutusala spetsiifilised riskivähendamismeetmed

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva heade tavade põhimõttega].

- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada korduvsissetungi tõenäosust.

- Teise mürgistuse ohu vähendamiseks otsida ja eemaldada surnud närilised tõrjel kindla aja tagant kooskõlas asjaomase heade tavade põhimõtte kohaste soovitustega.
- Pidevalt väljapandavat mürksööta kasutada ainult suure korduvsissetungi potentsiaaliga kohtades, kus teised tõrjemeetodid ei toimi.
- Mitte kasutada toodet perioodiliselt väljapandava mürksöödana.

Pidevalt väljapandav mürksööt:

- Pidevalt väljapandavat mürksööta kasutada ainult suure korduvsissetungi potentsiaaliga kohtades, kus teised tõrjemeetodid ei toimi.
- Pidevalt väljapandava mürksöödaga kahjuritõrje läbiviimise plaani tuleb lisada integreeritud kahjuritõrje programm (IPM) ning korduvleviku riski hindamise kohaselt korrapäraselt läbi vaadata.

4.8.3. *Vajadusel tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras.*

Söödakohtade asetamisel veekogude (nt jõed, tiigid, veekanalid, tammid, niisutuskraavid) või veeäravoolusüsteemide lähedusse tuleb vältida mürksööda sattumist vette.

4.8.4. *Vajadusel juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks.*

-

4.8.5. *Vajadusel toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes.*

-

5. ÜLDISED KASUTAMISJUHISED¹

5.1. Kasutusjuhendid

Tavatarbijad:

- Lugeda enne kasutamist tooteinfot ja järgida seda või muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet.
- Enne näriliste mürksööda kasutamist kaaluda kemikaalivabu tõrjemeetodeid (nt püünised).
- Eemaldada toit (nt mahapudenenu vilid või toidujäätmed) närilistele kätte saadavatest kohtadest.
- Kui eelnev väljaarvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näriliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust.
- Söödamajad tuleb paigutada võimalikult lähedale kohtadele, kus on märgatud näriliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, söögikohad, augud, urud jne).
- Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge.
- Asetada söödamajad lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mitte sihtloomadele kättesaamatusse kohta.
- Asetada söödamajad eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest eemale.
- Söödamajasid mitte asetada veeäravoolusüsteemide lähedusse, kus need võivad kokku puutuda veega.
- Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Pärast toote käitlemist pesta käed ja otseselt tootega kokku puutunud nahapind.
- Eemaldada tõrje lõppemisel tarvitamata mürksööt või söödamajad.

Filterpaberist kotikeses oleva mürksööda kasutamisel: Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.

Kutselised kasutajad ja kahjuritõrjujad:

- Enne kasutamist lugeda tooteinfot ja muud tootele lisatud või müügikohas antud teavet ning järgida seda.
- Enne kahjuritõrje alustamist uurida levikuala ja läbi viia kontroll, et määrata kindlaks näriliste liigid, nende elutegevuse kohad ning leviku tõenäoline põhjus ja ulatus.

¹ Käesolevas jaotises esitatud kasutusjuhised, riskivähendusmeetmed ja muud kasutamisharjumused kehtivad iga lubatud kasutuse puhul.

- Eemaldada närilistele kättesaadav toit (nt mahapudenunud vili või toidujäätmed).
Kui eelnev väljaarvata, mitte puhastada levikuala vahetult enne tõrje tegemist, sest see häirib näriliste populatsiooni ja vähendab mürksööda atraktiivsust.
- Toodet tuleb kasutada ainult osana integreeritud kahjuritõrje programmist (IPM), kuhu kuuluvad muu hulgas hügieenimeetmed ja võimaluse korral füüsilised ohjemeetmed.
- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada korduvsissetungi tõenäosust.
- Toode tuleb paigutada võimalikult lähedale kohtadele, kus on märgatud näriliste elutegevust (nt liikumisteed, pesitsuskohad, söögikohad, augud, urud jne).
- Võimaluse korral tuleb söödamajad kinnitada maapinnale või konstruktsioonide külge.
- Söödamajad tuleb selgelt märgistada, et oleks selge, et need sisaldavad näriliste tõrjevahendit ning neid ei tohi liigutada ega avada (vt jaotis 5.3 etiketile märgitava teabe kohta).
- Kui toodet kasutatakse avalikes kohtades, tuleb tõrjealad tõrjeks märgistada ning mürksöötade juurde tuleb paigaldada teave antikoagulantist tingitud esmase või teisese mürgistuse ohu kohta ja kirjeldada mürgistuse korral võetavaid esmaabimeetmeid.
- Mürksööt tuleb kinnitada nii, et seda ei saaks söödamajast eemaldada.
- Asetada toode lastele, lindudele, lemmikloomadele, kodu- ja muudele mitte sihtloomadele kättesaamatusse kohta.
- Asetada toode eemale toidust, joogist ja loomasöödast, samuti nendega kokkupuutuvatest nõudest või pindadest.
- Kanda toote käitlemisel kemikaalikiindlaid kaitsekindaid
- Toote käitlemisel mitte süüa, juua ega suitsetada. Peale toote käitlemist pesta käed ja otseselt kokku puutunud nahapind.
- Tõrjealale mineku sageduse otsustab töötaja vastavalt tõrje alguses tehtud uurimisele.
See sagedus peab vastama asjaomase heade tavade põhimõtte kohastele soovitudele.
- Kui mürksööta tarvitatakse vähe võrreldes arvukusega, kaaluda söödamajade ümberpaigutamist ja võimalust vahetada mürksööt teise koostisega mürksööda vastu.
- Kui pärast 35 päevase tõrje möödumist jätkub mürksööda tarvitamine ning näriliste tegevuse vähenemist ei ole märgata, tuleb kindlaks teha selle tõenäoline põhjus.
Kui muud põhjused on välistatud, on tõenäoline, et närilised on resistentsed, mistõttu tuleb kaaluda mitte-antikoagulantse rodentitsiidi või tugevama toimega antikoagulantse rodentitsiidi kasutamist.
Samuti kaaluda alternatiivse ohjemeetmena lõksude kasutamist.
- Eemaldada kasutamata mürksööt või söödamajad tõrje lõpus.
- Filterpaberist kotikeses oleva mürksööda kasutamisel: Mitte avada mürksööta sisaldavaid kotikesi.

5.2. Riskivähendamismeetmed

Tavatarbijad:

- Kasutada ennetavaid tõrjemeetmeid (avade sulgemine, kättesaadava toidu ja joogi eemaldamine võimalikult suures ulatuses), et suurendada toote tarvitamist ja vähendada korduvsissetungi tõenäosust.
- Antikoagulantset näriliste tõrjevahendit mitte kasutada pidevalt väljapandava mürksöödana (nt näriliste leviku ennetamiseks või nende elutegevuse tuvastamiseks).
- Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et:
 - toodet tuleb kasutada selleks ettenähtud muukimiskindlates söödamajades (nt „kasutada ainult muukimiskindlas söödamajas”).
 - kasutajad peavad märgistama söödamajad nõuetekohaselt vastavalt toote omaduste kokkuvõtte jaos 5.3 viidatud teabele (nt „märgistada söödamajad vastavalt tootel olevatele soovitudele”).
- Selle toote kasutamine peaks närilised kõrvaldama 35 päeva jooksul.
- Tooteinfos (st etiketil ja/või kasutusjuhendil) tuleb anda selge soovitus, et kui tõrje lõppedes tekib kahtlus toime tõhususe suhtes (st näriliste elutegevust on veel märgata), tuleb kasutajal pöörduda nõu saamiseks toote tarnija või kahjuritõrjuja poole.
- Otsida üles surnud närilised ja eemaldada need tõrje ajal vähemalt sama sageli, kui toimub söödamajade kontroll.
- Kõrvaldada surnud närilised kahekordses kilekotis olmeprügina.

Kutselised kasutajad ja kahjuritõrjujad:

- Võimaluse korral teavitada enne tõrje alustamist võimalikke kõrvalisi isikuid (nt tõrjeala ja ümbruse kasutajaid) kahjuritõrjest [kooskõlas kehtiva heade tavade põhimõttega, kui see on olemas].
- Tooteinfos (st etiketil ja/või pakendi infolehel) peab olema selgelt kirjas, et toodet tohib tarnida ainult kahjuritõrjujatele, kellel on nõuetekohane kutsetunnistus (nt „ainult kahjuritõrjujatele.“)

- Mitte kasutada kohtades, kus võib kahtlustada resistentsust toimeaine suhtes.
 - Mitte kasutada tooteid üle 35 päeva ilma leviku olukorda ja tõrje tõhusust hindamata [välja arvatud juhul, kui pidevalt väljapandav mürksööt on lubatud].
 - Mitte kasutada vaheldumisi samase või nõrgema toimega erinevaid antikoagulante, et vältida resistentsuse teket. Vajaduse korral kasutada mitte-antikoagulantset rodentitsiidi või võimalusel tugevama toimega antikoagulantset rodentitsiidi.
 - Mitte pesta söödamajasid või kaetud ja kaitstud söödakohtades kasutatud nõusid veega enne uuesti mürksööda lisamist.
 - Kõrvaldada surnud närilised ohtlike jäätmete kogumispunkti.
- Kutselistele kasutajatele ja kahjuritõrjajatele müüdavad lahtisi viljaterasid sisaldavad pakendid: toote väljavalamisel kasutada sobivat (ühekordselt kasutatavat) respiraatorit.

5.3. Tõenäoline otsene või kaudne kahjulik toime, esmaabimeetmed ja keskkonnakaitsemeetmed hädaolukorras

- See toode sisaldab antikoagulanti. Allaneelamisel võivad sümptomid avalduda hiljem, milleks on ninaverejooks ja igemete veritsus. Raskematel juhtudel võivad tekkida verevalumid ja roojas või uriinis võib esineda verd.

– Vastumürk: K1-vitamiin, mida tohib manustada ainult arst/veterinaararst.

Toote:

– nahale sattumisel, pesta nahka veega ning seejärel vee ja seebiga.

– silma sattumisel, alati kontrollida ja eemaldada kontaktläätsed, hoida silmalauge avatuna ja loputada silmi füsioloogilise lahuse või veega vähemalt 10 minutit.

– allaneelamisel, loputada suud hoolikalt veega. Mitte manustada teadvuseta inimesele midagi suukaudselt. Mitte esile kutsuda oksendamist. Allaneelamisel pöörduda viivitamata arsti poole ja näidata toote pakendit või etiketti [Mürgistusteabekeskuse number 16662].

Kui lemmikloom on toodet alla neelanud, pöörduda veterinaararsti poole.

- Söödamajad tuleb märgistada järgneva infoga: „mitte liigutada ega avada“; „sisaldab näriliste tõrjevahendit“; „tootenimi või loa number“; „toimeaine(d)“ ja „õnnetusjuhtumi korral helistada mürgistusteabekeskusesse: numbril 16662“.

– Ohtlik elusloodusele.

5.4. **Juhised toote ja selle pakendi ohutuks hävitamiseks**

Kõrvaldada tõrje lõppemisel kasutamata mürksööt ja pakend vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Soovitav on kasutada kindaid.

5.5. **Toote ladustamistingimused ja säilivusaeg normaalsetes ladustamistingimustes**

– Hoida kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida mahutit suletuna ja kaitstuna otsese päikesevalguse eest.

– Hoida lastele, lindudele, lemmikloomadele ja koduloomadele kättesaamatus kohas.

– Säilivusaeg: 24 kuud

6. **MUU TEAVE**

– Antikoagulantsed näriliste tõrjevahendid mõjuvad viibega saavutades tõhususe 4–10 päeva jooksul pärast mürksööda tarvitamist.

– Närilised võivad olla haigus kandjad. Mitte puutuda surnud närilisi paljaste kätega, vaid kasutada nende kõrvaldamiseks kindaid või abivahendeid nagu tangid.

– Toode sisaldab mõruainet ja värvainet.