

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: 8.1 Iocid 30

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Broj odobrenja: EU-0022265-0000

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): EU-0022265-0011

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	2
2. Sastav i formulacija proizvoda	3
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	3
2.2. Vrsta formulacije	3
3. Oznake opasnosti i obavijesti	4
4. Odobrena uporaba	4
5. Opće upute za uporabu	8
5.1. Upute za uporabu	8
5.2. Mjere za smanjenje rizika	9
5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	9
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	9
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	9
6. Ostale informacije	9

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

Iocid 30
Iodo 30
Dufa dine
Iodin Surface Disinfectant 2,8%

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	CID LINES NV
	Adresa	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Broj odobrenja	EU-0022265-0000 1-8	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	EU-0022265-0011	
Datum odobrenja	03/09/2020	
Datum isteka odobrenja	31/08/2030	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	CID LINES NV
Adresa proizvođača	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija
Lokacija proizvodnih pogona	Waterpoortstraat 2 8900 Ieper Belgija

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	1319 - Jod
Naziv proizvođača	SQM S.A.
Adresa proizvođača	Los Militares, Piso 4 4290 Santiago Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Nueva Victoria plant 00 Pedro de Valdivia Čile

Aktivna tvar	1319 - Jod
Naziv proizvođača	Cosayach Nitratos S.A.
Adresa proizvođača	Amunategui 178 00 Santiago Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čile

Aktivna tvar	1319 - Jod
Naziv proizvođača	ACF Minera S.A.
Adresa proizvođača	San Martin No 499 00 Iquique Čile
Lokacija proizvodnih pogona	Lagunas mine 00 Pozo Almonte Čile

Aktivna tvar	1319 - Jod
Naziv proizvođača	ISE Chemicals Corporation
Adresa proizvođača	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokio Japan
Lokacija proizvodnih pogona	3695 Kitaimaizumi 299-3201 Oamishirasato city Japan

Aktivna tvar	1349 - Polivinilpirolidon jod
Naziv proizvođača	ISP Chemicals LLC, Affiliate of Ashland Inc
Adresa proizvođača	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	455 N. main st (HWY 95) KY 42029 Calvert City Sjedinjene Američke Države
Aktivna tvar	1349 - Polivinilpirolidon jod
Naziv proizvođača	Pantheon FZE (DMCC branch)
Adresa proizvođača	403, Reef Tower, Jumeira Lake Tower Shaikh Zayed Road 00 Dubai Ujedinjeni Arapski Emirati
Lokacija proizvodnih pogona	Cala Cala 00 Pozo Almonte Čile

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Jod		Aktivna tvar	7553-56-2	231-442-4	2,8
Polivinilpirolidon jod		Aktivna tvar	25655-41-8		0
Alkoholi, C12-15, etoksilirani	Alkoholi, C12-15, etoksilirani		68131-39-5	500-195-7	7,93
Fosforna kiselina	Fosforna kiselina		7664-38-2	231-633-2	11,25
Alkohol C9-11 + 6 EO	Alkohol C9-11 + 6 EO		68439-46-3		12,5

2.2. Vrsta formulacije

SL -topivi koncentrat

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja

Može nagrizzati metale.

Nadražuje kožu.

Uzrokuje teške ozljede oka.

Može uzrokovati oštećenje organa (štitnjače) tijekom produžene ili ponavljane izloženosti (oralno).

Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznake obavijesti

Nositi zaštitne rukavice.

Nositi zaštitno odijelo.

Nositi zaštitu za oči.

Nositi zaštitu za lice.

U SLUČAJU DODIRA S OČIMA:Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.Ukloniti kontaktne leće ukoliko ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje.

U SLUČAJU DODIRA S KOŽOM (ili kosom):Odmah skinuti svu zagađenu odjeću.Isprati kožu vodom.

Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Pri otežanom disanju:Nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika.

Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

Sakupiti proliveno/rasuto.

Odložiti sadržaj u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

Odložiti spremnik u/na odlagalište za opasni ili poseban otpad, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisom.

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - Vrsta proizvoda 04 – Koncentrirano površinsko sredstvo za dezinfekciju u kuhinjama i u prehrambenoj industriji, jod

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 04: Dezinfekcijska sredstva na području hrane i hrane za životinje (dezinficijensi)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

**Ciljni organizam(mi)
(uključujući razvojnu fazu)**

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: bakterije
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: nema podataka
Uobičajeno ime: kvasci
Stadij razvoja: nema podataka

Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Neporozna površinska dezinfekcija u profesionalnim kuhinjama i u prehrambenoj industriji

Načini primjene

Prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom -
/

**Broj i vremenski raspored
primjena**

Preporučuje se 0,04 l otopine za svaki kvadratni metar koji je potrebno dezinficirati. -
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca: 0,015 % joda -
Dnevna uporaba

Kategorije korisnika

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni
materijal**

1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l
HDPE

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

- Uporaba u profesionalnim kuhinjama (vrsta proizvoda 4) i u prehrambenoj industriji (vrsta proizvoda 4):

Proizvod je potrebno razrijediti vodom prije uporabe (prema tablici u nastavku).

Temeljito očistiti površine deterdžentom prije dezinfekcije. Isprati čistom vodom i ukloniti višak vode.

Proizvod se koristi u profesionalnim kuhinjama (površinska dezinfekcija): Učestalost je jedanput dnevno.

Proizvod se koristi u prehrambenoj industriji (površinska dezinfekcija): Učestalost je jedanput dnevno.

Koristiti na sobnoj temperaturi.

Proizvod se nanosi prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je površina potpuno mokra. Pustiti da djeluje najmanje 15 minuta te nakon toga isprati površine čistom vodom.

Primjer proizvoda koji sadrži 3 % joda*

Razrjeđivanje proizvoda

Kontaktno vrijeme

Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca

0,5 % (5 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)

15 min

*Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 2,5 do 3 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda.

Ne smije se miješati s drugim kemikalijama.

Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije, zaštitno odijelo (materijal treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.
- Tijekom prskanja proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije i zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).
- Čuvati izvan dohvata djece.
- Javnost i životinje potrebno je držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - Vrsta proizvoda 03 – Koncentrirano površinsko sredstvo za dezinfekciju za veterinarsku uporabu, jod

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	-
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: bakterije Stadij razvoja: nema podataka Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: kvasci Stadij razvoja: nema podataka

	Znanstveno ime: nema podataka Uobičajeno ime: virusi Stadij razvoja: nema podataka
Područje primjene	u zatvorenom prostoru Neporozna površinska dezinfekcija u veterinarskom području
Načini primjene	Prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom - /
Broj i vremenski raspored primjena	Preporučuje se 0,04 l otopine za svaki kvadratni metar koji je potrebno dezinficirati. - Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca: 0,025 % joda u uporabi Virucidna djelotvornost: 0,035 % joda u uporabi - Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi.
Kategorije korisnika	profesionalac
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	1 l, 5 l, 10 l, 20 l, 25 l, 30 l, 60 l, 200 l, 600 l, 1000 l HDPE

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

<u>Koristiti u veterinarskom području (vrsta proizvoda 3), površinska dezinfekcija:</u>		
Proizvod je potrebno razrijediti vodom prije uporabe (prema tablici u nastavku).		
Temeljito očistiti površine deterdžentom prije dezinfekcije. Isprati čistom vodom i ukloniti višak vode.		
Proizvod se koristi za dezinfekciju nastambi za svinje, krave i perad.		
Nanositi proizvod prskanjem ručnom ili automatiziranom prskalicom. Osigurati da je površina potpuno mokra. Pustiti da djeluje najmanje 30 minuta. Nastamba za životinje mora biti prazna tijekom primjene i životinje ponovno mogu ući u nastambu 24 sata nakon završetka primjene.		
Primjer proizvoda koji sadrži 2,5 % joda*	Razrjeđivanje proizvoda	Kontaktno vrijeme
Djelotvornost protiv bakterija i kvasaca	1 % (10 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)	30 min
Virucidna djelotvornost	1,4 % (14 ml proizvoda, dodati do 1 l vode)	30 min
*Na svakoj naljepnici proizvoda potrebno je navesti informacije o načinu razrjeđivanja. Budući da se koncentrirani jod u proizvodima u ovom meta SPC-u može kretati od 2,5 do 3 %, ovdje nije moguće navesti sva razrjeđivanja proizvoda.		
Ne smije se miješati s drugim kemikalijama. Ne smije se pripremiti više tekućine nego što je potrebno.		

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

- Tijekom lijevanja i pumpanja koncentriranog proizvoda: Nositi rukavice otporne na kemikalije, zaštitno odijelo (materijal treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu) i opremu za zaštitu očiju/lica.
- Tijekom prskanja proizvodom: Nositi rukavice otporne na kemikalije i zaštitno odijelo (barem tip X, EN XXXXX) koji su nepropusni za biocidni proizvod (materijal rukavica i zaštitnog odijela treba utvrditi nositelj odobrenja u okviru informacija o proizvodu).
- Koristiti dnevno samo jednu vrstu proizvoda koji sadrži jod.
- Zbog mogućeg problema za ljudsko zdravlje, isti profesionalni korisnik ne smije provoditi dezinfekciju nastambi za životinje više od 3 puta mjesečno i ne smije koristiti proizvode na bazi joda u druge svrhe tijekom tog razdoblja. • Zbog mogućeg problema za zdravlje životinja, dezinfekcija staja ne bi se trebala provoditi više od jedanput godišnje ili jedanput u životnom vijeku za telad i svinje. Hranilišta moraju biti pokrivena tijekom primjene.

- Čuvati izvan dohvata djece.
- Javnost i životinje potrebno je držati podalje od tretiranih područja dok se površine ne osuše.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidjeti opću uputu o uporabi.

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Vidjeti opću uputu o uporabi.

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Vidjeti upute specifične za uporabu.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidjeti mjere za smanjenje specifičnih rizika pri uporabi.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Nakon dodira proizvoda s okom: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjaju. Nastaviti ispiranje. Zatražiti hitnu liječničku pomoć ako bol, treptanje, suzenje ili crvenilo ne prestaju.

Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.

Nakon dodira s kožom (ili kosom): Skinuti zagađenu odjeću i obuću. Temeljito oprati zahvaćeno područje velikom količinom sapuna i vode. Zatražiti liječničku pomoć ako se pojave simptomi.

Ako se proguta: Isprati usta. Ispljunuti. NE izazvati povraćanje i odmah zatražiti savjet liječnika.

Imati pri ruci spremnik ili naljepnicu proizvoda.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Na kraju obrade, odložiti nekorišteni proizvod i ambalažu u skladu s lokalnim propisima. Korišteni proizvod može doći u gradsku kanalizaciju ili se može odložiti na odlagalište za gnojivo ovisno o lokalnim propisima. Izbjegavati ispuštanje u pojedinačno postrojenje za obradu otpadnih voda.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati samo u originalnom pakovanju na hladnom i dobro prozračnom mjestu. Držati spremnik zatvorenim ako se ne koristi. Zaštititi od mraza. Ne izlagati temperaturama višima od 40 °C.
Rok uporabe proizvoda je 2 godine.

6. Ostale informacije

/