

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: MEGALON 27 PASTA

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2022/0326/MRS/IT/2021/00732/AUT

Numărul curent R4BP 3: RO-0028900-0000

Cuprins

| | |
|---|----|
| Informații administrative | 1 |
| 1.1. Denumirea comercială a produsului | 1 |
| 1.2. Detinatorul autorizației | 1 |
| 1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide | 1 |
| 1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active | 2 |
| 2. Compoziția și formularea produsului | 2 |
| 2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid | 2 |
| 2.2. Tipul preparatului | 2 |
| 3. Fraze de pericol și de precauție | 2 |
| 4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate) | 3 |
| 5. Direcții generale de utilizare | 13 |
| 5.1. Instrucțiuni de utilizare | 13 |
| 5.2. Măsuri de reducere a riscurilor | 13 |
| 5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului | 14 |
| 5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia | 15 |
| 5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare | 15 |
| 6. Alte informații | 15 |

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

| |
|--------------------|
| MEGALON 27 PASTA |
| RATTIDION 27 PASTE |
| TOPIN 27 PASTA |
| RAT KAT 27 PASTE |
| INDORAT 27 PASTE |
| RODEXION 27 PASTA |

1.2. Detinatorul autorizației

| | | |
|--|------------------------------------|--|
| Numele și adresa detinatorului autorizației | Numele | INDUPHARMA S.R.L |
| | Adresa | VIA SORGAGLIA 40 35020 ARRE, PADOVA Italia |
| Numărul curent | RO/2022/0326/MRS/IT/2021/00732/AUT | |
| Numărul curent R4BP 3 | RO-0028900-0000 | |
| Data autorizației | 04/05/2022 | |
| Data de expirare a autorizației | 22/04/2025 | |

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

| | |
|--------------------------------------|--|
| Numele producatorului | I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.r.l |
| Adresa producătorului | Via Sorgaglia, 25 35020 Arre (PD) Italia |
| Adresa locurilor de producție | c/o INDUSTRIALCHIMICA Srl - Via Sorgaglia, 40 35020 Arre (PD) Italia |

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

| | |
|--------------------------------------|--|
| Substanța activă | 12 - Bromodiolonă |
| Numele producătorului | Activa Srl |
| Adresa producătorului | via Feltre 32 20132 Milano Italia |
| Adresa locurilor de producție | Dr. Tezza s.r.l - Via Tre Ponti 22 37059 S. Maria di Zevio (VR) Italia |

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

| Denumirea comună | Denumirea IUPAC | Funcția | Numărul CAS | Numărul CE | Continut (%) |
|---------------------|---|--------------------|-------------|------------|--------------|
| Bromodiolonă | 3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one | Substanța activă | 28772-56-7 | 249-205-9 | 0,0027 |
| Denatonium benzoate | benzyl-[2-(2,6-dimethylanilino)-2-oxoethyl]-diethylazanium; benzoate | Substanța inactivă | 3734-33-6 | 223-095-2 | 0,001 |
| Calcium hydroxide | calcium; dihydroxide | Substanța inactivă | 1305-62-0 | 215-137-3 | 0,375 |

2.2. Tipul preparatului

RB - Bait (gata de utilizare)

3. Fraze de pericol și de precauție

| | |
|---------------------------|---|
| Fraze de pericol | Poate provoca leziuni ale organelor (blood) în caz de expunere prelungită sau repetată. |
| Fraze de precauție | A nu se lăsa la îndemâna copiilor. ÎN CAZ DE expunere sau de posibilă expunere: Consultați medicul. Aruncați conținutul la national and international regulations. Aruncați recipientul la national and international regulations. |

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Șoareci de casă – specialiști – la interior

| | |
|---|--|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: - |
| Domeniul de utilizare | de interior - |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 60 g g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: - |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). |

Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg.

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.1.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Șobolani – specialiști – la interior

| | |
|---|--|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: - |
| Domeniul de utilizare | de interior - |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 g g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: - |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. |

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.2.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Dacă amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Șoareci de casă și/sau șobolani – specialiști – la exterior, în jurul clădirilor

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: - denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: - |
| Domeniul de utilizare | în aer liber La exterior, în jurul clădirilor |

| | |
|---|---|
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ready-to-use bait Descriere detaliata: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: House mice: 60 g de momeală per capcană. Brown rat: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: - |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | profesional |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 1,5 kg până la 25 kg (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Ambalajul este destinat exclusiv pentru saci separați, din PE/aluminiu/polyester, cu o greutate maximă individuală de 10 kg. |

4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de intemperii (de exemplu, ploaie, zăpadă etc.). Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Capcana trebuie inspectată, pentru șoareci, cel puțin o dată la 2-3 zile de la începerea tratamentului, pentru șobolani doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior (pentru șoareci și șobolani), pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.
- Înlocuiți momeliile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.

4.3.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu introduceți produsul direct în vizuini.

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când amplasați capcanele în apropierea apelor de suprafață (de exemplu, râuri, iazuri, canale navigabile, diguri, canale de irigații) sau a sistemelor de scurgere a apelor, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.”

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Șoareci de casă – publicul larg – la interior

| | |
|---|--|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Mus musculus denumirea comună: House mouse etapă de dezvoltare: - |
| Domeniul de utilizare | de interior - |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării. |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 60 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: - |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). |

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g).

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g).

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare.

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Șobolani – publicul larg – la interior

| | |
|---|--|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: - |
| Domeniul de utilizare | de interior - |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: - |
| Categoria (categoriile) de utilizatori | Publicul larg (neprofesionist) |
| Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare | Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g). |

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Șobolani – publicul larg – la exterior, în jurul clădirilor

| | |
|---|---|
| Tipul produsului | TP 14 - Rodenticide |
| Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz | Inaplicabil pentru rodenticide. |
| Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare) | denumirea științifică: Rattus norvegicus denumirea comună: Brown rat etapă de dezvoltare: - |
| Domeniul de utilizare | în aer liber Outdoor around buildings |
| Metoda (metodele) de aplicare | Metoda: Ready-to-use bait Descriere detaliată: Momeală gata de utilizare în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării |
| Doza (dozele) și frecvența de aplicare | Frecvența de aplicare: 100 g de momeală per capcană. Dacă sunt necesare mai multe capcane, distanța minimă dintre acestea trebuie să fie de 5 metri. Diluare (%): - Numărul și calendarul de aplicare: - |

Categoria (categoriile) de utilizatori

Publicul larg (neprofesionist)

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Pungă/sac etichetat sau imprimat din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g).

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în găleată din HDPE etichetată sau imprimată (sigilată): de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g).

Pungă/sac din PE/Aluminiu/Poliester (sudat termic) în plic de carton imprimat sau în cutie de carton imprimată: de la 50 g până la 150 g (conținând momeli rodenticide în pliculețe cu greutatea de 10-20 g).

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Amplasați capcanele în zone fără risc de inundare.
- Înlocuiți momeliile deteriorate de apă sau contaminate cu pământ din interiorul capcanelor.
- Capcanele se inspectează doar după 5-7 zile de la începerea tratamentului și cel puțin săptămânal ulterior, pentru a vedea dacă momeala este acceptată și dacă se menține integritatea capcanelor, precum și pentru a îndepărta rozătoarele moarte. Realimentați cu momeală atunci când este necesar.

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

Consultați „Instrucțiuni generale de utilizare

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Specialiști

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
- Studiați și evaluați în prealabil zona infestată, pentru a identifica speciile de rozătoare și locurile de activitate a acestora și a determina cauza și amploarea infestării.
- Îndepărtați hrana care este ușor accesibilă rozătoarelor (ex. cereale vrac sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Produsul trebuie să fie utilizat numai în cadrul unui sistem integrat de combatere a dăunătorilor (IPM), care include, printre altele, măsuri de asigurare a igienei și, acolo unde este posibil, metode fizice de control.
- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (de exemplu astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum a produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care a fost observată prezența rozătoarelor (de exemplu căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate de sol sau pe alte structuri.
- Capcanele trebuie să fie etichetate clar pentru a arăta că ele conțin rodenticide și că nu trebuie mișcate sau deschise (a se vedea secțiunea „Detalii despre efectele probabile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului”, pentru informații care trebuie incluse pe etichetă).
- Când produsul este utilizat în spații publice, zonele tratate trebuie marcate pe parcursul perioadei de tratament și trebuie afișat un anunț care să explice riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, precum și să indice primele măsuri care trebuie luate în caz de otrăvire, informații care trebuie puse la dispoziție alături de produs.
- Momeala trebuie fixată astfel încât să nu poată fi extrasă din capcană.
- Amplasați produsul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă, precum și a altor animale care nu sunt vizate.
- Amplasați produsul departe de hrană, băutură și furaje pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele care intră în contact cu acestea.
- Purtați mănuși de protecție rezistente la substanțe chimice (cauciuc) pe parcursul manipulării produsului.
- Când manevrați produsul nu mâncați, nu beți sau fumați. După manipularea produsului spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.
- În cazul unui consum scăzut de momeală în raport cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare relocarea capcanelor în locuri mai îndepărtate, precum și posibilitatea de a o înlocui cu o altă formulă de momeală.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile consumul de momeală continuă și nu se observă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Acolo unde au fost excluse alte cauze, este posibil să existe rozătoare rezistente la produs, ca urmare luați în considerare utilizarea unui rodenticid fără anticoagulant, dacă este disponibil, sau a unui rodenticid cu anticoagulant mai puternic. De asemenea, luați în considerare utilizarea curselor ca o măsură alternativă de control.
- La sfârșitul perioadei de tratament îndepărtați momeala rămasă sau capcanele.

Publicul larg

- Înainte de utilizare, citiți și respectați informațiile despre produs și toate informațiile care îl însoțesc sau care sunt comunicate în momentul vânzării.
- Înainte de a utiliza produse rodenticide, luați în considerare eventuale metode de combatere nechimice (de exemplu, curse).
- Îndepărtați hrana care este ușor accesibilă rozătoarelor (ex. cereale vrac sau resturi de mâncare). Pe lângă aceasta, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece astfel veți deranja populația de rozătoare și veți îngreuna acceptarea momelii.
- Capcanele trebuie amplasate în imediata apropiere a locurilor în care a fost observată prezența rozătoarelor (de exemplu, căi de acces, locuri de cuibărit, jgheaburi de hrănire a animalelor, găuri, vizuini etc.).
- Dacă este posibil, capcanele trebuie să fie fixate de sol sau pe alte structuri.
- Amplasați produsul astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie și animalelor de fermă, precum și a altor animale care nu sunt vizate.
- Amplasați produsul departe de hrană, băutură și furaje pentru animale, precum și de ustensilele sau suprafețele care intră în contact cu acestea.
- Nu amplasați capcanele în apropierea sistemelor de scurgere a apei unde acestea pot intra în contact cu apa.
- Când manevrați produsul nu mâncați, nu beți sau fumați. După manipularea produsului spălați-vă mâinile și pielea direct expusă.
- La sfârșitul perioadei de tratament îndepărtați momeala rămasă sau capcanele.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Experți

- Dacă este posibil, înainte de tratament, informați persoanele care s-ar putea afla în preajma capcanelor (de exemplu utilizatorii zonei tratate și ai împrejurimilor acestora) în legătura cu campania de combatere a rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de intoxicare secundară, căutați și îndepărtați frecvent rozătoarele moarte pe durata tratamentului (de exemplu, cel puțin de două ori pe săptămână).
- Produsele nu se utilizează pe o durată mai mare de 35 de zile fără o evaluare a stării de infestare și a eficienței tratamentului.
- Nu folosiți momeli care conțin substanțe active anticoagulante ca momeli permanente pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a monitoriza activitatea rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să indice clar următoarele:
 - produsul nu trebuie să fie furnizat publicului larg (de exemplu, „numai pentru experți”).
 - produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii și a deteriorării (de exemplu, „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării”).
 - utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informațiile menționate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).
- Utilizând acest produs rozătoarele ar trebui să fie eliminate în 35 de zile. Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar faptul că în cazul suspectării lipsei de eficiență a acestuia până la sfârșitul tratamentului (se observă încă o activitate a rozătoarelor), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de combatere a rozătoarelor.
- Nu spălați capcanele cu apă între utilizări.
- Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

Publicul larg

- Analizați posibilitatea de a lua măsuri de combatere preventive (astupați găurile, îndepărtați cât mai mult posibil eventualele surse de hrană și băutură) pentru a crește șansa de consum a produsului și pentru a reduce riscul de reinvadare.
- Nu utilizați rodenticide anticoagulante ca momeli permanente (de exemplu, pentru a preveni infestarea cu rozătoare sau pentru a detecta prezența rozătoarelor).
- Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să indice clar următoarele:
 - produsul se utilizează în capcane adecvate, protejate împotriva deschiderii și a deteriorării (de exemplu, „a se utiliza exclusiv în capcane protejate împotriva deschiderii și a deteriorării”).
 - utilizatorii trebuie să marcheze capcanele cu informațiile menționate la punctul 5.3 din rezumatul caracteristicilor produsului (de exemplu, „capcanele se etichetează conform recomandărilor privind produsul”).
- Utilizând acest produs rozătoarele ar trebui să fie eliminate în 35 de zile. Informațiile despre produs (eticheta și/sau prospectul) trebuie să recomande în mod clar faptul că în cazul suspectării lipsei de eficiență a acestuia până la sfârșitul tratamentului (se observă încă o activitate a rozătoarelor), utilizatorul ar trebui să solicite sfatul furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de combatere a rozătoarelor.
- Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte pe durata tratamentului, cel puțin cu aceeași frecvență cu care sunt inspectate capcanele.
- Îndepărtați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale.

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Experți

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerari nazale și gingivale. În cazurile severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau urină.
- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.
- În caz de:
 - Expunere cutanată: spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
 - Expunerea ochilor: clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
 - Expunere orală: clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de către un animal de companie.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu mișca și nu deschide”; „conține un rodenticid”; „numele produsului sau numărul autorizației”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la 021-3183606: Birou RSI și Informare Toxicologică INSP București sau la 112”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

Publicul larg

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care se pot manifesta cu întârziere, pot să includă sângerari nazale și gingivale. În cazurile severe, pot să apară echimoze la suprafața pielii și sânge în excremente sau urină.
- Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.
- În caz de:
 - Expunere cutanată: spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.
 - Expunerea ochilor: clătiți ochii cu lichid de uz ocular sau cu apă și țineți pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
 - Expunere orală: clătiți atent gura cu apă. Nu administrați niciodată substanțe pe cale orală persoanelor inconștiente. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Sunați la 021-3183606: Birou RSI și Informare Toxicologică INSP București. Contactați un medic veterinar specializat în chirurgie dacă produsul a fost ingerat de către un animal de companie.
- Capcanele trebuie să fie etichetate cu următoarele informații: „nu mișca și nu deschide”; „conține un rodenticid”; „numele produsului sau numărul autorizației”; „substanță(e) activă(e)” și „în caz de incident, sunați la 021-3183606: Birou RSI și Informare Toxicologică INSP București sau la 112”.
- Periculos pentru animalele sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Experți

- La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale.

Publicul larg

- La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Se recomandă folosirea mănușilor.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- A se păstra într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. A nu se păstra la temperaturi mai mari de 35°C. Păstrați recipientul închis și ferit de lumina directă a soarelui.
- A se păstra în locuri unde nu au acces copii, păsări, animale de companie și animale de fermă.
- Perioada de valabilitate: 2 ani.

6. Alte informații

- Din cauza modului lent de acțiune, rodenticidele anticoagulante își produc efectul după 4-10 zile de la consumul momelei.
- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, folosiți mănuși sau instrumente, cum ar fi clești, atunci când le îndepărtați.
- Acest produs conține un aditiv amar și un colorant.