

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Masocare 1:4

Τύπος(οι) προϊόντος: PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

Αριθμός άδειας: 1600-1610/4-4-2023

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** GR-0030904-0012

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	3
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	3
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	3
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	12
5.1. Οδηγίες χρήσης	12
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	12
5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	12
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	12
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	12
6. Άλλες πληροφορίες	12

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Masocare 1:4

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας

Επωνυμία	Evans Vanodine International PLC
Διεύθυνση	Brierley Road Walton Summit PR5 8AH Preston Ηνωμένο Βασίλειο

Αριθμός άδειας

1600-1610/4-4-2023 1-8

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

GR-0030904-0012

Ημερομηνία έκδοσης της άδειας

04/04/2023

Ημερομηνία λήξης της άδειας

31/12/2033

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

Evans Vanodine International

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Ηνωμένο Βασίλειο

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Brierley Road, Walton Summit PR5 8AH Preston, Lancashire Ηνωμένο Βασίλειο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας

1319 - Ιώδιο

Όνομα του παρασκευαστή

ACF Minera S.A.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

San Martin No. 499 - Iquique Χιλή

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Lagunas Mine - Pozo Almonte Χιλή

Δραστικής ουσίας

1319 - Ιώδιο

Όνομα του παρασκευαστή

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Los Militares 4290, Piso 4 - Las Condes, Santiago Χιλή

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Nueva Victoria Plant, Pedro de Valdivia Plant - Northern Chile Χιλή

Δραστικής ουσίας

1319 - Ιώδιο

Όνομα του παρασκευαστή

Cosayach Nitratos S.A.

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Hnos Amunategui 178 - Santiago Χιλή

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

S.C.M. Cosayach Cala Cala - Pozo Almonte Χιλή

Δραστικής ουσίας

1319 - Ιώδιο

Όνομα του παρασκευαστή

ISE CHEmical Corporation

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Kitaimaizumi 3695 - Oamishirasato City Chiba Ιαπωνία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής

Shirasato Plant - - Ιαπωνία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC Λειτουργία		Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Ιώδιο		Δραστική Ουσία	7553-56-2	231-442-4	2,346
Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11EO)	C13-15 Αλκοολαιθοξυλεστέρας (11EO)	Μη δραστική ουσία	157627-86-6	500-337-8	19,993

2.2. Είδος τυποποίησης

SL - Πυκνό διάλυμα

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Δηλώσεις προφύλαξης

Να διατηρείται μόνο στην αρχική συσκευασία.

Σκουπίστε τη χυμένη ποσότητα για να προλάβετε υλικές ζημιές.

Αποθηκεύεται σε σε περιέκτη με ανθεκτική εσωτερική επένδυση.

Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

Διάθεση του περιεχομένου σε σύμφωνα με τους τοπικούς/περιφερειακούς/εθνικούς κανονισμούς.

Να φοράτε μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

Καλέστε αμέσως ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Πριν από το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

PT03 - Κτηνιατρική υγειεινή

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν από το άρμεγμα.

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/I

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/I

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Εφαρμόστε πριν από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με ελάχιστο χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:

α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός

βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Λεπτομερής περιγραφή:

Εφαρμογή πριν από το άρμεγμα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το προϊόν.

Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία

πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία

αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.

Αραίωση (%): -

Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:

Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/-ες χρηστών

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες
Επαγγελματίες
Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L IBC (HDPE) 1000L

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Προσθέστε 1 μέρος προϊόντος σε 9 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραίωση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ιώδιο για την απολύμανση μετά από το άρμεγμα.

Για μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμό:

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιοριστεί από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγώγων ζώων (βοοειδή, βούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση μετά το άρμεγμα.

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/I

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/I

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
α. Εμβάπτιση

βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός
βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα

Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και το ζώο στέκεται για 5 λεπτά.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: αυτόματη εμβάπτιση
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματη εμβάπτιση:
βοοειδή και βούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή μετά το άρμεγμα
Εφαρμόστε μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (1-3 φορές την ημέρα).
Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
βλ. παραπάνω

Κατηγορία/-ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L
Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Προσθέστε 1 μέρος προϊόντος σε 4 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραίωση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με αραιωμένο προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν.

Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

3. Αυτόματη εμβάπτιση

Οι θηλές καλύπτονται με το αραιωμένο προϊόν όταν το κύπελλο θηλής αποσύρεται από τη συσκευή αυτόματης απομάκρυνσης διάταξης (ACR). Η διαδικασία είναι πλήρως αυτοματοποιημένη.

4. Αυτόματος ρομποτικός ψεκασμός

Μετά από το ρομποτικό άρμεγμα, το αραιωμένο προϊόν ψεκάζεται αυτόματα επάνω στις θηλές από τον βραχίονα διάταξης. Η έκπλυση του ψεκαστήρα γίνεται αυτόματα.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα πιαδιά.

Εάν είναι απαραίτητος ο συνδυασμός απολύμανσης πριν και μετά από το άρμεγμα, πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο χρήσης ενός προϊόντος που δεν περιέχει ίώδιο για την απολύμανση πριν από το άρμεγμα.

Για μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμό, αυτόματη ρομποτική εμβάπτιση και αυτόματο ρομποτικό ψεκασμό:

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίστε από τον κάτοχο της ίδιας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επειγόντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.3 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 3 - Πριν και μετά το άρμεγμα

Τύπος προϊόντος

**Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)**

PT03 - Κτηνιατρική υγιεινή

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΓΙΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ: Απολυμαντικά προϊόντα θηλών γαλακτοπαραγωγών ζώων (βοοειδή, βιούβαλοι, πρόβατα, αίγες) για χρήση πριν και μετά το άρμεγμα.

επιστημονική ονομασία: βακτήρια
Κοινή ονομασία: βακτήρια
στάδιο ανάπτυξης: Δ/I

επιστημονική ονομασία: Ζυμομύκητες
Κοινή ονομασία: Yeasts
στάδιο ανάπτυξης: Δ/I

Πεδίο χρήσης

Εσωτερικοί Χώροι

Χρήση σε εσωτερικό χώρο – Θηλές ζώων που βρίσκονται σε περίοδο γαλουχίας.

Μέθοδος/-οι εφαρμογής

Μέθοδος: Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός:
 - α. Εμβάπτιση
βοοειδή και βιούβαλοι: 10 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 6 ml/ζώο ανά θεραπεία

β. Αφρισμός
βοοειδή και βούβαλοι: 5 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 2,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 3 ml/ζώο ανά θεραπεία

Μέθοδος: Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα
Λεπτομερής περιγραφή:
Εφαρμογή πριν και μετά το άρμεγμα Εφαρμογή

Εφαρμόστε πριν και μετά από κάθε άρμεγμα κάθε ημέρα (έως και 5 εφαρμογές ανά ημέρα συνολικά). Για μη αυτόματη εφαρμογή διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως με χρόνο επαφής 60 δευτερολέπτων για πριν από το άρμεγμα, και διασφαλίστε ότι η θηλή καλύπτεται πλήρως και τα ζώα αφήνονται να σταθούν για 5 λεπτά μετά το άρμεγμα.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:
βοοειδή και βούβαλοι: 10-15 ml/ζώο ανά θεραπεία
πρόβατα: 5-7,5 ml/ζώο ανά θεραπεία
αίγες: 7-10 ml/ζώο ανά θεραπεία

Δόση και συχνότητα εφαρμογής

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω

Δόση εφαρμογής: Βλ. παραπάνω.
Αραίωση (%): -
Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής:
Βλ. παραπάνω.

Κατηγορία/ες χρηστών

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

Φιάλη/Συσκευασία (HDPE) 5 – 25L
Μικρό βαρέλι (HDPE) 200L
IBC (HDPE) 1000L

4.3.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Πριν από τη χρήση, η θερμοκρασία του προϊόντος θα πρέπει να υπερβαίνει τους 20°C.

Συνιστάται η χρήση δοσομετρικής αντλίας για την προώθηση του προϊόντος εντός του εξοπλισμού εφαρμογής.

Μετά το άρμεγμα: Για να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος επαφής, πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε το προϊόν να μην αφαιρεθεί μετά την εφαρμογή (π.χ. αφήστε τα ζώα να σταθούν για τουλάχιστον 5 λεπτά).

Αυτό το προϊόν πρέπει να αραιωθεί πριν από τη χρήση.

Οι αραιώσεις είναι διαφορετικές για πριν και μετά το άρμεγμα, συνεπώς απαιτούνται ξεχωριστά κύπελλα θηλής. Βλ. ειδικές οδηγίες.

Παρασκευάζετε νέα ποσότητα διαλύματος καθημερινά.

Οι περιέκτες για την αραίωση θα πρέπει να είναι καθαροί και κατάλληλοι για χρήση.

Πριν από τη χρήση αυτού του προϊόντος, διασφαλίστε ότι οι μαστοί και οι θηλές είναι καθαρά και στεγνά.

Πριν από το άρμεγμα - Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 9 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

Μετά το άρμεγμα - Αναμείξτε 1 μέρος προϊόντος με 4 μέρη καθαρού νερού και ανακατέψτε καλά.

1. Μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμός

Γεμίστε το κύπελλο θηλής κατά τα 2/3 με προϊόν. Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου πριν από το άρμεγμα, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Εμβαπτίστε τις θηλές κάθε ζώου αμέσως μετά το άρμεγμα της κάθε μίας, διασφαλίζοντας ότι εμβυθίζεται όλο το μήκος της θηλής.

Γεμίστε με νέα ποσότητα διαλύματος, όπως απαιτείται.

Αδειάστε και πλύνετε τα κύπελλα με νερό μετά τη χρήση.

2. Μη αυτόματος ψεκασμός με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα

Πριν από το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών. Αφήστε το προϊόν επάνω στις θηλές για τουλάχιστον 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια σκουπίστε και στεγνώστε σχολαστικά τις θηλές χρησιμοποιώντας χαρτί μίας χρήσης.

Αμέσως μετά το άρμεγμα, ψεκάστε τις θηλές κάθε ζώου με το αραιωμένο προϊόν. Διασφαλίστε ότι το εκνέφωμα καλύπτει ολόκληρη την επιφάνεια όλων των θηλών.

4.3.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Να φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.

Για μη αυτόματη εμβάπτιση/αφρισμό:

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

Για μη αυτόματο ψεκασμό με ηλεκτρονικό ψεκαστήρα:

Χρησιμοποιείτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στα χημικά κατά τη φάση χειρισμού του προϊόντος (το υλικό των γαντιών θα προσδιορίστε από τον κάτοχο της άδειας κυκλοφορίας στις πληροφορίες προϊόντος).

Χρησιμοποιείτε κατάλληλα προστατευτικά είδη υπόδησης (EN 13832) όταν εφαρμόζετε αυτό το προϊόν.

Πρέπει να χρησιμοποιείτε πλήρη προστατευτική ενδυμασία (τουλάχιστον τύπου 6, EN 13034).

Η χρήση μέσων ατομικής προστασίας για τα μάτια κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος είναι υποχρεωτική.

4.3.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επειγόντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

4.3.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Βλ. συγκεκριμένες οδηγίες χρήσης.

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Βλ. συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης κινδύνου.

5.3. Ειδικές πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

Οι πιθανές άμμεσες ή έμμεσες επιδράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν τις εξής:

· Ερεθισμός των ματιών.

Γενικευμένη δυσφορία σε περίπτωση κατάποσης.

Μέτρα πρώτων βοηθειών

Εισπνοή: Απίθανη οδός έκθεσης, διότι το προϊόν δεν περιέχει πτητικές ουσίες. Σε περίπτωση εισπνοής εκνεφώματος/σταγονιδίων: Μεταφέρετε το άτομο που έχει προσβληθεί στον καθαρό αέρα και διατηρήστε το ζεστό και αφήστε το να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

Κατάποση: Μην προκαλέσετε εμετό. Παρέχετε άφθονο νερό για πόση. Επισκεφθείτε γιατρό αν η δυσφορία επιμένει.

Επαφή με το δέρμα: Πλύνετε με άφθονο νερό.

Επαφή με τα μάτια: Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Επισκεφθείτε γιατρό αμέσως, εάν τα συμπτώματα εμφανιστούν μετά από την πλύση.

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΕΝΑ ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΛΗΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ

Συμβουλές για ιατρικό και υγειονομικό προσωπικό:

Παρέχετε συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία.

ΟΤΑΝ ΖΗΤΑΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΙΑΤΡΟΥ, ΝΑ ΞΕΧΕΔΕΤΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ Ή ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ [ΕΙΣΑΓΑΓΕΤΕ ΤΟΠΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΕΔΩ].

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

Στο τέλος της θεραπείας, απορρίπτετε το αχρησιμοποιήτο προϊόν, τη συσκευασία και οποιαδήποτε μολυσμένα υλικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις.

Μην απορρίπτετε σε συστήματα αποχέτευσης.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Διάρκεια ζωής 24 μήνες.

Να αποθηκεύεται στον αρχικό περιέκτη και να προστατεύεται από ακραίες θερμοκρασίες.

Να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως.

Να προστατεύεται από τον παγετό. Εάν το περιεχόμενο παγώσει, πρέπει να αποψυχθεί και να αναμειχθεί σχολαστικά πριν από τη χρήση.

Να αποθηκεύεται σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο

Να αποθηκεύεται σε θερμοκρασίες που δεν υπερβαίνουν τους 25 °C.

6. Άλλες πληροφορίες

Σημειώστε ότι εάν γίνουν οποιεσδήποτε προσθήκες σε αυτή τη σειρά Meta-SPC, οι συγκεντρώσεις κατά τη χρήση πρέπει να εμπίπτουν εντός του εύρους που καλύπτεται από τις αξιολογήσεις περιβαλλοντικών κινδύνων.