

HR

PRILOG

SAŽETAK SVOJSTAVA BIOCIDNOG PROIZVODA

BROS Losion protiv komaraca i krpelja

Vrsta(e) proizvoda

PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci

Broj autorizacije: KLASA:UP/I-543-04/16-12/45

Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP): HR-0016451-0000

1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE	3
1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda	3
1.2. Nositelj autorizacije	3
1.3. Proizvođač(i) proizvoda	3
1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari	3
2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA	4
2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda	4
2.2. Vrsta(e) formulacija	4
3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI	5
4. AUTORIZIRANA UPORABA	6
4.1. Opis uporabe	6
5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU	9
5.1. Upute za uporabu	9
5.2. Mjere za smanjenje rizika	9
5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša	9
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	9
5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja	9
6. OSTALE INFORMACIJE	10

Poglavlje 1. ADMINISTRATIVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovački naziv(i) proizvoda

Trgovački naziv(i)	BROS Losion protiv komaraca i krpelja
--------------------	---------------------------------------

1.2. Nositelj autorizacije

Naziv i adresa nositelja autorizacije	Ime/naziv BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
	Adresa Karpia 24 61-619 Poznań Polska
Broj autorizacije	KLASA:UP/I-543-04/16-12/45
Broj odluke iz Registra biocidnih proizvoda (R4BP)	HR-0016451-0000
Datum autorizacije	20/07/2016
Datum isteka autorizacije	06/07/2026

1.3. Proizvođač(i) proizvoda

Naziv proizvođača	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (BROS Sp. z o.o.)
Adresa proizvođača	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polska
Lokacija proizvodnih pogona	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polska ul. Swarzędzka 17 62-006 Janikowo Polska

1.4. Proizvođač(i) aktivne(ih) tvari

Aktivna tvar	N,N-dietill-meta-toluamid
Naziv proizvođača	Clariant Corporation
Adresa proizvođača	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Sjedinjene Američke Države
Lokacija proizvodnih pogona	625 E. Catawba Avenue NC 28120 Mount Holly Sjedinjene Američke Države

Poglavlje 2. SASTAV I FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kvalitativne i kvantitativne informacije o sastavu proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EZ broj	Sadržaj (%)
N,N-dietill-met-toluamid	N,N-diethyl-m-toluamide	aktivna tvar	134-62-3	205-149-7	15

2.2. Vrsta(e) formulacija

XX Ostalo: Tekućina spremna za primjenu

Poglavlje 3. OZNAKE UPOZORENJA I OBAVIJESTI

Oznake upozorenja	H225: Lako zapaljiva tekućina i para. H319: Uzrokuje jako nadraživanje oka.
Oznake obavijesti	P101: Ako je potrebna liječnička pomoć, pokazati spremnik ili naljepnicu. P102: Čuvati izvan dohvata djece. P210: Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. P305 + P351 + P338: U SLUČAJU DODIRA S OČIMA: Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktne leće ako ih nosite i ako se one lako uklanjuju. Nastaviti ispiranje. P501: Odložiti sadržaj u/na u skladu s lokalnim propisima. P501: Odložiti spremnik u/na u skladu s lokalnim propisima.

Poglavlje 4. AUTORIZIRANA UPORABA

4.1. Opis uporabe

Tablica 1. Neprofesionalna uporaba - topikalna primjena na kožu

Vrsta proizvoda	PT19: Repelenti (odbojna sredstva) i mamci
Ako je relevantno, točan opis autorizirane uporabe	Zaštita zdravlja
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Znanstveno ime: Metastigmata (Ixodida): Metastigmata (Ixodida): Uobičajeno ime: ostalo: Krpelji Stadij razvoja: ostalo: Odrasli Znanstveno ime: Culicidae: Culicidae: Uobičajeno ime: ostalo: Komarci Stadij razvoja: ostalo: Odrasli Znanstveno ime: Simuliidae: Simuliidae: Uobičajeno ime: ostalo: Mušice Stadij razvoja: ostalo: Odrasli
Područje(a) uporabe	uporaba u zatvorenome upotreba na otvorenome Za primjenu u zatvorenim prostorima te vanjsku primjenu
Način(i) primjene	Metoda: ostalo: sprejanje Detaljan opis: Topikalna primjena na kožu
Količina(e) kod primjene i učestalost	Stopa primjene: 1,78 mg proizvoda/cm ² kože (jednako 0,27 mg DEET-a/cm ² kože) Razrjeđenje (%): 0 Broj i vremenski raspored primjene: Učinkovit kao repellent protiv kućnih komaraca (C. pipiens), tropskih tigrastih komaraca (A. albopictus), krpelja i mušica uz maksimalno trajanje zaštite od 7, 5, 4 odnosno 8 sati prilikom primjene 1,78 mg proizvoda/cm ² kože (jednako 0,27 mg DEET-a/cm ² kože). Primijeniti jednom ili dva puta na dan kod odraslih te jednom na dan kod djece u dobi od 2 do 12 godina. Maksimalni dnevni broj potisaka spreja biocidnog proizvoda na kožu bez istovremene primjene drugih proizvoda poput losiona za zaštitu od sunca: Odrasli :136 Djeca > 12 godina : 54 Djeca 2-12 godina : 22
Kategorija(e) korisnika	opća javnost (neprofesionalci)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	boca, plastika: HDPE ili PE, 25 - 250 ml opis: HDPE ili PE plastična boca s raspršivačem: 25 - 250 ml

4.1.1. Upute za uporabu specifične za uporabu

Deklaracija biocidnog proizvoda treba sadržavati sljedeće informacije:

Preporuke koje korisnika jasno obavještavaju kako, kada i koliko često (uključujući maksimalan dnevni broj primjena) se proizvod smije nanositi izravno na kožu.

Proizvod se primjenjuje jednom ili dva puta na dan kod odraslih i djece starije od 12 godina te jednom na dan kod djece u dobi od 2 do 12 godina.

Izbjegavati kontakt s **očima** i ustima.

Ne smije se sprejati izravno u lice.

Ne udisati sprej.

Primjenjivati samo na otvorenom ili u prostorijama s dobrom ventilacijom zraka.

Nakon povratka u zatvoreni prostor, isperite proizvod sapunom i vodom.

Proizvod nije namijenjen za uporabu kod djece **mlađe** od 2 godine.

Proizvod ne treba nanositi na dlanove djece **mlađe** od 12 godina.

Proizvod se ne bi trebao primjenjivati istovremeno s drugim proizvodima kao što su losioni za sunce.

Kod djece u dobi od 2 do 12 godina biocidni proizvod se na kožu može nanositi jednom na dan na lice, vrat, podlaktice, potkoljenice i stopala dok ostatak tijela treba zaštititi **odjećom**.

Dijelove kože koji nisu zaštićeni proizvodom preporučljivo je prekriti **odjećom** kako bi se ograničilo izloženost insektima koji bodu.

Prilikom primjene proizvoda treba mogućnost prskanja, kapanja i/ili kontakta maglice spreja s tlom svesti na najmanju moguću mjeru.

Učinkovito odbija kućne komarce (do 7 sati), tropске tigraste komarce (do 5 sati), krpelje (do 4 sata) i mušice (do 8 sati).

4.1.2. Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Deklaracija biocidnog proizvoda treba sadržavati **sljedeće** informacije:

Preporuke koje korisnika jasno obavještavaju kako, kada i koliko često (uključujući maksimalan dnevni broj primjena) se proizvod smije nanositi izravno na kožu.

Proizvod se primjenjuje jednom ili dva puta na dan kod odraslih i djece starije od 12 godina te jednom na dan kod djece u dobi od 2 do 12 godina.

Izbjegavati kontakt s **očima** i ustima.

Ne smije se sprejati izravno u lice.

Ne udisati sprej.

Primjenjujte samo na otvorenom ili u prostorijama s dobrom ventilacijom zraka.

Nakon povratka u zatvoreni prostor, isperite proizvod sapunom i vodom.

Proizvod nije namijenjen za uporabu kod djece **mlađe** od 2 godine.

Proizvod ne treba nanositi na dlanove djece **mlađe** od 12 godina.

Proizvod se ne bi trebao primjenjivati istovremeno s drugim proizvodima kao što su losioni za sunce.

Kod djece u dobi od 2 do 12 godina biocidni proizvod se na kožu može nanositi jednom na dan na lice, vrat, podlaktice, potkoljenice i stopala dok ostatak tijela treba zaštititi **odjećom**.

Dijelove kože koji nisu zaštićeni proizvodom preporučljivo je prekriti **odjećom** kako bi se ograničilo izloženost insektima koji bodu.

Prilikom primjene proizvoda treba mogućnost prskanja, kapanja i/ili kontakta maglice spreja s tlom svesti na najmanju moguću mjeru.

Čuvati izvan dohvata djece.

Čuvati na sigurnom mjestu.

Nemojte kontaminirati hranu, pribor za jelo ili površine koje dolaze u dodir s hranom.

Čuvati dalje od izvora vatre.

Učinkovito odbija kućne komarce (do 7 sati), tropске tigraste komarce (do 5 sati), krpelje (do 4 sata) i mušice (do 8 sati).

4.1.3. Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Udisanje:

U slučaju udisanja izaći na svjež zrak i potražiti medicinsku pomoć.

Kontakt s **očima**:

U slučaju kontakta s **očima**, isprati temeljito s mnogo vode. U slučaju da se simptomi nastave, potražiti medicinsku pomoć.

Gutanje:

U slučaju gutanja odmah potražite medicinsku pomoć te liječniku pokazati pakovanje ili deklaraciju s pakovanja.

Kontakt s kožom:

U osjetljivih osoba može izazvati nadražaj. U slučaju nadražaja isprati kožu sapunom i vodom.

4.1.4. Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Ne bacati u odvod.

Ne zagađujte tlo, izvore vode i vodene tokove kemikalijama ili spremnicima uporabljenih proizvoda.

Ne upotrebljavati ponovno spremnik uporabljenog proizvoda.

4.1.5. Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Čuvati u originalnom spremniku.

Čuvati na mjestu s dobrom ventilacijom zraka.

Rok trajanja do 5 godina.

Poglavlje 5. OPĆE UPUTE ZA UPORABU¹

5.1. Upute za uporabu

Vidi 4.1.1.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Vidi 4.1.2.

5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Vidi 4.1.3.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Vidi 4.1.4.

5.5. Uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Vidi 4.1.5.

¹Upute o uporabi, mjere za smanjenje rizika i druge smjernice za uporabu u ovom odjeljku vrijede za svaku autoriziranu uporabu.

Poglavlje 6. OSTALE INFORMACIJE