

FR

ANNEXE

**RÉSUMÉ DES CARACTÉRISTIQUES DU
PRODUIT POUR UN PRODUIT BIOCIDÉ**

FANGA 5 CEREALES 25

Type(s) de produit

TP14: Rodenticides

Numéro d'autorisation: FR-2019-0048

Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides: FR-0020621-0000

Chapitre 1. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

1.1. Nom commercial/noms commerciaux du produit

Nom commercial/noms commerciaux	FANGA 5 CEREALES 25 FANGA ABSOLU MIX 25 FESTIN DU RONGEUR MIX 25 ABSOLUTE WAY MIX 25 E'RAT-SE MIX 25 STOP RAT MIX BROD 25 CÉRÉALE SUPER CÉRÉALE EXTRA EXCELL' CEREALE SUPP'BD CÉRÉALE STOP BD CÉRÉALE RONGEURS BD CÉRÉALE RODENT BD CEREAL
---------------------------------	--

1.2. Titulaire de l'autorisation

Nom et adresse du titulaire de l'autorisation	Nom	TRIPLAN SA
	Adresse	BP 258 LA POSTE FRANCAISE AD500 ANDORRA LA VELLA France
Numéro de l'autorisation		FR-2019-0048
<i>Numéro de l'autorisation du registre des produits biocides</i>		FR-0020621-0000
Date de l'autorisation		07/05/2019
Date d'expiration de l'autorisation		31/12/2026

1.3. Fabricant(s) du produit

Nom du fabricant	SOFAR FRANCE
Adresse du fabricant	ZA DU DREVERS BP 02 29190 PLEYBEN France
Emplacement des sites de fabrication	SOFAR FRANCE - ZA DU DREVERS BP 02 29190 PLEYBEN France

Nom du fabricant	HDA
Adresse du fabricant	ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM France
Emplacement des sites de fabrication	HDA - ZA LA CHARME MENETROL 63200 RIOM France

Nom du fabricant	RATOUCY SAS
Adresse du fabricant	29 RUE DE LA FORET LOOZE - BP 145 89303 JOIGNY CEDEX France
Emplacement des sites de fabrication	RATOUCY SAS - 29 RUE DE LA FORET 89300 LOOZE France

Nom du fabricant	AEDES PROTECTA
------------------	----------------

Adresse du fabricant	75 RUE D'ORGEMONT 95210 SAINT GRATIEN France
Emplacement des sites de fabrication	LIEU DIT DOUILLAC 81310 PARISOT France

Nom du fabricant	IRIS
Adresse du fabricant	1126A AVENUE DU MOULINAS – ROUTE DE SAINT-PRIVAT 30340 SALINDRES France
Emplacement des sites de fabrication	IRIS - 1126A AVENUE DU MOULINAS – ROUTE DE SAINT-PRIVAT 30340 SALINDRES France

Nom du fabricant	FARMAVIT OOD
Adresse du fabricant	BUL TSAR BORIS III N°63, OFFICE N°1 1612 SOFIA Bulgarie
Emplacement des sites de fabrication	INDUSTRIALNA STR.2 - PLEVEN DISTRICT 5960 GULIANTSI Bulgarie

Nom du fabricant	NOXIMA
Adresse du fabricant	CARREFOUR JEAN MONNET – LACROIX SAINT-OUEN 60201 COMPIEGNE France
Emplacement des sites de fabrication	CARREFOUR JEAN MONNET – LACROIX SAINT-OUEN 60201 COMPIEGNE France

Nom du fabricant	INDUPHARMA S.r.l.
Adresse du fabricant	VIA SORGAGLIA 40 I-35020 ARRE (PD) Italie
Emplacement des sites de fabrication	VIA SORGAGLIA 40 I-35020 ARRE (PD) Italie

Nom du fabricant	FARMA-CHEM SA
Adresse du fabricant	INDUSTRIAL AREA OF SINDOS P.O. - BOX 1026 BLOCK 53 ZONE C 57022 THESSALONIKI Grèce
Emplacement des sites de fabrication	INDUSTRIAL AREA OF SINDOS P.O. - BOX 1026 BLOCK 53 ZONE C 57022 THESSALONIKI Grèce

Nom du fabricant	AGGRESS
Adresse du fabricant	EL. VENIZELOU 158 A 16341 ATHENS Grèce
Emplacement des sites de fabrication	ARMA THEBES 32200 VOIOTIA Grèce

Nom du fabricant	AGROLOGY SA
Adresse du fabricant	P.O. BOX 1089 INDUSTRIAL AREA OF THESSALONIKI 57022 THESSALONIKI Grèce
Emplacement des sites de fabrication	P.O. BOX 1089 INDUSTRIAL AREA OF THESSALONIKI 57022 THESSALONIKI Grèce

1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

Substance active	Brodifacoum
Nom du fabricant	ACTIVA S.R.L
Adresse du fabricant	Via Feltre 32 20132 Milan Italie
Emplacement des sites de fabrication	Dr. TEZZA S.R.L. Via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italie

Chapitre 2. COMPOSITION ET FORMULATION DU PRODUIT

2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphtyl]-4-hydroxycoumarin	substance active	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Type(s) de formulation

XX Divers: RB – Appât prêt à l'emploi sous forme de grain

Chapitre 3. MENTIONS DE DANGER ET CONSEILS DE PRUDENCE

Mentions de danger	H373: Risque présumé d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée { 1:indiquer la voie d'exposition s'il est formellement prouvé qu'aucune autre voie d'exposition ne conduit au même danger: }.
Conseils de prudence	P260: Ne pas respirer les poussières. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Éliminer le dans conformément à la réglementation nationale..

Chapitre 4. UTILISATION(S) AUTORISÉE(S)

4.1. Description de l'utilisation

Tableau 1. Souris et/ou rats – Professionnels – Intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: autre: Souris domestique Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: autre: Rat brun Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: autre: Rat noir Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Formulations de l'appât : - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.- Points d'appâts couverts et protégés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Rats - Forte infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 mètres - Faible infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 10 mètres Souris : - Forte infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 1 mètre - Faible infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 2 mètres Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Appât: <u>Rats</u> : - Forte infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 mètres - Faible infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 10 mètres <u>Souris</u> : - Forte infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 1 mètre - Faible infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 2 mètres
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels

Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement minimum 5 kg</p> <p>FANGA 5 CEREALES 25 est conditionné dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rats : sachets de 10, 20, 25, 50, 100 g en PE/PP - Souris : sachets de 10, 20, 40 g en PE/PP <p>Les sachets sont conditionnés dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier, plusieurs couches avec un ou sans film plastique en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Seaux en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Sacs en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Boîtes en cartons (5-10-12-15-20-50 kg) - Boîtes métalliques sans laque (5-10-15-20-25 kg) - Boîtes d'appât pré-remplis en PET/PP/PE/PVC <p>FANGA 5 CEREALES 25 est aussi fourni en vrac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier, plusieurs couches avec un film plastique en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Seaux en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Sacs en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Boîtes en cartons (5-10-12-15-20-50 kg) - Boîtes métalliques sans laque (5-10-15-20-25 kg) - Boîtes d'appât pré-remplis en PET/PP/PE/PVC inviolables
-------------------------------------	--

--	--

4.1.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

4.1.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.1.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

4.1.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.1.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.1.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.2. Description de l'utilisation

Tableau 2. Souris et /ou rats – Professionnels – Extérieur autour des bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	<p>Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: autre: Souris domestique Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: autre: Rat brun Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles</p> <p>Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: autre: Rat noir Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles</p>
Domaine(s) d'utilisation	<p>utilisation en extérieur</p> <p>Extérieur autour des bâtiments</p>
Méthode(s) d'application	<p>Méthode d'application: Application des appâts</p> <p>Description détaillée: Formulations de l'appât : - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.- Points d'appâts couverts et protégés.</p>
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: Rats - Forte infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 10 mètres. Souris : - Forte infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 1 mètre. - Faible infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.</p> <p>Dilution (%): 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appât:</p> <p><u>Rats</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forte infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 10 mètres. <p><u>Souris</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forte infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 1 mètre. - Faible infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement minimum 5 kg

FANGA 5 CEREALES 25 est conditionné dans:

- Rats : sachets de 10, 20, 25, 50, 100 g en PE/PP
- Souris : sachets de 10, 20, 40 g en PE/PP

Les sachets sont conditionnés dans:

- Sacs en papier, plusieurs couches avec un ou sans film plastique en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)
- Seaux en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)
- Sacs en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)
- Boîtes en cartons (5-10-12-15-20-50 kg)
- Boîtes métalliques sans laque (5-10-15-20-25 kg)
- Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC

FANGA 5 CEREALES 25 est aussi fourni en vrac:

- Sacs en papier, plusieurs couches avec un film plastique en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)
- Seaux en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)
- Sacs en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)
- Boîtes en cartons (5-10-12-15-20-50 kg)
- Boîtes métalliques sans laque (5-10-15-20-25 kg)
- Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC inviolables

--	--

4.2.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

4.2.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.2.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.

- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.

- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.

- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.

- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

4.2.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.2.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.2.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.3. Description de l'utilisation

Tableau 3. Souris et /ou rats – Professionnels – Zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: autre: Souris domestiques Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: autre: Rat brun Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: autre: Rat noir Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur autre: Autre Zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Formulations de l'appât : - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.- Points d'appâts couverts et protégés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: Rats - Forte infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 mètres - Faible infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 10 mètres Souris : - Forte infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 1 mètre. - Faible infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 2 mètres. Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Appât : <u>Rats:</u> - Forte infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 5 mètre. - Faible infestation : 100 g de produit par point d'appât espacés de 10 mètres.

	<p><u>Souris</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Forte infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 1 mètre. - Faible infestation : 40 g de produit par point d'appât espacés de 2 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	professionnels
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement minimum 5 kg</p> <p>FANGA 5 CEREALES 25 est conditionné dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rats : sachets de 10, 20, 25, 50, 100 g en PE/PP - Souris : sachets de 10, 20, 40 g en PE/PP <p>Les sachets sont conditionnés dans:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier, plusieurs couches avec un ou sans film plastique en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Seaux en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Sacs en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Boîtes en cartons (5-10-12-15-20-50 kg) - Boîtes métalliques sans laque (5-10-15-20-25 kg) - Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC <p>FANGA 5 CEREALES 25 est aussi fourni en vrac:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sacs en papier, plusieurs couches avec un film plastique en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Seaux en PE/PP (5-10-15-20-25 kg) - Sacs en PE/PP (5-10-15-20-25 kg)

	<ul style="list-style-type: none">- Boîtes en cartons (5-10-12-15-20-50 kg)- Boîtes métalliques sans laque (5-10-15-20-25 kg)- Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC inviolables
--	---

4.3.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

4.3.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.3.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

4.3.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des postes d'appâtage sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

4.3.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.3.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.4. Description de l'utilisation

Tableau 4. Souris - Non professionnels - Intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Mus musculus</i> Nom commun: autre: Souris domestique Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 40 g d'appât par station d'appât Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Appât : - 40 g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance séparant deux stations doit être de 1 à 2 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement maximum de 50 g pour les souris et 150 g pour les rats et souris FANGA 5 CEREALES 25 est conditionné dans : - Souris : sachets en PE/PP de 10, 20 ou 40 g Les sachets sont conditionnés dans : - Seaux en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes en cartons (jusqu'à 150 g)

	<ul style="list-style-type: none">- Films en PE/PP (jusqu'à 150 g)- Boîtes en métal sans laque (jusqu'à 150 g)- Récipients en PE/PP (jusqu'à 150 g)- Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC inviolables
--	--

4.4.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les stations d'appâtage doivent être inspectées au minimum tous les 2 à 3 jours au début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres des rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.

4.4.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.4.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.4.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.4.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.4.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.5. Description de l'utilisation

Tableau 5. Rats - Non professionnels - Intérieur

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: autre: Rat brun Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: autre: Rat noir Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.
Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	Taux d'application: 100 g d'appât par station d'appât Dilution (%): 0 Nombre et fréquence des applications: Appâts : - 100 g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance séparant deux stations doit être de 5 à 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement maximum 150 g Le produit est conditionné dans : - Rats : sachets en PE/PP de 10, 20, 25, 50, 100 g Les sachets sont conditionnés dans : - Seaux en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes en cartons (jusqu'à 150 g) - Films en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes en métal sans laque (jusqu'à 150 g) - Récipients en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC inviolables

4.5.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.

4.5.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.5.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

-

4.5.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.5.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.5.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

4.6. Description de l'utilisation

Tableau 6. Rats - Non professionnels - Extérieur autour des bâtiments

Type de produit	TP14: Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides.
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Nom scientifique: <i>Rattus norvegicus</i> Nom commun: autre: Rat brun Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles Nom scientifique: <i>Rattus rattus</i> Nom commun: autre: Rat noir Stade de développement: autre: Adultes et juvéniles
Domaine(s) d'utilisation	utilisation en extérieur Extérieur autour des bâtiments.
Méthode(s) d'application	Méthode d'application: Application des appâts Description détaillée: Appât prêt à l'emploi en sachets à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés.

Fréquence d'application et dose(s) à appliquer	<p>Taux d'application: 100 g d'appât par station d'appât</p> <p>Dilution (%): 0</p> <p>Nombre et fréquence des applications: Appâts :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 100 g d'appât par station d'appât. Si plusieurs stations d'appât sont nécessaires, la distance séparant deux stations doit être de 5 à 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	grand public (non professionnels)
Dimensions et matériaux d'emballage	<p>Conditionnement maximum 150 g</p> <p>FANGA 5 CEREALES 25 est conditionné dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rats : sachets en PE/PP de 10, 20, 25, 50, 100 g <p>Les sachets sont conditionnés dans :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Seaux en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes en cartons (jusqu'à 150 g) - Films en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes en métal sans laque (jusqu'à 150 g) - Récipients en PE/PP (jusqu'à 150 g) - Boîtes d'appât pré-remplies en PET/PP/PE/PVC inviolables

4.6.1. Consignes d'utilisation spécifiques

- Placer les postes d'appâtage dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Les postes d'appâtage ne doivent être inspectés que 5 à 7 jours après le début du traitement puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage ne sont pas altérés et de retirer les cadavres de rongeurs.
- Recharger le poste d'appâtage si besoin.

4.6.2. Mesures de gestion des risques spécifiques

4.6.3. Mesures de gestion des risques spécifiques

- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

4.6.4. Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

-

4.6.5. Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

4.6.6. Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

Chapitre 5. CONDITIONS GÉNÉRALES D'UTILISATION¹

5.1. Consignes d'utilisation UTILISATEURS PROFESSIONNELS

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.

- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.

- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.

- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.

- Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)

- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.

- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).

- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.

- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage.

- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.

- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.

- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.

¹Les instructions d'utilisation, les mesures d'atténuation des risques et les autres modes d'emploi de la présente section sont valables pour toutes les utilisations autorisées.

-
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
 - Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
 - Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.
 - Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant d'utiliser des produits rodenticides, envisager la possibilité de recourir à des méthodes de contrôle non chimiques (des pièges par exemple).
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Les postes d'appâtage doivent être placés à proximité immédiate de l'endroit où l'activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.).
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.
- Placer les postes d'appâtage hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer les postes d'appâtage à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces qui entrent en contact avec ces derniers.

-
- Ne pas placer les postes d'appâtage à proximité de systèmes d'évacuation des eaux où ils pourraient entrer en contact avec de l'eau.
 - Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
 - Retirer tout appât restant ou les postes d'appâtage au terme de la période de traitement.

5.2. Mesures de gestion des risques

UTILISATEURS PROFESSIONNELS

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple « à l'usage des professionnels formés uniquement »).
- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.
- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage.
- Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

UTILISATEURS NON PROFESSIONNELS

- Envisager l'adoption de mesures de contrôle préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Ne pas utiliser de rodenticides anticoagulants en guise d'appâts permanents (par exemple, pour éviter toute infestation de rongeurs ou pour détecter l'activité de rongeurs).

-
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire l'étiquette et/ou la notice) doivent clairement indiquer les éléments suivants :

 - Le produit doit être utilisé dans des postes d'appâtage sécurisés.

 - Les utilisateurs doivent convenablement étiqueter les postes d'appâtage avec les informations visées à la section 5.3 du RCP (par exemple, « étiqueter les postes d'appâtage conformément aux recommandations relatives au produit »).

 - L'utilisation de ce produit devrait permettre d'éliminer les rongeurs sous 35 jours.

 - Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la notice) doivent recommander de façon claire qu'en cas de soupçon d'inefficacité à la fin du traitement (en d'autres termes, si l'activité des rongeurs continue d'être observée), l'utilisateur doit demander conseil au fournisseur du produit ou contacter un service de contrôle des organismes nuisibles.

 - Rechercher et éliminer les cadavres de rongeurs pendant le traitement, au minimum chaque fois que les postes d'appâtage sont inspectés.
 - Éliminer les cadavres de rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.

- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.

- En cas:
 - o d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;

 - o d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;

 - o d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.

- Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.

- Ne pas provoquer de vomissement.

- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette [insérer les informations nationales spécifiques]. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.

- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: « ne pas déplacer ni ouvrir »; « contient un rodenticide »; « nom du produit ou numéro d'autorisation »; « substance(s) active(s) » et « en cas d'incident, contacter un centre antipoison [...] ».

- Dangereux pour la faune.

5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.

- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.

- Durée de conservation: 24 mois.

Chapitre 6. AUTRES INFORMATIONS

- Il conviendra de mettre en place un programme de suivi de la résistance des populations de rongeurs à la substance active brodifacoum et de fournir les résultats de ce suivi au renouvellement de l'AMM du produit.
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.
- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.