



Bratislava, 14. mája 2020
Naša značka: 09030/2020-3052-28115
Ref. číslo: bio/1642/O/20/DM

DODATOK č. 3
k rozhodnutiu o autorizácii biocídneho výrobku
č. SK17-MRS-002-00-000
Názov výrobku: Advion Ant Gel

Na základe vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) č. 354/2013 z 18. apríla 2013 o zmenách biocídnych výrobkov autorizovaných podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 (ďalej len „nariadenie o zmenách“) žiadosťou o závažnú zmenu, malú zmenu a súčasným oznámením administratívnej zmeny: identifikačné číslo BC-ED056426-52 predloženými dňa 13. januára 2020 v súlade s článkom 71 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP3) a klasifikovanými podľa článku 2 nariadenia o zmenách a prílohy k nariadeniu o zmenách Hlava 3 ako „Závažná zmena výrobku.“, Hlava 2, položka 3 ako „Zmenené pokyny na používanie, pričom zmeny nemajú negatívny vplyv na expozíciu.“, Hlava 2, položka 5 ako „Zmena v skladovateľnosti.“, Hlava 2, položka 7 ako „Zmena rozsahu veľkostí balenia.“ a Hlava 1, Oddiel 1, položka 2 ako „Pridanie názvu k biocídному výrobku, ak neexistuje riziko zámieny s názvami iných biocídnych výrobkov.“ došlo podľa článku 8 ods. 6, článku 7 ods. 6 a článku 6 ods. 3 nariadenia o zmenách k zmene autorizácie biocídneho výrobku. V zmysle článku 8 ods. 7, článku 7 ods. 7 a článku 6 ods. 4 nariadenia o zmenách sa rozhodnutie o autorizácii č. bio/5/O/17/RM zo dňa 4. januára 2017, zmenené dodatkom č. 1 bio/826/O/19/DP zo dňa 28.03.2019, rozhodnutím o predĺžení č. bio/2400/O/19/RM zo dňa 06.11.2019 a dodatkom č. 2 bio/341/O/20/DM za dňa 21.02.2020 mení v súlade s schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku.

Ostatné časti rozhodnutia č. bio/5/O/17/RM zo dňa 4. januára 2017, zmenené dodatkom č. 1 bio/826/O/19/DP zo dňa 28.03.2019, rozhodnutím o predĺžení č. bio/2400/O/19/RM zo dňa 06.11.2019 a dodatkom č. 2 bio/341/O/20/DM za dňa 21.02.2020 o autorizácii biocídneho výrobku **Advion Ant Gel** sa nemenia.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristík biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto dodatku a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa za doručenie tohto dodatku považuje doručenie prostredníctvom Registra pre biocídne výrobky (R4BP).

RNDr. Ján Čepček, PhD.
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: Syngenta Crop Protection AG, Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švajčiarsko

Príloha 1

Bratislava, 14. mája 2020
Naša značka: 09030/2020-3052-28115
Ref. číslo: bio/1642/O/20/DM

1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Výrobok

Názov výrobku	Advion Ant Gel
Obchodné názvy výrobku	ADVION® gél proti mravcom – návnadová stanica OUTCAST® gél proti mravcom – návnadová stanica

1.2. Držiteľ autorizácie ADVION® gél proti mravcom – návnadová stanica

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	Syngenta Crop Protection AG
	Adresa	Rosentalstrasse 67, 4058 Basel, Švajčiarsko
Číslo autorizácie	SK17-MRS-002-00-000	
Žiadosť o autorizáciu č.	BC-AS023480-41	
Dátum autorizácie	4. január 2017	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	31. december 2022	

1.3. Výrobca výrobku

Názov výrobcu	American Blending and Filling Laboratories Inc
Adresa výrobcu	1731 Lakeside Drive, 60085 Waukegan, Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	1731 Lakeside Drive, 60085 Waukegan, Spojené štáty americké

1.4. Výrobca účinnej látky

Účinná látka	Indoxacarb (enantiometrická reakčná zmes S:R 75:25)
Názov výrobcu	DuPont Crop Protection Products
Adresa výrobcu	Chestnut Run Plaza Building 705, 4417 Lancaster Pike, 31601 Wilmington, Spojené štáty americké
Miesto výrobných priestorov	Dôverné: ako je uvedené v Dokumente IIIA, Príloha I PT18 dokumentačného súboru Indoxacarb, Spojené štáty americké

2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Indoxakarb (enantiometrická reakčná zmes S:R 75:25)	Reaction mass of methyl (S)- and methyl(R)-7-chloro- 2.3,4a,5-tetrahydro-2- [methoxycarbonyl-(4-trifluoromethoxyphenyl) carbamoyl] indeno[1,2-e][1.3,4] oxadiazine-4a-carboxylate (This entry covers the 75:25 reaction mass of the S and R enantiomers)	Účinná látka			0.05

2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	-
Bezpečnostné upozornenia	P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku. P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P103 Pozorne si prečítajte všetky pokyny a dodržiavajte ich P273 Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. P391 Zozbierajte uniknutý produkt. P501 Zneškodnite obsah/nádobu v súlade s miestnymi predpismi.

4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

4.1. Opis použitia

Použitie 1 – Profesionálne použitie - ošetrovanie prasklín, trhlín a použitie vo forme kvapiek

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	VII.2 Ochrana zdravia
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	Hymenoptera: Formicidae: <i>Lasius niger</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Monomorium pharaonis</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Linepithema humile</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Tapinoma malenocephalum</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Paratrechina longicornis</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Pheidole megacephala</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Myrmica rubra</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Crematogaster spp</i> - dospelé Hymenoptera: Formicidae: <i>Tetramorium spp & Camponotus spp</i> - dospelé
Oblasti použitia	Vnútorne, Vonkajšie Pre vnútorné a vonkajšie použitie vo forme ošetrovania prasklín, trhlín a použitie vo forme kvapiek len v obytných domoch, priemyselných zariadeniach, kanceláriách, skladoch, komerčných kuchyniach,

	nemocniciach, školách, sanatóriách, hoteloch, autobusoch, vlakoch, lietadlách, maloobchodných a obchodných zariadeniach a okolo nich.
Spôsoby aplikácie	Aplikácia návnady/nástrahy. Výrobok je aplikovaný vo forme návnady vopred naplnenou injekčnou striekačkou v zónach, ktoré nie sú prístupné deťom, ani domácim a necieľovým zvieratám. Len 0,05 % Advion Ant Gel (vopred naplnená injekčná striekačka): Aplikujte minimálne 1 kvapku gélu na 1 m ² , maximálne 5 kvapiek gélu na 1 m ² , alebo vo forme tenkej vrstvy gélu maximálne 5 cm dlhej, v každom mieste aplikácie. Pri všetkých výrobkoch vo vopred naplnenej injekčnej striekačke: Veľkosť kvapky o priemere 5 mm váži približne 0,1 g. Veľkosť kvapky o priemere 1 cm váži približne 0,5 g. Tenká vrstva gélu o dĺžke 5 cm a šírke 0,3 cm váži približne 0,4g.
Dávkovanie a frekvencia	0.1 - 0.5 g Spotreba nástrahy sa kontroluje každých 7-14 dní a podľa potreby sa dopĺňa.
Kategórie používateľov	Vyškolený profesionál Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Injekčná striekačka, plastová: HDPE, s obsahom 5 g, 10 g, 20 g, 30 g. Výrobok vopred naplnenej injekčnej striekačky je dodávaný v plastových tubách s otvorom a piestom a obsahom 30 g výrobku gélovej návnady, ktorá je utesnená skrutkovým uzáverom. Tuby sú dodávané vo štvorkusových baleniach. Vopred naplnené plastové tuby s obsahom 5 g, 10 g, 20 g and 30 g gélovej návnady sú utesnené skrutkovým uzáverom a dodávané samostatne.

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a dodržiavajte všetky uvedené pokyny.

Skontrolujte oblasť s cieľom určiť úroveň aktivity mravcov alebo zamorenia.

Aplikujte priamo najmä na miestach vstupu škodcov, podkrovie, dutiny v stene, za skriňami alebo zariadeniami, pod pultami alebo spotrebičmi, pozdĺž soklových podlahových líšt a potrubia.

Z blízkeho okolia odstráňte alternatívny zdroj potravín, ktorý môže konkurovať návnade.

Výrobok je aplikovaný vo forme návnady vopred naplnenou injekčnou striekačkou v miestach, ktoré nie sú prístupné deťom a domácim zvieratám.

Aplikácia v priestoroch kde sa manipuluje s potravinami alebo krmivom je možná len do prasklín a trhlín.

Výrobok je možné umiestniť aj vo vnútri schválených návnadových staníc alebo podobných zariadení s cieľom zabezpečiť, aby výrobok nebol prístupný deťom a domácim a necieľovým zvieratám.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nemanipulujte s gélom.

Len pre použitie na miestach, ktoré nie sú prístupné dojčatám, deťom, ani domácim a necieľovým zvieratám.

Neaplikujte na miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu prípravku s jedlom, krmivom a zariadením používaným na spracovanie a konzumáciu jedla alebo byť výrobkom kontaminované.

V prípade vonkajšieho použitia zabezpečte, aby bol výrobok aplikovaný v miestach, ktoré sú chránené pred dažďom a mokrym umývaním.

Neaplikujte v odtokoch a okolo nich.

Neaplikujte na miestach, ktoré sú pravidelne čistené – mohlo by dôjsť k odstráneniu gélovej návnady.

Neaplikujte na povrchy, kde teplota môže prekročiť 50 °C, čo môže spôsobiť skvapalnenie a stratu účinnosti gélu. Napríklad časti sporákov, rúry, grily, digestora, sauny, tepelných lúčov, fritézy, umývačky riadu a potrubí teplej vody.

Po ukončení ošetrovania poutierajte rozliaty alebo prebytočný výrobok papierovou utierkou a použitú papierovú utierku zneškodnite ako odpad.

Neaplikovať v oblastiach, ktoré sú známe výskytom vtákov, živiacich sa mravcami, pokiaľ sa nezabráni prístupu

vtákov do ošetrovanej oblasti, napr. sieťovou zábranou.
 Prikrýte návnadu na minimalizovanie prístupu necieľových zvierat.
 Spotrebu návnady je zvyčajne potrebné kontrolovať každých 7-14 dní a návnadu podľa potreby dopĺňať.

4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.
 Po manipulácii s výrobkom sa dôkladne umyte mydlom a vodou.
 Opatrenia na ochranu životného prostredia:
 Nesplachujte do povrchových vôd ani do verejnej kanalizácie.
 Neznečisťujte výrobkom alebo použitou nádobou rybníky, vodné toky alebo kanály.
 Použite vhodnú nádobu, aby ste zabránili kontaminácii životného prostredia.
 Zabráňte kontaminácii podzemných vôd.

4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Po ukončení ošetrovania poutierajte rozliaty alebo prebytočný výrobok papierovou utierkou a použitú papierovú utierku zneškodnite ako odpad.
 Nadbytočný výrobok a nádobu zneškodnite u zmluvného dodávateľa oprávneného na nakladanie s odpadom alebo na skládke.
 Výrobok musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom. V prípade potreby konzultujte s profesionálnym prevádzkovateľom odpadov alebo miestnym úradom.
 Nenapĺňajte ani nepoužívajte nádobu na gélovú návnadu opakovane.
 Nedoplňajte ani znovu nepoužívajte dávkovač gélovej návnady; prázdne dávkovače musia byť zlikvidované bezpečným spôsobom.

4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Uchovávajte v pôvodnom obale na uzamknutom, dobre vetranom a suchom mieste. Vyhňte sa nadmerným teplotám.
 Uchovávajte mimo dosahu detí.
 Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív.
 Skladovateľnosť výrobku: 2 roky.

4.2. Opis použitia

Použitie 2 – Neprofesionálne použitie - gélová návnada v návnadovej stanici

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Insekticíd
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Lasius niger</i> – Mravec záhradný - dospelé
Oblasti použitia	Vnútorne, Vonkajšie Vnútorne a vonkajšie použitie okolo bytových domov, terás a súkromných záhrad v obytných zónach neprofesionálmi.
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnadové stanice pripravené na okamžité použitie. 1 až 5 návnadových staníc na 40 m ² v zónach, kde sú mravce aktívne (na dosiahnutie maximálnej aplikačnej dávky 0,5 g gélu na 1 m ²).

	Návnadové stanice je možné vymeniť až po minimálne 7 dňoch.
Dávkovanie a frekvencia	0,5 g gélovej návnady na m ² . 1 až 5 návnadových staníc na 40 m ² v zónach, kde sú mravce aktívne (na dosiahnutie maximálnej aplikačnej dávky 0,5 g gélu na 1 m ²). Návnadové stanice je možné vymeniť až po minimálne 7 dňoch. Frekvencia aplikácie: Podľa potreby opätovne aplikujte výrobok na základe stavu návnady alebo v prípade jej spotrebovania mravcami alebo po minimálne 7 dňoch, až kým nie je populácia mravcov vyhubená. Frekvencia ošetrovania: Tri mesiace po skončení zamorenia je ošetrovanie možné zopakovať.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastové (PET/EVOH/PE) tepelne uzavreté návnadové stanice obsahujúce 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 a 6 g gélovej návnady.

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a dodržiavajte všetky uvedené pokyny.

Skontrolujte oblasť s cieľom určiť úroveň aktivity mravcov alebo zamorenia.

Návnadové stanice umiestnite v oblastiach, kde sa mravce aktívne pohybujú, majú hniezda alebo v iných zamorených oblastiach alebo v oblastiach s podozrením na zamorenie.

Aplikujte priamo najmä na miestach vstupu škodcov, podkrovie, dutiny v stene, za skriňami alebo zariadeniami, pod pultami alebo spotrebičmi, pozdĺž soklových podlahových líšt a potrubia.

Z blízkeho okolia odstráňte alternatívny zdroj potravín, ktorý môže konkurovať návnade.

V prípade vonkajšieho použitia (terasy, dvory alebo záhrady) umiestnite návnadové stanice v oblastiach, kde je pravdepodobnejší výskyt mravcov: odkvapy, rímasy a miesta vstupu vedení a potrubí do konštrukcie budovy.

Po ukončení ošetrovania odstráňte návnadové stanice a zneškodnite ich v súlade s nižšie uvedenými pokynmi.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Návnadové stanice neotvárajte, ani nemanipulujte s gélom.

Len pre použitie v oblastiach, ktoré nie sú prístupné deťom, domácim zvieratám a necieľovým organizmom.

Neaplikujte na miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu prípravku s jedlom, krmivom a zariadením používaným na spracovanie a konzumáciu jedla alebo byť výrobkom kontaminované.

V prípade vonkajšieho umiestnenia zabezpečte, aby bol výrobok aplikovaný v zónach, ktoré nie sú prístupné pre mokré pranie ani vymytie vrstvy dažďom.

V prípade vonkajšieho použitia zabezpečte, aby bol výrobok aplikovaný v miestach, ktoré sú chránené pred dažďom a mokrým umývaním.

Návnadové stanice neumiestňujte v odtokoch ani okolo nich.

4.2.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

Po manipulácii s výrobkom sa dôkladne umyte mydlom a vodou.

Opatrenia na ochranu životného prostredia:

Zabráňte kontaminácii životného prostredia.

Nesplachujte do povrchových vôd ani do verejnej kanalizácie.

Neznečisťujte výrobkom alebo použitou návnadou rybníky, vodné toky alebo kanály.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Po ukončení ošetrovania poutierajte rozliaty alebo prebytočný výrobok papierovou utierkou a použitú papierovú utierku zneškodnite ako odpad.

Nadbytočný výrobok a nádobu zneškodnite u zmluvného dodávateľa oprávneného na nakladanie s odpadom alebo na skládke.

Výrobok musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom. V prípade potreby konzultujte s profesionálnym prevádzkovateľom odpadov alebo miestnym úradom.

Nenapíňajte ani nepoužívajte nádobu na gélovú návnadu opakovane.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajú v pôvodnom obale na uzamknutom, dobre vetranom a suchom mieste. Vyhnite sa nadmerným teplotám.

Uchovávajú mimo dosahu detí.

Uchovávajú mimo dosahu potravín, nápojov a krmív.

Skladovateľnosť výrobku: 2 roky.

4.3. Opis použitia

Použitie 3 – Profesionálne použitie - návnadové stanice

Typ výrobku	Výrobky typu 18 - Insekticídy, akaricídy a výrobky na ochranu proti iným článkonožcom
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Ochrana zdravia
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)	<i>Lasius niger</i> - Mravec záhradný - dospelé
Oblasti použitia	Vnútorne, Vonkajšie Vnútorne a vonkajšie použitie okolo bytových domov, terás a súkromných záhrad v obytných zónach. Návnadové stanice pripravené na okamžité použitie.
Spôsob aplikácie	aplikácia návnady Návnadové stanice pripravené na okamžité použitie.
Dávkovanie a frekvencia	0,5 g gélovej návnady na 1 m ² . 1 až 5 návnadových staníc na 40 m ² v zónach, kde sú mravce aktívne (na dosiahnutie maximálnej aplikačnej dávky 0,5 g gélu na 1 m ²). Návnadové stanice je možné vymeniť až po minimálne 7 dňoch.
Kategórie používateľov	Vyškolený profesionál Profesionálne
Veľkosti balenia a obalový materiál	Plastové (PET/EVOH/PE) tepelne uzavreté návnadové stanice obsahujúce 1, 2, 2.5, 3, 4, 5 a 6 g gélovej návnady.

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Pred použitím si vždy prečítajte etiketu alebo písomnú informáciu pre používateľov a dodržiavajte všetky uvedené pokyny.

Skontrolujte oblasť s cieľom určiť úroveň aktivity mravcov alebo zamorenia.

Návnadové stanice umiestnite v oblastiach, kde sa mravce aktívne pohybujú, majú hniezda alebo v iných

zamorených oblastiach alebo v oblastiach s podozrením na zamorenie.

Aplikujte priamo najmä na miestach vstupu škodcov, podkrovie, dutiny v stene, za skriňami alebo zariadeniami, pod pultami alebo spotrebičmi, pozdĺž soklových podlahových líšt a potrubia.

Z blízkeho okolia odstráňte alternatívny zdroj potravín, ktorý môže konkurovať návnade.

V prípade vonkajšieho použitia (terasy, dvory alebo záhrady) umiestnite návnadové stanice v oblastiach, kde je pravdepodobnejší výskyt mravcov: odkvapy, rímasy a miesta vstupu vedení a potrubí do konštrukcie budovy.

Po ukončení ošetrovania odstráňte návnadové stanice a zneškodnite ich v súlade s nižšie uvedenými pokynmi.

4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

Návnadové stanice neotvárajte, ani nemanipulujte s gélom.

Len pre použitie v oblastiach, ktoré nie sú prístupné dojčatám, deťom, domácim zvieratám a necieľovým organizmom.

Neaplikujte na miestach, kde by mohlo dôjsť ku kontaktu prípravku s jedlom, krmivom a zariadením používaným na spracovanie a konzumáciu jedla alebo byť výrobkom kontaminované.

V prípade vonkajšieho umiestnenia zabezpečte, aby bol výrobok aplikovaný v zónach, ktoré nie sú prístupné pre mokré pranie ani vymytie vrstvy dažďom.

V prípade vonkajšieho použitia zabezpečte, aby bol výrobok aplikovaný v miestach, ktoré sú chránené pred dažďom a mokrym umývaním.

Návnadové stanice neumiestňujte v odtokoch ani okolo nich.

4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami alebo odevom.

Po manipulácii s výrobkom sa dôkladne umyte mydlom a vodou.

Opatrenia na ochranu životného prostredia:

Zabráňte kontaminácii životného prostredia.

Nesplachujte do povrchových vôd ani do verejnej kanalizácie.

Neznečisťujte výrobkom alebo použitou návnadou rybníky, vodné toky alebo kanály.

4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Po ukončení ošetrovania poutierajte rozliaty alebo prebytočný výrobok papierovou utierkou a použitú papierovú utierku zneškodnite ako odpad.

Nadbytočný výrobok a nádobu zneškodnite u zmluvného dodávateľa oprávneného na nakladanie s odpadom alebo na skládke.

Výrobok musí byť zneškodnený bezpečným spôsobom. V prípade potreby konzultujte s profesionálnym prevádzkovateľom odpadov alebo miestnym úradom.

Nenapĺňajte ani nepoužívajte nádobu na gélovú návnadu opakovane.

4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Uchovávajte v pôvodnom obale na uzamknutom, dobre vetranom a suchom mieste. Vyhnite sa nadmerným teplotám.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Uchovávajte mimo dosahu potravín, nápojov a krmív.

Skladovateľnosť výrobku: 2 roky.

5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE

5.1. Pokyny na používanie

Pozrite "autorizované použitia".

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozrite "autorizované použitia".

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozrite "autorizované použitia".

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozrite "autorizované použitia".

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozrite "autorizované použitia".

6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

-

- koniec dokumentu -