

**PT**

***ANEXO***

**RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO BIOCIDA (SPC BP)**

STORM PASTE

**Tipo(s) de produto**

PT14: Rodenticidas

**Número de autorização:** PT/DGS ARMPB-72/2016 and PT/DGS ARMPB-73/2016

**Número da decisão de autorização R4BP:** PT-0004565-0000

---

## Capítulo 1. INFORMAÇÃO ADMINISTRATIVA

### 1.1. Nome(s) comercial(ais) do produto

Nome(s) comercial(ais) do produto	Storm Paste
-----------------------------------	-------------

### 1.2. Titular da autorização

Nome e endereço do titular da autorização	Nome	BASF Portuguesa S.A.
	Endereço	Rua 25 de Abril, 1 2689-538 Prior Velho Portugal
Número de autorização	PT/DGS ARMPB-72/2016 and PT/DGS ARM PB-73/2016	
<i>Número da decisão de autorização R4BP</i>	PT-0004565-0000	
Data da autorização	05/07/2013	
Data de caducidade da autorização	31/12/2026	

### 1.3. Fabricante(s) do produto

Nome do fabricante	BASF Agro B.V. SArnhem (NL) Zeurich Branch
Endereço do fabricante	Im Tiergarten 7, 8055 Zuerich, Suíça
Localização das instalações de fabrico	Colkim s.r.l. 40064 Ozzanno Emilia, Bolgna, Itália

### 1.4. Fabricante(s) da(s) substância(s) ativa(s)

Substância ativa	Flocumafena
Nome do fabricante	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) Zeurich Branch,
Endereço do fabricante	Im Tiergarten 7, 8055, Zuerich, Suíça
Localização das instalações de fabrico	Pentagon Fine Chemicals Limited, WA8 8NS, Widnes, Reino Unido da Grã-Bretanha e da Irlanda do Norte

---

## Capítulo 2. COMPOSIÇÃO E FORMULAÇÃO DO PRODUTO

### 2.1. Informação qualitativa e quantitativa sobre a composição do produto

Denominação comum	Nome IUPAC	Função	Número CAS	Número CE	Teor (%)
Flocumafena	4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4-tetrahydro-3- [4-(4-trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1-naphthyl]coumarin	substância ativa	90035-08-8	421-960-0	0,005 % (m/m)

### 2.2. Tipo(s) de formulação

RB isco (pronto a usar)

---

### Capítulo 3. ADVERTÊNCIAS DE PERIGO E RECOMENDAÇÕES DE PRUDÊNCIA

Advertências de perigo	
Recomendações de prudência	

## Capítulo 4. UTILIZAÇÃO(ÕES) AUTORIZADA(S)

### 4.1. Descrição de utilizações

**Tabela 1. Aplicação de isco pronto a usar em locais de engodo protegidos**

Tipo de produto	PT14: Rodenticidas
Se aplicável, uma descrição exata da utilização autorizada	Aplicação de isco pronto a usar em locais de engodo protegidos.
Organismo(s)-alvo (incluindo estágio de desenvolvimento)	Nome científico: outro: Rodentia Nome comum: outro: Ratos e ratazanas Estadio de desenvolvimento: outro: Adultos e juvenis
Campo(s) de utilização	utilização em interiores utilização no exterior outro: Outro  Uso em interiores, ambiente doméstico destinado ao controlo de ratos, uso amador e profissional. Em redor de edifícios e locais de armazenamento para o controlo de ratazanas, uso profissional.
Método(s) de aplicação	Método: Aplicação de isco  Descrição detalhada: Iscos prontos a usar. Aplicação em locais protegidos
Frequência de aplicação e dosagem	Taxa de aplicação: Ratos – 1-2 pacotes (15-30g) por local de engodo / Ratazanas – 3-4 pacotes (40-60g) por local de engodo  Diluição (%): 0.005  Número e calendário da aplicação: Verificar o consumo de iscos nos primeiros 4 a 7 dias, após os quais a inspeção deverá passar para cada 7 dias. O tratamento em ratos não deverá ser superior a 21 dias e em ratazanas superior a 28 dias.
Categoria(s) de utilizadores	profissional com formação ; profissional ; público em geral (não profissional)
Capacidade e material da embalagem	Ver na descrição da embalagem, Outro balde, saco ou similar, Até 25 kg  Embalagens até 25 kg em PP/HDPE/PET (balde, garrafa, saco ou similar) com fecho em tampa ou fecho de correr PP/PE, contendo saquetas de 50g fechadas de isco pronto a usar Uso não profissional – similar mas embalagens até 3 kg Saquetas são em papel/plástico laminado. (PE e/ou PP) e contêm 15 g de isco.  Embalagens impermeáveis com fecho.

---

**4.1.1. Instruções específicas de utilização**

-

**4.1.2. Medidas de mitigação do risco específicas**

-

**4.1.3. Quando aplicável, as indicações de efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente**

-

**4.1.4. Quando aplicável, as instruções relativas à eliminação segura do produto e da sua embalagem**

-

**4.1.5. Quando aplicável, as condições de armazenamento e o prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

-

---

## Capítulo 5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A UTILIZAÇÃO<sup>1</sup>

### 5.1. Instruções de utilização

Para ratos eratazanas, colocar as saquetas na zona afectada. Os pontos de engodo deverão ser caixas ou outros dispositivos resistentes. Os roedores morrerão ao fim de 4-10 dias após a ingestão da dose letal, poderão ter que se alimentar mais do que uma vez para que tal aconteça.

Isco para ratos e ratazanas: espécies, situações, número de saquetas por ponto de engodo. Período recomendado de vistoria.: Ratos 1-2 saquetas (15-30 g) por ponto de engodo. Ratazanas 3-4 saquetas (45-60g) por ponto de engodo.

Os pontos de engodo devem estar distanciados entre si 5-10m no caso de ratazanas e 1-2m no caso dos ratos. O tratamento não deverá decorrer além dos 21 dias em ratos e 28 dias em ratazanas.

### 5.2. Medidas de redução do risco

Manter fechado a chave e fora do alcance das crianças. Manter afastado de alimentos e bebidas incluindo os dos animais. Não comer, beber ou fumar durante a utilização. Lavar as mãos e pele exposta antes das refeições e após cada utilização. Para uso exclusivo em locais inacessíveis a bebés, crianças e animais domésticos e organismos não visados. Recomenda-se o uso de luvas para evitar a transmissão de doenças transmitidas por roedores. As caixas de engodo deverão ser assinaladas e identificadas, por forma a que não sejam manuseadas por terceiros.

A prevenção de inacessibilidade a organismos não visados é uma prioridade. Os iscos deverão ser dispostos de forma a minimizar o risco de serem consumidos por outros animais e crianças. Sempre que possível, fixar os iscos de forma a que estes não sejam arrastados. O produto nunca deverá ser distribuído de forma aleatória e indiscriminada.

Busque e remova os roedores moribundos ou já mortos, de forma regular, pelo menos sempre que efetue a renovação dos iscos. Inspeções diárias poderão ser necessárias em certas circunstâncias. O estado de resistência da população a controlar deverá ser tida em consideração a quando do processo de selecção do rodenticida a usar. Nos locais onde se suspeite que existem fenómenos de resistência a determinado rodenticida, o seu uso deverá ser evitado. Para gerir o desenvolvimento de resistências deverão ser usados rodenticidas com diferentes modos de acção. Não use iscos anticoagulante de forma permanente, excepto caso seja um aplicador profissional e com formação. Na maioria das situações os iscos anticoagulantes controlam a população de roedores ao fim de 35 dias.

Este produto contém Bitrex ® para prevenir ingestão accidental por parte dos seres humanos.

### 5.3. Detalhes sobre os efeitos diretos ou indiretos prováveis, instruções de primeiros socorros e medidas de emergência para proteger o ambiente

Storm Paste é um rodenticida em isco pronto a usar contendo 0.005% flooumafena. Flooumafena é uma cumarina anticoagulante com isómeros cis- e trans-. A flooumafena é um anticoagulante de segunda geração. A ingestão da dose letal provoca hemorragias internas com a morte dos roedores averificarem-se ao fim de 3-10 dias no caso das ratazanas e 2-16 dias no caso dos ratos. Antídoto Vitamina K1 (usada sobre aconselhamento médico).

### 5.4. Instruções para a eliminação segura do produto e da sua embalagem

Os roedores mortos deverão ser eliminados segundo as instruções das autoridades de saúde locais. Após o tratamento os iscos deverão ser todos removidos e colocados em locais de recolha de resíduos perigosos. Não reutilizar a embalagem vazia.

---

<sup>1</sup>As instruções de utilização, as medidas de redução do risco e outras instruções de utilização ao abrigo da presente secção são válidas para todas as utilizações autorizadas.

---

### **5.5. Condições de armazenamento e prazo de validade do produto em condições normais de armazenamento**

Conservar na embalagem original em condições de armazenamento secas, frescas e local arejado. As instalações deverão ser para o armazenamento exclusivo deste tipo de produtos, alimentos incluindo os dos animais e produtos com odores fortes não deverão ser armazenados junto do STORM paste

---

## **Capítulo 6. OUTRAS INFORMAÇÕES**

Não definidas.