

# Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

**Naziv proizvoda:** Deosan Activate Pre RTU AG108

**Vrsta(e) proizvoda:** Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

**Broj odobrenja:** EU-0019228-0000

**Referentni broj odluke u registru  
biocidnih proizvoda (R4BP 3):** EU-0019228-0003

## Sadržaj

|                                                                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Administrativne informacije                                                                                                       | 1  |
| 1.1. Trgovački naziv proizvoda                                                                                                    | 1  |
| 1.2. Nositelj odobrenja                                                                                                           | 1  |
| 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda                                                                                            | 1  |
| 1.4. Proizvođači aktivnih tvari                                                                                                   | 1  |
| 2. Sastav i formulacija proizvoda                                                                                                 | 3  |
| 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda                                                         | 3  |
| 2.2. Vrsta formulacije                                                                                                            | 3  |
| 3. Oznake opasnosti i obavijesti                                                                                                  | 3  |
| 4. Odobrena uporaba                                                                                                               | 4  |
| 5. Opće upute za uporabu                                                                                                          | 22 |
| 5.1. Upute za uporabu                                                                                                             | 22 |
| 5.2. Mjere za smanjenje rizika                                                                                                    | 22 |
| 5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša | 22 |
| 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže                                                                              | 23 |
| 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja                                             | 23 |
| 6. Ostale informacije                                                                                                             | 23 |

## Administrativne informacije

### 1.1. Trgovački naziv proizvoda

Deosan Activate Pre RTU AG108

Deosan Activate Pre RTU

### 1.2. Nositelj odobrenja

**Naziv i adresa nositelja odobrenja**

Naziv

Diversey Europe Operations B.V.

Adresa

Maarssenbroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Nizozemska

**Broj odobrenja**

EU-0019228-0000 1-2

**Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)**

EU-0019228-0003

**Datum odobrenja**

03/04/2019

**Datum isteka odobrenja**

31/03/2029

### 1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

### 1.4. Proizvođači aktivnih tvari

**Aktivna tvar**

1319 - Jod

**Naziv proizvođača**

ACF Minera S.A.

**Adresa proizvođača**

San Martin No 499 1100000 Iquique Čile

**Lokacija proizvodnih pogona**

Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Čile

**Aktivna tvar**

1319 - Jod

**Naziv proizvođača**

Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.

**Adresa proizvođača**

Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Čile

**Lokacija proizvodnih pogona**

Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Čile

**Aktivna tvar**

1319 - Jod

**Naziv proizvođača**

Cosayach Nitratos S.A.

**Adresa proizvođača**

Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Čile

**Lokacija proizvodnih pogona**

S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Čile

**Aktivna tvar**

1319 - Jod

**Naziv proizvođača**

Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.

**Adresa proizvođača**

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japan

**Lokacija proizvodnih pogona**

Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Japan

**Aktivna tvar**

1319 - Jod

**Naziv proizvođača**

ISE Chemicals Corporation

**Adresa proizvođača**

3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Japan

**Lokacija proizvodnih pogona**

Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Japan

|                                    |                                                                       |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Aktivna tvar</b>                | 1319 - Jod                                                            |
| <b>Naziv proizvođača</b>           | Atacama Minerals SCM                                                  |
| <b>Adresa proizvođača</b>          | Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Čile       |
| <b>Lokacija proizvodnih pogona</b> | Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Čile |

## 2. Sastav i formulacija proizvoda

### 2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

| Uobičajeni naziv | IUPAC naziv | Funkcija     | CAS broj  | EC broj   | Sadržaj (%) |
|------------------|-------------|--------------|-----------|-----------|-------------|
| Jod              |             | Aktivna tvar | 7553-56-2 | 231-442-4 | 0,3         |

### 2.2. Vrsta formulacije

|                           |
|---------------------------|
| AL - svaka druga tekućina |
|---------------------------|

## 3. Oznake opasnosti i obavijesti

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Oznaka upozorenja</b> | Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Oznake obavijesti</b> | <p>Ako je potrebna liječnička pomoć pokazati spremnik ili naljepnicu.</p> <p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Izbjegavati ispuštanje u okoliš.</p> <p>Odložiti sadržaj u/na u skladu s nacionalnim propisima.</p> <p>Odložiti spremnik u/na u skladu s nacionalnim propisima.</p> |

## 4. Odobrena uporaba

### 4.1 Opis uporabe

#### Uporaba 1 - Primjena br. 1 Dezinfekcija prije mužnje, ručno uranjanje (RTU tekućina)

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                      | Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>       | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ciljni organizam(mi)<br/>(uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Bacteria<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Fungi<br>Uobičajeno ime: kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka                                                                                      |
| <b>Područje primjene</b>                                    | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Načini primjene</b>                                      | Ručno uranjanje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje<br><br>Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja                                                          |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>                   | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -<br><br>3 primjene prije mužnje dnevno po životinji<br>Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena |
| <b>Kategorije korisnika</b>                                 | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>             | Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br><br>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara                                        |

#### 4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog uranjanja.  
Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene prije mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 4.2 Opis uporabe

#### Uporaba 2 - Primjena br. 2 – Dezinfekcija prije mužnje, ručno pjenjenje (RTU tekućina)

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

##### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

##### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria  
Uobičajeno ime: Bakterije  
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Fungi  
Uobičajeno ime: kvasci  
Stadij razvoja: nema podataka

##### Područje primjene

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Načini primjene</b>                          | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Ručno pjenjenje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje<br>Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog pjenjenja.                                                            |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>       | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -<br><br>3 primjene prije mužnje dnevno po životinji<br>Nanijeti najviše 5 ml proizvoda / životinja / primjena |
| <b>Kategorije korisnika</b>                     | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b> | Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara                                           |

#### 4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. Primijenite izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog pjenjenja.  
3 primjene prije mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 5 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 4.3 Opis uporabe

#### Uporaba 3 - Primjena br. 3 Dezinfekcija prije mužnje, ručno raspršivanje (RTU tekućina)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                  | Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                    |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | -                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Bacteria<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Fungi<br>Uobičajeno ime: kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka                                                                                      |
| <b>Područje primjene</b>                                | u zatvorenom prostoru<br><br>zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Načini primjene</b>                                  | Ručno raspršivanje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije mužnje<br>Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog raspršivanja.                                                       |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -<br><br>3 primjene prije mužnje dnevno po životinji<br>Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena |
| <b>Kategorije korisnika</b>                             | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### **Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara  
Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara  
Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

#### **4.3.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodom ručnog raspršivanja.  
Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene prije mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena

#### **4.3.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

#### **4.3.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### **4.3.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### **4.3.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### **4.4 Opis uporabe**

**Uporaba 4 - Primjena br. 4 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno uranjanje (RTU tekućina)**

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                  | Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                            |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | -                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | <p>Znanstveno ime: Bacteria<br/>Uobičajeno ime: Bakterije<br/>Stadij razvoja: nema podataka</p> <p>Znanstveno ime: Fungi<br/>Uobičajeno ime: kvasci<br/>Stadij razvoja: nema podataka</p>                                                                                   |
| <b>Područje primjene</b>                                | <p>u zatvorenom prostoru</p> <p>Zatvoreni prostor</p>                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Načini primjene</b>                                  | <p>Ručno uranjanje – -</p> <p>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje<br/>Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.</p>                                                             |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | <p>Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -</p> <p>3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji<br/>Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena</p> |
| <b>Kategorije korisnika</b>                             | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>         | <p>Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br/>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br/>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara</p>                                           |

#### 4.4.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog uranjanja.  
Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.4.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.4.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.4.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.4.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 4.5 Opis uporabe

#### Uporaba 5 - Primjena br. 5 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno pjenjenje (RTU tekućina)

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

##### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

##### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria  
Uobičajeno ime: Bakterije  
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Fungi  
Uobičajeno ime: kvasci  
Stadij razvoja: nema podataka

##### Područje primjene

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Načini primjene</b>                          | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Ručno pjenjenje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje<br>Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.                                                            |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>       | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -<br><br>3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji<br>Nanijeti najviše 5 ml proizvoda / životinja / primjena |
| <b>Kategorije korisnika</b>                     | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b> | Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara                                           |

#### 4.5.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 5 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.5.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.5.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.5.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.5.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.6 Opis uporabe

##### Uporaba 6 - Primjena br. 6 – Dezinfekcija nakon mužnje, ručno raspršivanje (RTU tekućina)

###### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

###### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

###### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria  
Uobičajeno ime: Bakterije  
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Ulocladium atrum  
Uobičajeno ime: kvasci  
Stadij razvoja: nema podataka

###### Područje primjene

u zatvorenom prostoru

Zatvoreni prostor

###### Načini primjene

Ručno raspršivanje – -

Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje  
Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

###### Broj i vremenski raspored primjena

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -

3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena

###### Kategorije korisnika

profesionalac

#### **Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara  
Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara  
Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

#### **4.6.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.  
Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena

#### **4.6.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

#### **4.6.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### **4.6.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### **4.6.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.7 Opis uporabe

##### Uporaba 7 - Primjena br. 7 – Dezinfekcija nakon mužnje, automatsko raspršivanje (ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje) (RTU tekućina)

|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vrsta proizvoda                                     | Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ciljni organizam(mi)<br>(uključujući razvojnu fazu) | Znanstveno ime: Bacteria<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Fungi<br>Uobičajeno ime: kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka                                                                                                                                                       |
| Područje primjene                                   | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Načini primjene                                     | Automatsko raspršivanje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje<br>Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom automatskog raspršivanja.                                                                                                              |
| Broj i vremenski raspored primjena                  | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. – -<br><br>5 primjena nakon mužnje dnevno po životinji; Ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje na bazi joda.<br><br>Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena |
| Kategorije korisnika                                | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Veličine pakiranja i ambalažni materijal            | Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br><br>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br><br>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara                                                                                                     |

#### 4.7.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom automatskog raspršivanja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 5 primjena nakon mužnje dnevno po životinji; Ne kombinirati s dezinfekcijom prije mužnje na bazi joda. Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.7.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.7.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.7.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.7.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 4.8 Opis uporabe

#### Uporaba 8 - Primjena br. 8 – Dezinfekcija nakon mužnje, poluautomatsko uranjanje (RTU tekućina)

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

##### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

##### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria  
Uobičajeno ime: Bakterije  
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Fungi  
Uobičajeno ime: kvasci  
Stadij razvoja: nema podataka

##### Područje primjene

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Načini primjene</b>                          | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                 | Poluautomatsko uranjanje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji nakon mužnje<br>Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja.                                          |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>       | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe -<br><br>3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji<br>Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena |
| <b>Kategorije korisnika</b>                     | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b> | Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br><br>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara                                       |

#### 4.8.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Primjenjuje se izravno na sise životinje nakon mužnje metodom poluautomatskog uranjanja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji  
Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.8.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.8.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.8.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.8.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 4.9 Opis uporabe

#### Uporaba 9 - Primjena br. 9 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno uranjanje (RTU tekućina)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                  | Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Bacteria<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Fungi<br>Uobičajeno ime: kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka                                                                                                                                |
| <b>Područje primjene</b>                                | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Načini primjene</b>                                  | Ručno uranjanje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje<br><br>Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodama ručnog uranjanja                                                                                   |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe -<br><br>3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);<br>Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena |

**Kategorije korisnika**

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara

Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara

Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

**4.9.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije mužnje metodama ručnog uranjanja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. 3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena); Nanijeti najviše 10 ml proizvoda / životinja / primjena

**4.9.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Nosite zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

**4.9.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

**4.9.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

**4.9.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.10 Opis uporabe

##### Uporaba 10 - Primjena br. 10 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno pjenjenje (RTU tekućina)

|                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vrsta proizvoda</b>                                  | Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe</b>   | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)</b> | Znanstveno ime: Bacteria<br>Uobičajeno ime: Bakterije<br>Stadij razvoja: nema podataka<br><br>Znanstveno ime: Fungi<br>Uobičajeno ime: kvasci<br>Stadij razvoja: nema podataka                                                                                                                                |
| <b>Područje primjene</b>                                | u zatvorenom prostoru<br><br>Zatvoreni prostor                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Načini primjene</b>                                  | Ručno pjenjenje – -<br><br>Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje<br>Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.                                                                                       |
| <b>Broj i vremenski raspored primjena</b>               | Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -<br><br>3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);<br>Nanijeti najviše 5 ml proizvoda / životinja / primjena |
| <b>Kategorije korisnika</b>                             | profesionalac                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Veličine pakiranja i ambalažni materijal</b>         | Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara<br>Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara<br>Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara                                                                                      |

#### 4.10.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
Primijeniti izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog pjenjenja.  
3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena); Nanijeti najviše 5 ml proizvoda / životinja / primjena

#### 4.10.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)

#### 4.10.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.10.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.10.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 4.11 Opis uporabe

#### Uporaba 11 - Primjena br. 11 – Dezinfekcija prije i nakon mužnje, ručno raspršivanje (RTU tekućina)

##### Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 03: Biocidni proizvodi u veterinarskoj higijeni (dezinficijensi)

##### Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe

-

##### Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)

Znanstveno ime: Bacteria  
Uobičajeno ime: Bakterije  
Stadij razvoja: nema podataka

Znanstveno ime: Fungi  
Uobičajeno ime: kvasci  
Stadij razvoja: nema podataka

##### Područje primjene

u zatvorenom prostoru

zatvoreni prostor

**Načini primjene**

Ručno raspršivanje – -

Sredstvo za dezinfekciju sisa za izravnu primjenu na životinjama u laktaciji prije i nakon mužnje  
Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja.

**Broj i vremenski raspored primjena**

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w) - Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe. -

3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena);  
Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena.

**Kategorije korisnika**

profesionalac

**Veličine pakiranja i ambalažni materijal**

Spremnik od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 1, 5 i 20 litara  
Bačva od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 200 litara

Spremnik za robu u rasutom stanju (IBC) od HDPE ili f-HDPE plastike zapremnine 950 litara

**4.11.1 Upute za uporabu specifične za uporabu**

Primjenjuje se izravno na sise životinje prije i nakon mužnje metodom ručnog raspršivanja. Formulacija spremna za uporabu sadrži 0,3 % w/w joda. Ne razrjeđivati prije uporabe.  
3 primjene prije i 3 primjene nakon mužnje dnevno po životinji (do ukupno 5 primjena); Nanijeti najviše 15 ml proizvoda / životinja / primjena

**4.11.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu**

Nositi zaštitne rukavice otporne na kemikalije tijekom faze rukovanja proizvodom (materijal rukavica navodi nositelj odobrenja u informacijama o proizvodu)  
Nositi odgovarajuću zaštitnu obuću (EN 13832) prilikom primjene proizvoda. Potrebno je nositi zaštitno radno odijelo (barem tipa 6, EN 13034).

**4.11.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša**

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.11.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

#### 4.11.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

Pogledajte odjeljak 5. – Opće upute za uporabu

### 5. Opće upute za uporabu

#### 5.1. Upute za uporabu

Proizvod je potrebno dovesti do temperature  $> 20^{\circ}\text{C}$  prije uporabe

Prije mužnje:

Nanijeti proizvod cijelom dužinom svake sise.

Za učinkovitu uporabu protiv bakterija i gljivica proizvod mora ostati u dodiru s kožom najmanje 30 sekundi.

Nakon odgovarajućeg vremena kontakta temeljito uklonite proizvod jednim listom papirnatoг ručnika / krpom da biste osigurali da su sise čiste i suhe.

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w)

Nakon mužnje:

Prekrijte cijelu dužinu svake sise proizvodom odmah nakon mužnje.

Da biste osigurali dostatno vrijeme kontakta, proizvod se ne smije uklanjati odmah nakon primjene (npr. krave trebaju ostati stajati najmanje 5 minuta)

Koncentracija joda za primjenu iznosi 3000 mg/kg (0,3 % w/w)

#### 5.2. Mjere za smanjenje rizika

Ovaj se proizvod može koristiti za kombiniranu dezinfekciju prije i nakon mužnje (najviše pet puta po životinji po danu). Međutim, ne smije se koristiti u kombinaciji s drugim proizvodom na bazi joda.

Preporučuje se upotreba pumpe za doziranje za punjenje proizvoda u opremu za nanošenje.

#### 5.3. Pojednosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Udisanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni. Dodir s kožom: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni. Dodir s očima: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni. Gutanje: nisu poznati učinci ni simptomi pri uobičajenoj primjeni.

U slučaju udisanja: osigurajte dovod svježeg zraka; obratite se liječniku u slučaju pojave simptoma.

U slučaju dodira s kožom: odmah operite vodom i sapunom i temeljito isperite.

U slučaju dodira s očima: ispirite otvoreno oko nekoliko minuta pod tekućom vodom (najmanje 15 minuta). U slučaju gutanja: ispirite usta i popijte veću količinu vode. Odmah pozovite liječnika.

Ako je potrebna liječnička pomoć, pokažite mu spremnik ili naljepnicu proizvoda

Stabilnost i reaktivnost:

Reaktivnost: nisu poznate opasnosti uslijed reaktivnosti u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe. Kemijska stabilnost: stabilno u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Mogućnost opasnih reakcija: nisu poznate opasne reakcije u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe. Uvjeti koje je potrebno izbjegavati: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Opasni produkti razlaganja: nisu poznati u uobičajenim uvjetima skladištenja i uporabe.

Ekološke mjere opreza: nasip za sakupljanje većih izljeva.

Zaustavite daljnje izlijevanje i/ili upotrijebite inertni materijal za upijanje izljeva, zatim pohranite u prikladan spremnik. Spriječite otjecanje u odvođe, kanalizaciju ili vodne putove.

Prikupite u prikladne zatvorene spremnike radi odlaganja.

Ne vraćajte izliveno materijale u izvorni spremnik.

## 5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Prazni spremnici moraju se isprati tri puta prije odlaganja

Papirnati ručnici koji se upotrijebe za sušenje sisa životinja i uklanjanje proizvoda s njih trebaju se odložiti zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom. Ne izlijevati nerazrijeđeni proizvod u kanalizaciju.

## 5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Čuvati isključivo u originalnom, zatvorenom spremniku

Zaštititi od mraza

Ne čuvati pri temperaturama iznad 30 °C

Vijek trajanja 24 mjeseca.

## 6. Ostale informacije

Nema