




Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL
SERVIZIO FARMACEUTICO

Ufficio I - Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Classif: I.5.i.d.2/238

Allegati: 1 decreto + 2 allegati



Spett.le

**I.N.D.I.A. INDUSTRIE
CHIMICHE SPA**

Via Sorgaglia 25

35020 Arre

Padova

Italia

**OGGETTO: Prodotto biocida MEGALON CEREALI - MICIDEX CEREALI - BROMORAT
GRANI PROFESSIONAL - STUN PRO GRANO ROSSO - INDORAT CEREALI - RODEXION
CEREALI**

Trasmissione decreto di modifica amministrativa.

Si trasmette, in allegato, il decreto di modifica amministrativa dell'autorizzazione n.
IT/2014/00229/AUT relativa al biocida indicato in oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I
(Dr.ssa Paola Messandro)

Referente tecnico: Raffaella Perrone - 06.5994 2520
email: r.perrone@sanita.it
DM



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO I – AFFARI GENERALI E PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI
D.G.D.M.F./I.5.i.d.2/2014/238
IT/2014/00229/AUT

IL DIRETTORE

~~VISTO l'art. 15 della Legge n. 97 del 06 agosto 2013 recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013";~~

~~VISTO il Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 maggio 2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e sull'uso dei biocidi;~~

~~VISTO il Regolamento di esecuzione del 18 aprile 2013 n. 354/2013 recante il Regolamento sulle modifiche dei biocidi autorizzati a norma del Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio;~~

~~VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1380 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del bromadiolone come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14;~~

VISTO il D.D. del 21 luglio 2014 con n. **IT/2014/00229/AUT** con il quale questa amministrazione ha autorizzato l'immissione in commercio del prodotto biocida denominato "**MEGALON CEREALI**" esca topicida a base di bromadiolone, pronta all'uso in grano per uso professionale con un periodo di validità di 24 mesi;

ATTESO che la titolarità del biocida predetto è attualmente attribuita alla società **I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L con sede legale in VIA SORGAGLIA 25, 35020 ARRE (PD)**;

VISTA l'istanza registrata il 14/06/2018 sul Registro Europeo R4BP3 Case number **BC-DS040123-43**, con cui la società **I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L con sede legale in VIA SORGAGLIA 25, 35020 ARRE (PD)** ha chiesto la modifica amministrativa dell'autorizzazione relativamente all'aggiunta dei nomi **MICIDEX CEREALI, BROMORAT GRANI PROFESSIONAL, STUN PRO GRANO ROSSO, INDORAT CEREALI, RODEXION CEREALI**;

VISTA la documentazione presentata dalla società istante a sostegno della suddetta istanza di autorizzazione;

DECRETA:

L'autorizzazione del prodotto biocida è così modificato:

DENOMINAZIONE	MEGALON CEREALI MICIDEX CEREALI BROMORAT GRANI PROFESSIONAL STUN PRO GRANO ROSSO INDORAT CEREALI RODEXION CEREALI
----------------------	--





Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO I – AFFARI GENERALI E PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI

D.G.D.M.F./I.5.i.d.2/2014/238

IT/2014/00229/AUT

TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE E RESPONSABILE DELL'IMMISSIONE SUL MERCATO <ul style="list-style-type: none">▪ Sede legale▪ Direzione Commerciale	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L VIA SORGAGLIA 25 35020 ARRE (PD) Italia
SOSTANZA ATTIVA	BROMADIOLONE (CAS 28772-56-7)
PT	14 RODENTICIDI
OFFICINE DI PRODUZIONE	INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. Via Sorgaglia,40 35020 Arre (PD) Italia
DESCRIZIONE PRODOTTO	Esca topicida a base di bromadiolone, pronta all'uso in grano per uso professionale e per professionisti addestrati
CONFEZIONI/TAGLIE	Per uso professionale: a) bustine pre-dosate sigillate, in carta alimentare, contenenti g 10-12,5-15-20 di esca rodenticida cadauna, in confezioni a partire da 1,5 kg fino a 25 kg b) sacchetti, cartoni o secchielli a partire da 1,5 fino a 25 kg c) barattoli e buste a partire da 1,5 kg fino a 25 kg d) stazioni sigillate pronte all'uso da 250g (quantità minima per gli utilizzatori professionali 1,5 kg) Per professionisti addestrati : a) bustine pre-dosate sigillate, in carta alimentare, contenenti g 10-12,5-15-20 di esca rodenticida cadauna, in confezioni a partire da 1,5 kg fino a 25 kg b) sacchetti, cartoni o secchielli a partire da 1,5 fino a 25 kg c) barattoli e buste a partire da 1,5 kg fino a 25 kg d) stazioni sigillate pronte all'uso da 250g (quantità minima per gli utilizzatori



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO
UFFICIO I - AFFARI GENERALI E PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO DIVERSI DAI DISPOSITIVI MEDICI
D.G.D.M.F./ I.5.i.d.2/2014/238
IT/2014/00229/AUT

	professionali 1,5 kg)
CATEGORIA DI UTILIZZATORI	Per uso professionale e per professionisti addestrati
STABILITA' PRODOTTO	24 mesi
NUMERO DI AUTORIZZAZIONE	IT/2014/00229/AUT
ASSET NUMBER	IT-0006719-0000
SCADENZA AUTORIZZAZIONE	31 dicembre 2022
COMPOSIZIONE DEL PRODOTTO	Vedi allegato 1 (dato confidenziale)

La società **I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE S.R.L** in qualità di titolare della registrazione n. **IT/2014/00229/AUT** relativa al prodotto biocida **MEGALON CEREALI** - con validità fino a 24 mesi - è autorizzata alla modifica amministrativa comportante l'aggiunta dei nomi **MICIDEX CEREALI, BROMORAT GRANI PROFESSIONAL, STUN PRO GRANO ROSSO, INDORAT CEREALI, RODEXION CEREALI** al prodotto biocida **MEGALON CEREALI**.

Detto prodotto biocida rimane registrato al progressivo numerico **IT/2014/00229/AUT**, e continuerà ad essere prodotto presso l' officina indicata con la medesima composizione, nelle confezioni già autorizzate. E' approvato e fa parte integrante del presente decreto il sommario delle caratteristiche del prodotto (**allegato 1**). Si allega copia delle etichette trasmesse dalla società titolare a corredo della presente autorizzazione. Le modifiche a tali etichette non rientranti tra quelle indicate nell'allegato del Regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013, possono essere apportate dalla società titolare autonomamente e sotto la propria responsabilità (All.2). Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla ditta interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma, li 17 LUG. 2018

IL DIRETTORE
(Dr.ssa Paola D'Alessandro)

ALL 1

Summary of product characteristics for a biocidal product

1. Administrative information

1.1. Trade names of the product

Market area	Trade name(s)
Italy	Megalon cereali
Italy	Bromorat grani professional
Italy	Stun Pro grano rosso
Italy	Micdex cereali
Italy	Rodexion cereali
Italy	Indorat cereali

1.2. Authorisation holder

Authorisation number

Not defined

Date of the authorisation

Not defined

Expiry date of the authorisation

Not defined

Name and address of the
authorisation holder

Name
Address

Not defined
Not defined

1.3. Manufacturers of the product

Name of the manufacturer	INDUSTRIALCHIMICA Srl			
Address of the manufacturer	via Sorgaglia 40 Arre	35020	Padova	Italy
Location of manufacturing sites	via Sorgaglia 40 Arre	35020	Padova	Italy

1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

BAS number: 12

Name of the manufacturer	ACTIVA SRL / Dr Tezza srl			
Address of the manufacturer	Via Feltre 32	20132	Milano	Italy
Location of manufacturing sites	Via Tre Ponti 22 Santa Maria di Zevio	37050	Verona	Italy

2. Product composition and formulation

2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

BAS number	EC number	CAS number	Common name	IUPAC name	Function	Content (%)
12	249-205-9	28772-56-7	Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Active Substance	0.005
-	223-095-2	3734-33-6	Denatonium benzoate	Denatonium benzoate	Human taste deterrent	0.001

2.2. Type of formulation

RB - Bait (ready for use)

3. Hazard and precautionary statements

Hazard statements	May damage fertility or the unborn child. Causes damage to organs (BL, OOD) through prolonged or repeated exposure
-------------------	---

Precautionary statements Obtain special instructions before use.
Do not handle until all safety precautions have been read and understood

Do not breathe *dust*.
Do not eat, drink or smoke when using this product.
Wear *protective gloves*.
IF exposed or concerned: Get medical advice.
Dispose of contents to in accordance with national and international regulations.

4. Authorised use(s)

4.1. Use # 1 House mice and/or rats – trained professionals – indoor

Product type(s) PT14 - Rodenticides (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use Not relevant for rodenticides

Field(s) of use Indoor

Category(ies) of users Trained professional

Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Adults and juveniles
	Rattus norvegicus	Brown rat	Adults and juveniles
	Rattus rattus	Roof rat	Adults and juveniles

Application method(s)

Method Bait application

Description

Bait formulations:
- Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait stations.

Rate: - High infestation: 60-100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 40-60 g of bait per baiting point.

Dilution: not applicable%

Timing:

Pack sizes and packaging material Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait

Packaging material: Plastic Composite.

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams.

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag.

4.1.1. Use-specific instructions for use

- Remove the remaining product at the end of treatment period

4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign
- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.
- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.
- Products may only be used in permanent treatments at those sites with a high potential for reinvasion when other methods of control have proven insufficient
- Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities
- Do not use the product in pulsed baiting treatments

4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- When placing bait points close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

4.2. Use # 2 Mice and/or rats – trained professionals – outdoor around buildings

Product type(s) PT14 - Rodenticides (Pest control)

Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Outdoor Outdoor around buildings		
Category(ies) of users	Trained professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Adults and juveniles
	Rattus norvegicus	Brown rat	Adults and juveniles
	Rattus rattus	Roof rat	Adults and juveniles
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Bait formulations: - Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait stations - Direct application of ready-to-use bait into the burrow		
Rate:	Bait products: - High infestation: 60-100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 40-60 g of bait per baiting point.		
Dilution:	not applicable%		
Timing:			
Pack sizes and packaging material	Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait		
Packaging material:	Plastic Composite.		

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams.

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag

4.2.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions - Place the baiting points in areas not liable to flooding.
- Replace any bait in baiting points in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt
- Remove the remaining product at the end of treatment period.

4.2.2. Use-specific risk mitigation measures

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign.
- Consider preventive control measures (plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.
- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.
- Products may only be used in permanent treatments at those sites with a high potential for reinvasion when other methods of control have proven insufficient
- Do not use this product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.
- Do not use this product in pulsed baiting treatments.

4.2.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- When placing bait points close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

4.3. Use # 3 – Rats – trained professionals – Outdoor open areas & waste dump

Product type(s) PT14 - Rodenticides (Pest control)

Where relevant, an exact Not relevant for rodenticides

description of the authorised use

Field(s) of use	Outdoor		
	Outdoor open areas		
Outdoor waste dumps.			
Category(ies) of users	Trained professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Adults and juveniles
	Rattus norvegicus	Brown rat	Adults and juveniles
	Rattus rattus	Roof rat	Adults and juveniles

Application method(s)

Method	Bait application
Description	<p>Bait formulations:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait stations - Direct application of ready-to-use bait into the burrow

Rate: Bait products: - High infestation: 60-100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 40-60 g of bait per baiting point.

Dilution: not applicable%

Timing:

Pack sizes and packaging material Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait

Packaging material: Plastic Composite.

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag.

4.3.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions. Place the bait stations in areas not liable to flooding.
- Replace any bait in baiting points in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.
- Remove the remaining product at the end of treatment period
- Follow any additional instructions provided by the relevant code of best practice.

4.3.2. Use-specific risk mitigation measures

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign.
- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.
- Products may only be used in permanent treatments at those sites with a high potential for reinvasion when other methods of control have proven insufficient.
- Do not use this product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.
- Do not use this product in pulsed baiting treatments

4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- When placing bait points close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided

4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging**4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage**

- Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented

4.4. Use # 4 – Rats – trained professionals – sewers

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Other Sewers		
Category(ies) of users	Trained professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Rattus norvegicus	Brown rat	Adults and juveniles
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	- Ready-to-use bait to be anchored or applied in bait stations preventing the bait from getting into contact with waste water.		
Rate:	MANCA		
Dilution:	not applicable%		
Timing:			
Pack sizes and packaging material	Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait.		

Packaging material: Plastic Composite.

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag

4.4.1. Use-specific instructions for use

- Baits must be applied in a way so that they do not come into contact with water and are not washed away.
- Follow any additional instructions provided by the relevant code of best practice.

4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

- [If national policy or legislation requires it] Place baits only in sewer systems which are connected to the sewage treatment plant
- Do not use this product in pulsed baiting treatments

4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment**4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging****4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage****4.5. Use # 5 – House mice – professionals – indoor**

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Adults and juveniles
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations		

Rate: - 40g of bait per bait point. If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.
Dilution: not applicable%
Timing: -

Pack sizes and packaging material Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait.

Packaging material: Plastic Composite.

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams.

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag

4.5.1. Use-specific instructions for use

- The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

-

4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- When placing bait points close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

-

4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

-

4.6. Use # 6 – Rats – professionals – indoor

Product type(s)	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Indoor		
Category(ies) of users	Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Rattus norvegicus	House mouse	Adults and juveniles
	Rattus rattus	Roof rat	Adults and juveniles
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations.		

Rate: 60-100g of bait per bait point. If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.
Dilution: not applicable%
Timing: -

Pack sizes and packaging material Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait.

Packaging material: Plastic Composite.

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams.

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag.

4.6.1. Use-specific instructions for use

- The bait stations should be visited only 5 to 7 days after the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

4.6.2. Use-specific risk mitigation measures

4.6.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- When placing bait points close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.6.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.6.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

4.7. Use # 7 – House mice and/or rats – professionals – outdoor around buildings

Product type(s)	PT14.5: Rodenticides (Pest control)		
Where relevant, an exact description of the authorised use	Not relevant for rodenticides		
Field(s) of use	Outdoor		
Category(ies) of users	Outdoor around buildings Professional		
Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Adults and juveniles
	Rattus norvegicus	Brown rat	Adults and juveniles
	Rattus rattus	Roof rat	Adults and juveniles
Application method(s)			
Method	Bait application		
Description	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations.		

Rate: stations should be of 5 meters. - for mice 40 g of bait per bait point - 60-100g of bait per bait point. If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.

Dilution: not applicable%

Timing:

Pack sizes and packaging material Minimum pack size of 1,5 kg of loose bait.

Packaging material: Plastic Composite.

Minimum pack size of 1,5 kg containing pre-dosed paper sachets of 10-12,5-15-20 grams.

Packaging material: Plastic Composite.

Package is restricted to separately packed bags with a maximum of 5 kg per packed bag.

4.7.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions (e.g. rain, snow, etc.) Place the bait stations in areas not liable to flooding.

- The bait stations should be visited [for mice - at least every 2 to 3 days at] [for rats - only 5 to 7 days after] the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

- Replace any bait in a bait station in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.

4.7.2. Use-specific risk mitigation measures

- Do not apply this product directly in the burrows.

4.7.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- When placing bait points close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

4.7.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

4.7.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Shelf life: 24 months.

5. General directions for use

5.1. Instructions for use

- Read and follow the product information as well as any information accompanying the product or provided at the point of sale before using it.
- Carry out a pre-baiting survey of the infested area and an on-site assessment in order to identify the rodent species, their places of activity and determine the likely cause and the extent of the infestation.
- Remove food which is readily attainable for rodents (e.g. spilled grain or food waste). Apart from this, do not clean up the infested area just before the treatment, as this only disturbs the rodent population and makes bait acceptance more difficult to achieve.
- The product should only be used as part of an integrated pest management (IPM) system, including, amongst others, hygiene measures and, where possible, physical methods of control.
- The product should be placed in the immediate vicinity of places where rodent activity has been previously explored (e.g. travel paths, nesting sites, feedlots, holes, burrows etc.)
- Where possible, bait stations must be fixed to the ground or other structures.
- Bait stations must be clearly labelled to show they contain rodenticides and that they must not be moved or opened (see section 5.3 for the information to be shown on the label).
- When the product is being used in public areas, the areas treated should be marked during the treatment period and a notice explaining the risk of primary or secondary poisoning by the anticoagulant as well as indicating the first measures to be taken in case of poisoning must be made available alongside the baits.
- Bait should be secured so that it cannot be dragged away from the bait station.
- Place the product out of the reach of children, birds, pets and farm animals and other non-target animals.
- Place the product away from food, drink and animal feeding stuffs, as well as from utensils or surfaces that have contact with these.
- Wear protective chemical resistant gloves during product handling phase.
- When using the product do not eat, drink or smoke. Wash hands and directly exposed skin after using the product.
- The frequency of visits to the treated area should be at the discretion of the operator, in the light of the survey conducted at the outset of the treatment. That frequency should be consistent with the recommendations provided by the relevant code of best practice.
- If bait uptake is low relative to the apparent size of the infestation, consider the replacement of bait points to further places and the possibility to change to another bait formulation.
- If after a treatment period of 35 days baits are continued to be consumed and no decline in rodent activity can be observed, the likely cause has to be determined. Where other elements have been excluded, it is likely that there are resistant rodent so consider the use of a non-anticoagulant rodenticide, where available, or a more potent anticoagulant rodenticide. Also consider the use of traps as an alternative control measure.
- Instructions for use that are "bait-specific": grains/pellets: Place the bait in the baiting point by using a dosage device.

5.2. Risk mitigation measures

- During loose grain transfer operations wear appropriate protective devices for the respiratory tract (respiratory mask disposable EN149 FFP2). Avoid touching the product with bare hands and wear appropriate gloves.
- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders about the rodent control campaign.

applicable training requirements (e.g. "for trained professionals only")

- Do not use in areas where resistance to the active substance can be suspected
- Products shall not be used beyond 35 days without an evaluation of the state of the infestation and of the efficacy of the treatment unless authorised for permanent baiting treatments.
- Do not rotate the use of different anticoagulants with comparable or weaker potency for resistance management purposes. For rotational use, consider using a non-anticoagulant rodenticide, if available, or a more potent anticoagulant.
- Do not wash the bait stations or utensils used in covered and protected bait points with water between applications.
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

- This product contains an anticoagulant substance. If ingested, symptoms, which may be delayed, may include nosebleed and bleeding gums. In severe cases, there may be bruising and blood present in the faeces or urine.

~~- Antidote: Vitamin K1 administered by medical/veterinary personnel only~~

- In case of:
 - Dermal exposure, wash skin with water and then with water and soap.
 - Eye exposure, rinse eyes with eyes-rinse liquid or water, keep eyes lids open at least 10 minutes.
 - Oral exposure, rinse mouth carefully with water. Never give anything by mouth to unconscious person. Do not provoke vomiting. If swallowed, seek medical advice immediately and show the product's container or label. Contact a veterinary surgeon in case of ingestion by a pet

~~- Bait stations must be labelled with the following information: "do not move or open"; "contains a rodenticide"; "product name or authorisation number"; "active substance(s)" and "in case of incident, call a poison centre~~

- Hazardous to wildlife

5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

- At the end of a treatment, dispose of bait boxes containing any remaining bait accordance to current regulations.

5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

- Store in a dry, cool and well ventilated place. Keep the container closed and away from direct sunlight.
- Store in places prevented from the access of children, birds, pets and farm animals
- Shelf life: 24 months

6. Other information

- Because of their delayed mode of action, anticoagulant rodenticides may take from 4 to 10 days to be effective after effective consumption of the bait.
- Rodents can be disease carriers. Do not touch dead rodents with bare hands, use gloves or use tools such as tongs when disposing them.
- This product contains a bittering agent and a dye.

All. 2

Etichetta e foglio illustrativo

MEGALON CEREALI*

Composizione:

100 g di prodotto contengono:
Bromadiolone (N° CAS 28772-56-7) 0,005 g
Denatonium Benzoate 0,001 g
Sostanze appetibili e coformulanti q.b a 100 g



PERICOLO

INDICAZIONI DI PERICOLO

H360D Può nuocere al feto.

H372 Provoca danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

CONSIGLI DI PRUDENZA

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
P260 Non respirare la polvere.
P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
P280 Indossare guanti.
P308+313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.
P501 Smaltire il prodotto in base alle legislazione locale.

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2014/00229/AUT

Titolare dell'autorizzazione

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE s.r.l., Via Sorgaglia 25 – 35020 Arre (PD) Tel. 049.807.61.44 Fax 049.807.61.46

Officine di produzione

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l., Via Sorgaglia, 40 – 35020 Arre (PD)

Validità: 24 mesi (se conservato in confezione integra originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dai raggi solari)

Lotto n. ... del ...

Confezione:

- a) bustine pre-dosate sigillate, in carta alimentare, contenenti g 10-12,5-15-20 di esca rodenticida cadauna, in confezioni a partire da 1.5 kg fino a 25 kg
- b) sacchetti, cartoni o secchielli a partire da 1.5 kg fino a 25 kg
- c) barattoli e buste a partire da 1.5 kg fino a 25 kg
- d) stazioni sigillate pronte all'uso da 250 g (quantità minima per gli utilizzatori professionali 1.5kg)

MEGALON CEREALI

Esca topicida a base di Bromadiolone, pronta all'uso in grano.

Per professionista addestrato all' interno e intorno edifici, aree aperte, discariche e fognature

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

INDIA SRL
VIA SORGAGLIA 25
35020 ARRE - PD
P.A. 0498076144

MEGALON_CEREALI_ITA_LABEL_TRPRO
06/06/2018

Pericoloso per gli animali selvatici

CARATTERISTICHE TECNICHE

MEGALON CEREALI è un'esca pronta all'uso a base di Bromadiolone formulata in grano. È efficace per il controllo di topi e ratti (*Mus musculus*), (*Rattus norvegicus*), (*Rattus rattus*), appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. L'ingestione di una quantità sufficiente di esca causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli anticoagulanti, che provocano emorragie interne letali.

Grazie alla sua appetibilità MEGALON CEREALI può essere impiegato con successo per derattizzazioni all'interno ed intorno ad ogni ambiente domestico, civile, industriale (case, uffici, comunità, industrie, depositi merci, mezzi navali ecc.), rurale (allevamenti, case di campagna ecc.) e anche in campo aperto (giardini, viali, parchi ecc.).

MODALITÀ APPLICATIVE E INDICAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere l'etichetta.

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto da posizionarsi all'interno di stazioni di esca oppure in coperti e protetti punti esca se questi garantiscono lo stesso livello di protezione per le specie non target e gli umani come le stazioni di esca secondo i dosaggi sotto riportati.

Durante le operazioni di trasferimento del grano sfuso, indossare dispositivi di protezione appropriate per il tratto respiratorio (maschera respiratoria usa e getta EN149 FFP2). Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed indossare guanti adatti.

Effettuare prima del trattamento un'indagine dell'area infestata e una valutazione in loco per identificare le specie di roditori, i loro luoghi di attività e determinare la probabile causa e la portata dell'infestazione. Prima del trattamento informare la zona sul trattamento di derattizzazione.

Rimuovere gli alimenti raggiungibili per i roditori (ad esempio grano sfuso o rifiuti alimentari). Non ripulire l'area infestata poco prima del trattamento, in quanto ciò disturba la popolazione di roditori e rende più difficile l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere utilizzato solo come parte di un sistema integrato di gestione dei parassiti (IPM), tra cui, misure di igiene e, ove possibile, metodi di controllo fisici.

Prendere in considerazione misure di controllo preventivo per migliorare l'assunzione di prodotti e ridurre la probabilità di re-invasione.

Le stazioni d'esca dovrebbero essere posizionate nelle immediate vicinanze dei luoghi dove è stata osservata la presenza di roditori (ad es. luoghi di percorrenza, siti di nidificazione, fori, ecc.); devono essere fissate a terra o ad altre strutture ed essere chiaramente etichettate per mostrare che contengono rodenticidi e che non devono essere spostati o aperti.

Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere contrassegnate durante il periodo di trattamento, con un avviso che spiega il rischio di avvelenamento primario o secondario da parte dell'anticoagulante e indica le prime misure da adottare in caso di avvelenamento. Gli avvisi devono essere posizionati accanto alle esche.

Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici e animali da allevamento e altri animali non bersaglio.

Tenere il prodotto lontano da alimenti e bevande per animali, nonché da utensili o superfici.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto.

Quando si utilizza il prodotto non mangiare, bere o fumare. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'uso del prodotto.

La frequenza delle visite nell'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore, alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento.

Se l'assunzione dell'esca è basso rispetto alla dimensione dell'infestazione, considerare la sostituzione delle stazioni d'esca in luoghi aggiuntivi e la possibilità di passare ad un'altra formulazione dell'esca.

Se dopo un periodo di trattamento di 35 giorni le esche continuano ad essere consumate e non si osserva alcuna diminuzione dell'attività di roditore, occorre determinare la causa probabile. Laddove siano stati esclusi altri elementi, è probabile che ci siano roditori resistenti e pertanto considerare l'uso di rodenticidi non anticoagulanti, o un rodenticida anticoagulante più potente. Si consideri anche l'uso di trappole come misura di controllo alternativa.

Rimuovere l'esca rimanente, le stazioni dell'esca e i roditori morti alla fine del periodo di trattamento in conformità ai requisiti locali.

Quando si collocano punti di esca vicino alle acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, fossi di irrigazione) o sistemi di drenaggio dell'acqua, assicurarsi che venga evitato il contatto dell'esca con acqua.

Non utilizzare in aree dove si sospetta la resistenza alla sostanza attiva.

Non utilizzare il prodotto per trattamenti ad intervalli di applicazione.

Applicare direttamente nelle tane solo nelle situazioni consentite e in casi di elevate infestazioni

DOSI DI APPLICAZIONE

Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*):

Basse infestazioni: 40-60 g di esca per punto esca.

Elevate infestazioni: 60-100 g di esca per punto esca.

Uso interno per topi e ratti

Uso esterno intorno edifici per topi e ratti

Uso esterno aree aperte e discariche

Uso fognature

Usa come esca permanente per il controllo di Topolino domestico, Ratto grigio e Ratto nero.

In caso di siti ad alto potenziale di re-invasione e dove sia stato dimostrato che tutti gli altri metodi di controllo sono insufficienti, utilizzare 60-100 g di esca per punto esca.

Controllare i punti esca almeno ogni 4 settimane per evitare il rischio di creare popolazioni resistenti.

Si ricorda di rivedere periodicamente il posizionamento delle esche permanenti sulla base di un' adeguato sistema di gestione integrata delle infestazioni ed in base al rischio di un'eventuale re-infestazione.

AVVERTENZE

Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, cercare di rimuovere i roditori morti ad intervalli frequenti durante il trattamento (ad. esempio almeno due volte la settimana).

Non utilizzare in aree in cui si sospetta la resistenza alla sostanza attiva.

I prodotti non possono essere utilizzati oltre 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento se non autorizzati per trattamenti permanenti di esche.

Non ruotare l'uso di diversi anticoagulanti con potenza paragonabile o più debole per la gestione della resistenza.

~~Non ingerire. Non utilizzare in agricoltura. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare la confezione ben chiusa e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole.~~

Conservare in luoghi inaccessibili all'accesso dei bambini, uccelli, animali domestici e animali da allevamento. Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti. Evitare i trattamenti in presenza di alimenti o mangimi non protetti. In caso di sospetta ingestione, consultare un centro antiveleni. In caso di ingestione accertata, indurre il vomito solo su indicazione del medico. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario, mostrandogli il contenitore o l'etichetta. Dopo la manipolazione o in caso di contaminazione e prima di mangiare, bere o fumare lavarsi accuratamente mani e viso con acqua e sapone.

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità ritardata di azione, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere da 4 a 10 giorni per essere efficaci dopo il consumo effettivo dell'esca.

~~I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude, utilizzare i guanti o usare utensili come le pinze quando li disponete.~~

Questo prodotto contiene un agente amaricante e un colorante.

Pericoloso se ingerito da animali domestici o da altri animali non bersaglio.

*Il prodotto è commercializzato anche con le seguenti denominazioni: BROMORAT GRANI PROFESSIONAL, STUN PRO GRANO ROSSO, MICIDEX CEREALI, RODEXION CEREALI, INDORAT CEREALI

QUESTO SI APPROVA
IL FARMACISTA
Raffaella Perrone

MEGALON CEREALI***Composizione:**

100 g di prodotto contengono:
 Bromadiolone (N° CAS 28772-56-7) 0,005 g
 Denatonium Benzoate 0,001 g
 Sostanze appetibili e coformulanti q.b a 100 g

**PERICOLO****INDICAZIONI DI PERICOLO**

H360D Può nuocere al feto.

~~H372 Provoca danni agli organi (SANGUE) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.~~**CONSIGLI DI PRUDENZA**

P201 Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
 P202 Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
 P260 Non respirare la polvere.
 P270 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.
 P280 Indossare guanti.
 P308+313 IN CASO di esposizione o di possibile esposizione: Consultare un medico.
 P501 Smaltire il prodotto in base alle legislazione locale.

PRODOTTO BIOCIDA (PT14) Autorizzazione del Ministero della Salute n. IT/2014/00229/AUT**Titolare dell'autorizzazione**

I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE s.r.l., Via Sorgaglia 25 – 35020 Arre (PD) Tel. 049.807.61.44 Fax 049.807.61.46

Officine di produzione

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l., Via Sorgaglia, 40 – 35020 Arre (PD)

Validità: 24 mesi (se conservato in confezione integra originale, in ambiente asciutto e fresco, al riparo dai raggi solari)**Lotto n. ... del ...****Confezione:**

- a) bustine pre-dosate sigillate, in carta alimentare, contenenti g 10-12,5-15-20 di esca rodenticida cadauna, in confezioni a partire da 1.5 kg fino a 25 kg
- b) sacchetti, cartoni o secchielli a partire da 1.5 kg fino a 25 kg
- c) barattoli e buste a partire da 1.5 kg fino a 25 kg
- d) stazioni sigillate pronte all'uso da 250 g (quantità minima per gli utilizzatori professionali 1.5kg)

MEGALON CEREALI

**Esca topicida a base di Bromadiolone, pronta all'uso in grano.
 Per uso professionale all' interno ed intorno edifici**

INFORMAZIONI PER IL MEDICO

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea: lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.**Esposizione oculare:** risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.**Esposizione orale:** sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.**In caso d'ingestione,** contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

INDIA SRL
 VIA SORGAGLIA 25
 35020 ARRE - PD
 P.IVA 04824500298

MEGALON_CEREALI_ITA_LABEL_PRO
 06/06/2018

Pericoloso per gli animali selvatici

CARATTERISTICHE TECNICHE

MEGALON CEREALI è un'esca pronta all'uso a base di Bromadiolone formulata in grano. È efficace per il controllo di topi e ratti (*Mus musculus*) (*Rattus norvegicus*) (*Rattus rattus*), appetibile soprattutto per roditori già abituati ad alimentarsi con granaglie. L'ingestione di una quantità sufficiente di esca causa la morte di ogni roditore nel volgere di qualche giorno, senza creare allarme o destare sospetto negli altri componenti della colonia. Questo è possibile in virtù del meccanismo di azione degli anticoagulanti, che provocano emorragie interne letali.

Grazie alla sua appetibilità MEGALON CEREALI può essere impiegato con successo per derattizzazioni all'interno ed intorno ad ogni ambiente domestico, civile, industriale (case, uffici, comunità, industrie, depositi merci, mezzi navali ecc.), rurale (allevamenti, case di campagna ecc.) e anche in campo aperto (giardini, viali, parchi ecc.).

MODALITÀ APPLICATIVE E INDICAZIONI PER L'USO

Prima di utilizzare il prodotto, leggere l'etichetta.

Dopo aver ispezionato la zona infestata, creare dei punti-esca nei pressi delle tane dei roditori, lungo le loro piste, nei luoghi di maggior frequentazione con una quantità di prodotto, da posizionare all'interno di una stazione d'esca, secondo i dosaggi sotto riportati.

Durante le operazioni di trasferimento del grano sfuso, indossare dispositivi di protezione appropriate per il tratto respiratorio (maschera respiratoria usa e getta EN149 FFP2).

Evitare di toccare il prodotto a mani nude ed indossare guanti adatti.

Dove possibile, prima del trattamento informare la zona sul trattamento di derattizzazione.

Effettuare prima del trattamento un'indagine dell'area infestata e una valutazione in loco per identificare le specie di roditori, i loro luoghi di attività e determinare la probabile causa e la portata dell'infestazione.

Rimuovere gli alimenti raggiungibili per i roditori (ad esempio grano sfuso o rifiuti alimentari). Non ripulire l'area infestata poco prima del trattamento, in quanto ciò disturba la popolazione di roditori e rende più difficile l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere utilizzato solo come parte di un sistema integrato di gestione dei parassiti (IPM), tra cui, misure di igiene e, ove possibile, metodi di controllo fisici.

Prendere in considerazione misure di controllo preventivo per migliorare l'assunzione di prodotti e ridurre la probabilità di re-invasione.

Le stazioni di esca dovrebbero essere posizionate nelle immediate vicinanze dei luoghi dove è stata osservata la presenza di roditori (ad es. luoghi di percorrenza, siti di nidificazione, fori, ecc); laddove possibile, devono essere fissate a terra o ad altre strutture e devono essere chiaramente etichettate per mostrare che contengono rodenticidi e che non devono essere spostati o aperti.

Quando il prodotto viene utilizzato in aree pubbliche, le aree trattate devono essere contrassegnate durante il periodo di trattamento e un avviso che spiega il rischio di avvelenamento primario o secondario da parte dell'anticoagulante e indica le prime misure da adottare in caso di avvelenamento. Gli avvisi devono essere posizionati accanto alle esche.

Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici e animali da allevamento e altri animali non bersaglio.

Tenere il prodotto lontano da alimenti e bevande per animali, nonché da utensili o superfici.

Indossare guanti resistenti alle sostanze chimiche durante la fase di manipolazione del prodotto.

Quando si utilizza il prodotto non mangiare, bere o fumare. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'uso del prodotto.

La frequenza delle visite nell'area trattata dovrebbe essere a discrezione dell'operatore alla luce dell'indagine condotta all'inizio del trattamento.

Se l'assunzione dell'esca è bassa rispetto alla dimensione dell'infestazione, considerare la sostituzione delle stazioni d'esca in luoghi aggiuntivi e la possibilità di passare ad un'altra formulazione dell'esca.

I prodotti non devono essere utilizzati oltre 35 giorni senza una valutazione dello stato dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento se non autorizzati per trattamenti permanenti di esche.

Se dopo un periodo di trattamento di 35 giorni le esche continuano ad essere consumate e non si osserva alcuna diminuzione dell'attività di roditore, occorre determinare la causa probabile. Laddove siano stati esclusi altri elementi, è probabile che ci siano roditori resistenti e pertanto considerare l'uso di rodenticidi non anticoagulanti, o un rodenticida anticoagulante più potente. Si consideri anche l'uso di trappole come misura di controllo alternativa.

Non utilizzare il prodotto per trattamenti ad intervalli di applicazione. Non utilizzare per trattamenti permanenti.

Rimuovere l'esca rimanente, le stazioni dell'esca e i roditori alla fine del periodo di trattamento secondo la normativa locale.

Quando si collocano punti di esca vicino alle acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, fossi di irrigazione) o sistemi di drenaggio dell'acqua, assicurarsi che venga evitato il contatto dell'esca con acqua.

Non applicare direttamente nelle tane.

Non utilizzare in aree dove si sospetta la resistenza alla sostanza attiva.

Uso Interno per topi

Le stazioni di esca devono essere visitate all'inizio del trattamento almeno ogni 2/3 giorni e almeno settimanalmente dopo il trattamento, per verificare se l'esca è stata accettata, le stazioni d'esca sono intatte e rimuovere i corpi dei roditori. Rimpiazzare l'esca quando necessario

Uso Interno per ratti

Le stazioni di esca devono essere visitate all'inizio del trattamento almeno ogni 5/7 giorni e almeno settimanalmente dopo il trattamento, per verificare se l'esca è stata accettata, le stazioni d'esca sono intatte e rimuovere i corpi dei roditori. Rimpiazzare

INDIA SRL
VIA SORRELAIA 25
35020 ARRE - PD
P.IVA 04874500298



MEGALON_CEREALI_ITA_LABEL_PRO
06/06/2018

l'esca quando necessario.

Uso esterno intorno edifici per topi e ratti

Proteggere le esche dalle condizioni atmosferiche (pioggia, neve ecc...). Posizionare le stazioni di esca in aree non soggette ad inondazioni.

Le stazioni di esca devono essere visitate all'inizio del trattamento almeno ogni 2/3 giorni per il topo e 5/7 giorni per ratti e almeno settimanalmente dopo il trattamento, per verificare se l'esca è stata accettata, le stazioni d'esca sono intatte e rimuovere i corpi dei roditori.

Rimpiazzare l'esca quando necessario.

DOSI DI APPLICAZIONE

Topolino domestico (*Mus musculus*): 40 g di esca per punto esca.

Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*): 60-100 g di esca per punto esca.

Se necessaria più di una stazione d'esca, la minima distanza deve essere di 5 metri.

AVVERTENZE

Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, cercare di rimuovere i roditori morti durante il trattamento ad intervalli frequenti.

~~Non ingerire. Non utilizzare in agricoltura. Conservare soltanto nel recipiente originale. Conservare la confezione ben chiusa e in luogo asciutto, fresco e ben ventilato, lontano dalla luce diretta del sole.~~

~~Non riutilizzare il contenitore e non disperderlo nell'ambiente ma smaltirlo in conformità alle norme vigenti. In caso di sospetta ingestione, consultare un centro antiveleni. In caso di ingestione accertata indurre il vomito solo su indicazione del medico. Rivolgersi immediatamente ad un veterinario, mostrandogli il contenitore o l'etichetta.~~

ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità ritardata di azione, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere da 4 a 10 giorni per essere efficaci dopo il consumo effettivo dell'esca.

I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude, utilizzare i guanti o usare utensili come le pinze quando li disponete.

~~Questo prodotto contiene un agente amaricante e un colorante.~~

Pericoloso se ingerito da animali domestici o da altri animali non bersaglio.

*Il prodotto è commercializzato anche con le seguenti denominazioni: BROMORAT GRANI PROFESSIONAL, STUN PRO GRANO ROSSO, MICIDEX CEREALI, RODEXION CEREALI, INDORAT CEREALI

