

# Souhrn vlastností biocidního přípravku

**Název přípravku:** INDAL OXY MOUSS

**Typ přípravku (typy přípravků):** Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

**Číslo povolení:** CZ-0024558-0000

**Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3:** CZ-0024558-0005

## Obsah

Administrativní informace	1
1.1. Obchodní název přípravku	1
1.2. Držitel povolení	1
1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků	1
1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek	2
2. Složení přípravku a jeho typ složení	2
2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product	2
2.2. Typ složení přípravku	3
3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení	3
4. Povolené(á) použití	4
5. Obecná pravidla pro používání	7
5.1. Pokyny pro používání	8
5.2. Opatření ke zmírnění rizika	8
5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy	8
5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu	8
5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování	9
6. Další informace	9

## Administrativní informace

### 1.1. Obchodní název přípravku

INDAL OXY MOUSS
PAA OXY MOUSS
PEROX 1M
DAP MOUSS
OXY MOUSS
SANITEX OXY
SUPER OXY FOAM 314
PERSTERIL 1M

### 1.2. Držitel povolení

<b>Jméno (název) a adresa držitele povolení</b>	Jméno (název)	STOCKMEIER FRANCE SAS
	Adresa	3 rue de la Buhotière 35091 RENNES Francie
<b>Číslo povolení</b>	CZ-0024558-0000 1-5	
<b>Referenční číslo záznamu v registru R4BP 3</b>	CZ-0024558-0005	
<b>Datum udělení povolení</b>	17/08/2021	
<b>Datum skončení platnosti povolení</b>	10/08/2030	

### 1.3. Výrobce (výrobci) biocidních přípravků

<b>Název výrobce</b>	STOCKMEIER SAS
<b>Adresa výrobce</b>	3 Rue de la Buhotière - Saint Jacques de la Lande 35136 Rennes Francie
<b>Umístění výrobních závodů</b>	3 Rue de la Buhotière - Saint Jacques de la Lande 35136 Rennes Francie
	Rue des Criquiers 60220 Formerie Francie
	Oqema - Tovární 2093 356 80 Sokolov Česká republika

#### 1.4. Výrobce(i) účinné látky / účinných látek

<b>Účinná látka</b>	1340 - kyselina peroxyoctová
<b>Název výrobce</b>	STOCKMEIER SAS
<b>Adresa výrobce</b>	3 Rue de la Buhotière - Saint Jacques de la Lande 35136 Rennes Francie
<b>Umístění výrobních závodů</b>	3 Rue de la Buhotière - Saint Jacques de la Lande 35136 Rennes Francie
	Rue des Criquiers 60220 Formerie Francie

## 2. Složení přípravku a jeho typ složení

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the biocidal product

Obecný název	Název podle IUPAC	Funkce	Číslo CAS	Číslo ES	Obsah (%)
kyselina peroxyoctová		účinná látka	79-21-0	201-186-8	1,2
Hydrogen peroxide		Neúčinná látka	7722-84-1	231-765-0	13
Acetic acid		Neúčinná látka	64-19-7	200-580-7	5,75
Sulphuric acid		Neúčinná látka	7664-93-9	231-639-5	0,5

## 2.2. Typ složení přípravku

SL - Rozpuštěný koncentrát

## 3. Standardní věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení

### Standardní věty o nebezpečnosti

Může být korozivní pro kovy.  
Může zesílit požár; oxidant.  
Zdraví škodlivý při styku s kůží.  
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.  
Může způsobit podráždění dýchacích cest.  
Zdraví škodlivý při požití.  
Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.  
Způsobuje poleptání dýchacích cest.

### Pokyny pro bezpečné zacházení

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. – Zákaz kouření.  
Uchovávejte odděleně od oděvů a jiných hořlavých materiálů.  
Proveďte preventivní opatření proti smíchání s hořlavými materiály  
Uchovávejte pouze v původním balení.  
Nevdechujte páry.  
Omyjte ruce důkladně po manipulaci.  
Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.  
Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.  
Zabraňte uvolnění do životního prostředí.  
Používejte ochranné prostředky.  
PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.  
PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.  
PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.  
PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.  
PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Vypláchněte ústa.

Kontaminovaný oděv před opětovným použitím vyperte.

V případě požáru: K uhašení použijte .

Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Uniklý produkt seberte.

Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu.

Skladujte uzamčené.

Odstraňte obsah předáním oprávněné osobě.

Odstraňte obal předáním oprávněné osobě.

## 4. Povolené(á) použití

### 4.1 Popis použití

#### Použití 1 - Dezinfekce povrchu ručním pěnovým postřikem v průmyslu hospodářských zvířat

<b>Typ přípravku</b>	Typ přípravku 03 - Veterinární hygiena (Dezinfekční prostředky)
<b>V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití</b>	-
<b>Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)</b>	Latinský název: Nejsou data Obecný název: Bakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Nejsou data Obecný název: Houby/kvasinky Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Nejsou data Obecný název: Mykobakterie Vývojové stadium: Žádné informace  Latinský název: Nejsou data Obecný název: Viry Vývojové stadium: Žádné informace
<b>Oblast použití</b>	Vnitřní  Vnitřní dezinfekce otevřených povrchů, materiálů nebo zařízení, stěn, podlah nebo dopravních prostředků ručním pěnovým postřikem v průmyslu hospodářských zvířat.
<b>Metoda(y) aplikace</b>	Metoda: Použití ve formě pěny Podrobný popis: Koncentrovaný roztok přípravku se zředí pomocí proporcionálního automatického dávkovacího systému nebo Venturiho systému a poté se pěna pomocí generátoru pěny aplikuje manuálním postřikem na daný povrch.

	<p>Zařízení k postřiku: nízký až střední tlak (4 až 7 barů)          Po nanesení biocidního přípravku opláchněte ošetřený povrch, zařízení, potrubí nebo zařízení pitnou vodou.</p>
<p><b>Aplikační dávka(y) a četnost aplikací</b></p>	<p>Míra aplikace: -          Ředění (%): Na tvrdém neporézním povrchu po předchozím očištění při +10 °C za 30 minut kontaktního času: Před dezinfekcí povrch důkladně očistěte a opláchněte. Povrch je nutné řádně navlhčit. Aplikační dávka je 50 ml/m<sup>2</sup>. - Účinek na bakterie (včetně Salmonella typhimurium a Listeria monocytogenes) a na kvasinky: 2% - Účinek na houby (včetně Aspergillus fumigatus): 5% - Účinek na mykobakterie: 2% - Účinek na viry (včetně H5N1 a H1N1; FMDV; virus Gumboro, Newcastle, Aujeszky): 0,5% - aktivní proti prasečímu enteroviru: 1% - aktivní proti klasickému moru prasat: 2% Na tvrdém porézním povrchu po předchozím očištění při +10 °C za 30 minut kontaktního času: Povrch je nutné řádně navlhčit. - Účinek na bakterie (včetně Salmonella typhimurium a Listeria monocytogenes) a na kvasinky: 4%          Počet a načasování aplikace:          -</p>
<p><b>Kategorie uživatelů</b></p>	<p>profesionál</p>
<p><b>Velikost balení a obalový materiál</b></p>	<p>0,25-1-5-10-20-200-1000   HDPE</p>

#### 4.1.1 Návod k danému způsobu použití

Viz kapitola 5.1

#### 4.1.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz kapitola 5.2

#### 4.1.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz kapitola 5.3

#### 4.1.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz kapitola 5.4

#### 4.1.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz kapitola 5.5

#### 4.2 Popis použití

##### Použití 2 - Velkoplošná dezinfekce povrchu ručním pěnovým postřikem v zemědělsko-potravinářském průmyslu

###### Typ přípravku

Typ přípravku 04 - Oblast potravin a krmiv (Dezinfekční prostředky)

###### V případě potřeby uveďte přesný popis povoleného použití

-

###### Cílový organismus (cílové organismy) (včetně vývojového stadia)

Latinský název:  
Obecný název: Bakterie  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název:  
Obecný název: Kvasinky  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název:  
Obecný název: Houby  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název:  
Obecný název: Viry  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název:  
Obecný název: bakteriofágy  
Vývojové stadium: Žádné informace

Latinský název:  
Obecný název: Biofilmy  
Vývojové stadium: Žádné informace

###### Oblast použití

Vnitřní

Vnitřní dezinfekce otevřených povrchů, stěn a podlah ručním pěnovým postřikem v zemědělsko-potravinářském průmyslu.

###### Metoda(y) aplikace

Metoda: Postřik

Podrobný popis:

Koncentrovaný roztok přípravku se zředí pomocí proporcionálního automatického dávkovacího systému nebo Venturiho systému a poté se pěna pomocí generátoru pěny aplikuje manuálním postřikem na daný povrch.

Zařízení k postřiku: nízký až střední tlak (4 až 7 barů)

Po nanesení biocidního přípravku opláchněte ošetřený povrch, zařízení, potrubí nebo zařízení pitnou vodou.

###### Aplikační dávka(y) a četnost aplikací

Míra aplikace: Povrch je nutné řádně navlhčit. Na tvrdém neporézním povrchu po předchozím očištění při +20 °C Před dezinfekcí povrch důkladně očistěte a opláchněte. Povrch je nutné řádně navlhčit. - Účinek na bakterie na kvasinky: (včetně Salmonella typhimurium, Listeria monocytogenes, Enterobacter cloacae, Lactobacillus brevis, Campylobacter jejuni a Legionella pneumophila) a na kvasinky: 1% za 15 minut kontaktního času - Účinek na plíseň: 4% za 15 minut kontaktního času - Účinek na viry



	3% za 30 minut kontaktního času - Účinek na bakteriofágy: 0,55% za 15 minut kontaktního času - Účinné pro odstranění biofilmů: 1% za 15 minut kontaktního času Ředění (%): Počet a načasování aplikace: -
<b>Kategorie uživatelů</b>	profesionál
<b>Velikost balení a obalový materiál</b>	0,25-1-5-10-20-200-1000   HDPE

#### 4.2.1 Návod k danému způsobu použití

Viz kapitola 5.1

#### 4.2.2 Opatření ke zmírnění rizika k danému způsobu použití

Viz kapitola 5.2

#### 4.2.3 Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a pohotovostní opatření na ochranu životního prostředí pro daný způsob použití

Viz kapitola 5.3

#### 4.2.4 Pokyny pro bezpečné zneškodnění přípravku a jeho obalu pro daný způsob použití

Viz kapitola 5.4

#### 4.2.5 Podmínky skladování a doba použitelnosti přípravku za normálních podmínek skladování pro daný způsob použití

Viz kapitola 5.5

## 5. Obecná pravidla pro používání

## 5.1. Pokyny pro používání

Viz popis metody nanášení související s jednotlivým způsobem použití.

## 5.2. Opatření ke zmírnění rizika

1) Určeno pro aplikace automatického čerpání/míchání a plnění pro PT3 a PT4: povinné jsou rukavice, ochranný oděv.

Je nutno zabránit přístupu nepovolaných osob do míst manuálního připojení biocidního přípravku k systémům automatického míchání a plnění. Platí povinnost používání ochranných dýchacích prostředků s ochranným faktorem 10. Vyžaduje se alespoň respirátor filtrující vzduch (PAPR) s přilbou/kapucí/maskou (TH1/TM1) nebo polomaska/celomaska s kombinovaným filtračním pára/P2 (typ filtru (kódové písmeno, barva) musí být uveden držitelem oprávnění v rámci informace o přípravku).

2) K ručnímu postřiku při aplikacích PT 3 v objektech pro chov zvířat: nevyžadují se žádné osobní ochranné prostředky (OOP). Vyžaduje se však ochrana dýchacích cest. Během postřiku je nutné zamezit přístup nepovolaných osob do ošetřené oblasti. Opakovaný vstup je povolen pouze po odvětrání a ve stavu, kdy koncentrace ve vzduchu poklesne pod přijatelnou expoziční koncentraci (AEC). Používání ochranných dýchacích prostředků (ODC). Vyžaduje se alespoň respirátor filtrující vzduch (PAPR) s přilbou/kapucí/maskou (TH1/TM1) nebo polomaska/celomaska s kombinovaným filtračním pára/P2 (typ filtru (kódové písmeno, barva) musí být uveden držitelem oprávnění v rámci informace o přípravku).

3) U všech aplikací postřikem: „Ošetřený povrch je nutné opláchnout ještě před zaschnutím.“

4) K ručnímu oplachu a ručnímu vypouštění pro aplikace PT 2, 3 a 4: nevyžadují se žádné osobní ochranné prostředky (OOP) ani ochrana dýchacích cest.

5) Proces ředění je nutné provádět s využitím automatického dávkovacího systému.

6) Po nanesení biocidního přípravku opláchněte ošetřený povrch, zařízení, potrubí nebo zařízení pitnou vodou.

7) Před uvolněním přístupu veřejnosti do ošetřených oblastí zajistěte dostatečné odvětrání.

8) Během postřiku a do opláchnutí povrchu je nutné zamezit přístup nepovolaným osobám do prostor venkovní aplikace a do okolní oblasti s dosahem 20 m.

9) Pro veškeré postupy míchání a plnění a pro všechny aplikace postřikem: Místnost musí být dostatečně dobře větraná v míře 10 výměn vzduchu za hodinu.

10) Pro všechny oblasti postřikem: po aplikaci okamžitě opustit daný prostor.

## 5.3. Údaje o pravděpodobných přímých nebo nepřímých účincích, pokyny pro první pomoc a naléhavé případy

Pravděpodobné přímé nebo nepřímé účinky:

- Může být korozivní pro kovy.
- Zdraví škodlivý při požití nebo při styku s kůží
- Působuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
- Může způsobit podráždění dýchacích cest.
- Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

První pomoc:

- PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
- PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
- PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
- PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
- v případě kontaktu s kůží, očí, vdechnutí nebo požití: „Okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc“.

Nouzová opatření na ochranu životního prostředí:

- Zabraňte uvolnění do životního prostředí
- Uchovávejte pouze v původním obalu

## 5.4. Pokyny pro bezpečnou likvidaci přípravku a jeho obalu

Viz obecný návod k použití skupiny biocidních přípravků «QUARON PAA»

## 5.5. Podmínky skladování a doba trvanlivosti přípravku při běžných podmínkách skladování

Doba skladovatelnosti je stanovena na 18 měsíců.  
Na etiketě musí být uvedeno „Skladujte při teplotě do 30 °C“ a „Chraňte před mrazem“.  
Chraňte před světlem

## 6. Další informace

Držitel povolení může zvolit použití jiných pokynů pro bezpečné použití, než uvedených v části č. 3, pokud jejich zvolená kombinace je v souladu s pravidly podle nařízení (ES) č. 1272/2008.

Telefonní číslo pro naléhavé situace:  
Toxikologické informační středisko  
Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF UK  
Na Bojišti 1, 120 00, Praha 2  
tel: 224 919 293 a 224 915 402