

RO

ANEXĂ

**REZUMATUL CARACTERISTICILOR
PRODUSULUI PENTRU UN PRODUS BIOCID**

Vertox 25 Pellet Bait

Tip(uri) de produs

TP 14: Rodenticide

Numărul autorizației: RO/2018/0223/MRA/IE/BPA 70513

Numărul deciziei de reglementare R4BP: RO-0020552-0000

Cap. 1. INFORMAȚII ADMINISTRATIVE

1.1. Denumire (denumiri) comercială (comerciale) a(le) produsului

Denumire (denumiri) comerciale	Prokum Pelet Vertox Pelet Vertox Pellet 25 Vertox Pellet Pro
--------------------------------	---

1.2. Deținătorul autorizației

Denumirea și adresa deținătorului autorizației	Denumire	PelGar International Limited
	Adresă	18 rue des Remparts d'Ainay 69002 Lyon Franța
Numărul autorizației		RO/2018/0223/MRA/IE/BPA 70513
Numărul deciziei de reglementare R4BP		RO-0020552-0000
Data autorizației		18/07/2013
Data de expirare a autorizației		31/12/2026

1.3. Producătorul (producătorii) produsului

Denumirea producătorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Promedivet SRL 545500 SOVATA , str. Lunga nr. 46/ G jud. Mures, România Agrochema 675 02 Konesin Cehia Sc Pest Control Expert Depozit Nr 99-101, Sector 1 Drumul Lapus România

1.4. Producătorul (producătorii) substanței (substanțelor) active

Substanță activă	Brodifacum
Denumirea producătorului	PelGar International Limited
Adresa producătorului	Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
Adresa locurilor de producție	Prazska 54 280 02 Kolin Cehia

Cap. 2. COMPOZIȚIA ȘI FORMULAREA PRODUSULUI

2.1. Informații calitative și cantitative privind compoziția produsului

Denumire comună	Denumire IUPAC	Funcție	Număr CAS	Număr CE	Conținut (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromophenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	substanță activă	56073-10-0	259-980-5	0,0025 % (de greutate)

2.2. Tip(uri) de formulare

RB Momeală (gata de utilizare)

Cap. 3. FRAZE DE PERICOL ȘI DE PRECAUȚIE

Fraze de pericol	H373: Poate provoca leziuni ale organelor sânge în caz de expunere prelungită sau repetată ..
Fraze de precauție	P260: Nu inspirați praful. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P501: Aruncați conținutul la în conformitate cu reglementările naționale.

Cap. 4. UTILIZARE (UTILIZĂRI) AUTORIZATĂ (AUTORIZATE)

4.1. Descrierea utilizării

Tabel 1. Șoareci de casă – public general – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Mus musculus</i> Denumirea comună: șoarece de casă Etapă de dezvoltare: adulți și minori
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șoareci până la 20 g în stații de momeală. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Cantitatea maximă de momeală pe pachet 50g 15, 20, 25, 30 sau 50 g plicuri de hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g

plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
 Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g
 Plicuri de 15, 20, 25, 30 sau 50 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în cutii exterioare de carton fibros/carton
 Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE
 Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15 g, 20 g, 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 60 g, 75 g, 100 g, 120 g, 150 g
 Momeală liberă până la 20 g ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli în exterioare de carton.
 Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
 Ambalaj exterior: carton exterior 10 g, 15 g, 20 g (ambalate cu multipli de 1/2/4 1/2/4)
 Maximul permis 50g
 Momeală liberă până la 20 g ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură în stațiile de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton.
 Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
 Ambalaj exterior: stație de momeală ambalat în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g (ambalate cu multiplii de 1/2/4)
 Maximul permis 50 g

4.1.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru șoareci folosiți până la 20 g în stațiile de momeală. Fixați blocuri de 5 - 20 g în stațiile de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 5 metri (2 metri în zone de infestație înaltă) în zone unde șoarecii sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau vărsată până la terminarea consumului. Repetați reatamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea momelii la fiecare 2-3 zile odată cu inspectarea sau reîncărcarea punctelor de momeală. Verificați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2 - 3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar. Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și / sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate la sfârșitul perioadei de tratament (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control de dăunătoare.

Nu folosiți acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

For mice use 5-20g of bait in tamper-resistant bait stations.

Secure 5-20g of bait in tamper-resistant bait stations spaced 5m apart (2m apart in areas of high infestation) in areas where mice are active. Mice are very inquisitive and it may help the control program to move baits every 2-3 days at the time when bait points are inspected or topped up. Make frequent inspections of the bait points during the first 10-14 days and replace any bait eaten by rodents or that has been damaged by water or contaminated by dirt. If all the bait has been eaten from certain areas, increase the quantity of bait by placing

more bait points. Do not increase the bait point size. Replace any bait eaten by rodents or that has been damaged by water or contaminated by dirt.

The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

Using this product should eliminate rodents within 35 days. The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly recommend that in case of suspected lack of efficacy by the end of the treatment (i.e. rodent activity is still observed), the user should seek advice from the product supplier or call a pest control service. Do not use this product for permanent or pulse-baiting.

4.1.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt.

4.1.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt.

4.1.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.1.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.2. Descrierea utilizării

Tabel 2. Șobolani – public general – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: altele: #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală

	<p>Descriere detaliata: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulări.</p>
<p>Rata (ratele) și frecvența de aplicare</p>	<p>Frecvența de aplicare: Pentru #obolani până la 60 g în stații de momeală.</p> <p>Diluare (%): 0</p> <p>Numărul și calendarul de aplicare: Pentru #obolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări și acoperite la distanțe de 10 metri.</p> <p>Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la 10 metri distanțe (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde #obolani sunt activi. Verificați consumul de momeală în mod regulat și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestări (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mișcați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după #ezarea momelii. Dacă nu se observă activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate mai mare de #obolani. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.</p>
<p>Categoria (categoriile) de utilizatori</p>	<p>publicul larg (neprofesioniști)</p>
<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Cantitatea maximă de momeală pe pachet 150 g</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi)</p> <p>Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterioare de carton fibros/carton</p> <p>Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g 20g, 25g 30g 40g 50g, 60g, 75g, 100g, 120g 150g</p> <p>Momeală liberă de până la 60 g, ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură, împachetate cu multipli în exterioare de carton</p> <p>Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură</p> <p>Ambalaj exterior: exterior de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalat cu multiplii de 2/4/8/12/15)</p> <p>Maximul permis 150 g</p> <p>Momeală liberă până la 60 g ambalate în tăvi de momeală cu capac ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister</p>

	sau man#on de carton sau pungă lipită pprin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: Sta#ii de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4) Maximul permis 150g
--	---

4.2.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #obolani utiliza#i de la 10 g până la 60 g în sta#ii de momeală la distan#e de 10 metri.

Fixa#i 10 - 60 g de momeală în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 10 metri (5 metri în zone de infesta#ie înaltă) acolo unde #obolani sunt activi.

Verifica#i regulat consumul de momeală #i înlocui#i momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repeta#i tratamentul în situa#ii unde există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu muta#i sau deranja#i punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea lor.

Dacă nu este nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7 - 10 zile, muta#i momeala într-un loc cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, cre#te#i cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu cre#te#i mărimea punctului de momeală. Înlocui#i orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.

Sta#iile de momeală trebuie vizitate doar după 5 - 7 zile după începutul perioadei de tratament #i cel pu#in săptămânal după aceasta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, sta#iile de momeală sunt intacte #i de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărca#i când este necesar.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informa#ia de produs (de exemplu etichetă #i/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate, până la sfâr#itul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al rozătoarelor.

Nu utiliza#i acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.2.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt

4.2.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt

4.2.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt

4.2.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

None

4.3. Descrierea utilizării

Tabel 3. Șobolani – public general – exterior în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) #intă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: #obolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru #obolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru #obolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală la distanțe de 10 metri (5 metri în cazul infestațiilor înalte) acolo unde #obolanii sunt activi. Verificați în mod regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezare. Dacă nu este niciun semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de rozătoare mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Categoria (categoriile) de utilizatori	publicul larg (neprofesioniști)

<p>Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare</p>	<p>Cantitatea maximă de momeală pe pachet 150 g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete de PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton capturat cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton capturat cu PE 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE, în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 15g, 20g, 25g, 30g, 40g, 50g, 60g, 75g, 100g, 120g, 150g Momeală liberă de până la 60 g, ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură, împachetate cu multipli în exterior de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: exterior de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalat cu multiplii de 2/4/8/12/15) Maximul permis 150 g Momeală liberă până la 60 g ambalate în tăvi de momeală cu capac ambalate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile. toate ambalate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipită prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: Stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton 10g, 15g, 20g, 25g, 50g, 60g (ambalate cu multipli de 1, 2 sau 4) Maximul permis 150g</p>
---	---

4.3.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #obolani utilizați de la 10 g până la 60 g în stații de momeală la distanțe de 10 metri.

Fixați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde #obolanii sunt activi.

Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau strică până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după plasarea lor.

Dacă nu este nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7 - 10 zile, mutați momeala într-un loc cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apa sau contaminată de pământ.

Stafiile de momeală trebuie vizitate doar după 5 - 7 zile după începutul perioadei de tratament și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stafiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcăți când este necesar.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiență suspectate, până la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare mai poate fi observată), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al rozătoarelor.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.3.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Nu sunt

4.3.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Nu sunt

4.3.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt

4.3.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.4. Descrierea utilizării

Tabel 4. Șoareci de casă – profesioniști – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) și/și (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: Mus musculus Denumirea comună: șoarece de casă Etapă de dezvoltare: altele: Toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior

Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliata: Momeală gata de folosit pentru a folosi în sta#ii de momeală rezistente la manipulări.
Rata (ratele) #i frecven#a de aplicare	Frecven#a de aplicare: Pentru #oareci folosi#i până la 20 g în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. Diluare (%): 0 Numărul #i calendarul de aplicare: Pentru #oareci utiliza#i 5-20 g de momeală în sta#ii de momeală rezistente la manipulări. Fixa#i 5-20 g de momeală în sta#ii de momeală rezistente la manipulări la distan#e de 5 metri (2 metri în zone cu infesta#ii înalte) acolo unde #oarecile sunt active. #oarecile sunt foarte curio#i #i poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspecta#i frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile #i înlocui#i orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, cre#te#i cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu cre#te#i mărimea punctului de momeală. Înlocui#i orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	Mărime minimă de pachet 2,5 kg. Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac #esut din PP cu sac inern PE separat sau sac #esut PP fără sac intern. Ambalaj interio: - ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptu#it cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi)
 Ambalaj interior: N /A
 Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă în carton căptu#it cu PE Ambalaj interior# -
 Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exteriore de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură
 Ambalaj exterior: exterior de carton Multiplii:
 10g –250
 15g - 250
 20g – 125, 144
 25g – 120, 144
 30g – 96, 120, 144
 40g – 72, 96, 120, 144
 50g – 60, 72, 96, 120, 144
 60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în sta#ii de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală
 Ambalaj exterior: sta#ii de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
 Multipli:
 10g –250
 15g - 250
 20g – 125, 144
 25g – 120, 144
 30g – 96, 120, 144
 40g – 72, 96, 120, 144
 50g – 60, 72, 96, 120, 144
 60g – 48, 60, 72, 96, 120
 80g – 32, 48, 60, 72, 96
 90g – 32, 48, 60, 72, 96
 100g – 32, 48, 60, 72, 96
 120g – 24, 32, 48, 60, 72
 200g – 16, 24, 32, 48, 60
 240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.4.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci utiliza#i până la 20 g de momeală în sta#ii de momeală rezistente la manipulări.

Fixați 5 - 20 g de blocuri în stațiile de momeală rezistente la manipulări distanțate la 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde șoarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control micșorarea momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Stațiile de momeală trebuie vizitate cel puțin la fiecare 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de momeală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar.

Urmăriți orice instrucțiuni adiționale furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă. Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației. Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată a sistemului de gestionare a dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și, acolo unde este posibil, metodele fizice de control. Trebuie luat în considerare starea de rezistență a populației înainte la alegerea rodenticidului dorit de folosit. În acele zone unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandat alternarea momeliilor conținând anticoagulanți diferiți.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când utilizați produsul în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în perioada de tratament și o notificare explicând riscurile primare și secundare al otrăvirii de către anticoagulant și indicând măsurile primare care trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie pus la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectată la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.4.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374). Nu utilizați momeli conținând ca substanță activă un anticoagulant, ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

4.4.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelii cu apă este evitată.

4.4.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.4.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

4.5. Descrierea utilizării

Tabel 5. Șobolani – profesioniști – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: șobolan maro Etapă de dezvoltare: toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: 10-60g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă). Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momeții. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momeții pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului #i materialul de ambalare	<p>Mărime minimă de pachet 2,5 kg. Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac #esut din PP cu sac inern PE separat sau sac #esut PP fără sac intern.</p> <p>Ambalaj interior: - ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungî) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungî) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptu#it cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50, 60, 100 sau 200g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungî) Ambalaj interior: N /A Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungî) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală liberă în carton căptu#it cu PE Ambalaj interior# - Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterioroare de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură Ambalaj exterior: exterior de carton Multiplii: 10g –250 15g - 250 20g – 125, 144 25g – 120, 144 30g – 96, 120, 144 40g – 72, 96, 120, 144 50g – 60, 72, 96, 120, 144 60g – 48, 60, 72, 96, 120 200g – 16, 24, 32, 48, 60 240g – 16, 24, 32, 48, 60</p> <p>Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi de momeală cu</p>

capac lipit prin căldură împachetate în stații de moméală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
 Ambalaj interior: tăvi de moméală
 Ambalaj exterior: stații de moméală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
 Multipli:
 10g – 250
 15g - 250
 20g – 125, 144
 25g – 120, 144
 30g – 96, 120, 144
 40g – 72, 96, 120, 144
 50g – 60, 72, 96, 120, 144
 60g – 48, 60, 72, 96, 120
 80g – 32, 48, 60, 72, 96
 90g – 32, 48, 60, 72, 96
 100g – 32, 48, 60, 72, 96
 120g – 24, 32, 48, 60, 72
 200g – 16, 24, 32, 48, 60
 240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.5.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #obolani utilizați 10 - 60 g de moméală în stații de moméală rezistente la manipulări plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde #obolani sunt activi.

Verificați regulat consumul de moméală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de moméală pentru câteva zile după #ezarea momelii.

Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de moméală. Nu ceșteți mărimea punctului de moméală. Schimbați orice moméală consumată de rozătoarea sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Stațiile de moméală trebuie vizitate doar după 5-7 zile după începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după acesta, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, stațiile de moméală sunt intacte și de a îndepărta rozătoarele moarte. Reîncărcați momeala când este necesar. Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un studiu al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina cauza probabilă și gradul infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem integrat de gestionare al dăunătorilor (IPM), incluzând, printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice de control.

Trebuie luată în considerare și starea de rezistență a populației și întâ la alegerea rodenticidului dorit de utilizat. În zonele unde dovada rezistenței la o substanță activă specifică este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersia rezistenței, este recomandată alternarea momelilor cu anticoagulanți diferiți. Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este folosit în locurile publice, locurile tratate trebuie marcate în timpul tratamentului și o notificare explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant precum și indicând măsurile prime care trebuie luate în cazul otrăvirii trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiențe suspectate la sfârșitul

tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor. Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.5.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374). Nu utilizați momeli care conțin ca substanță activă anticoagulant ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității de rozătoare.

4.5.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.5.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.6. Descrierea utilizării

Tabel 6. Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști – exterior în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: altele: <i>Mus musculus</i> and/or <i>Rattus norvegicus</i> Denumirea comună: altele: șoareci de casă și/sau șobolan maro

	Etapă de dezvoltare: altele: Toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior în jurul clădirilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în stații de momeală rezistente la manipulare.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șoareci folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare, pentru șobolani folosiți 10-60 g în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolani sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momelii pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Categoria (categoriile) de utilizatori	profesionist
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Mărime minimă de pachet 2,5 kg.</p> <p>Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac #esut din PP cu sac intern PE separat sau sac #esut PP fără sac intern.</p> <p>Ambalaj interior: -</p> <p>ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptu#it cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi)</p> <p>Ambalaj interior: N /A</p> <p>Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găle#i sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală liberă în carton căptu#it cu PE Ambalaj interior# -</p> <p>Ambalaj exterior: carton căptu#it cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterioare de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură</p> <p>Ambalaj exterior: exterior de carton Multiplii:</p> <p>10g –250</p> <p>15g - 250</p> <p>20g – 125, 144</p> <p>25g – 120, 144</p> <p>30g – 96, 120, 144</p> <p>40g – 72, 96, 120, 144</p> <p>50g – 60, 72, 96, 120, 144</p> <p>60g – 48, 60, 72, 96, 120</p> <p>Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi de momeală cu</p>

capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință sau reutilizabile, toate împachetate cu multipli de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: tăvi de momeală

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau punge lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multipli:

10g – 250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.6.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci utilizați până la 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări. Fixați 5 - 20 g de blocuri în stații de momeală rezistente la manipulări distanțate la 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde #oarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). #oarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarea momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctelor de momeală.

Pentru #obolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde #obolani sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Protejați momeala de la condițiile atmosferice. Plasați punctele de momeală în zonele care nu sunt predispuse inundațiilor.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un sondaj înainte de aplicarea produsului asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabila cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației înainte de alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat alternarea produselor cu substanțe active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul timpului.

Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă sau prospect) trebuie să recomande clar că în cazul lipsei de eficiențe suspectate la sfârșitul tratamentului (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă sau în impulsuri.

4.6.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

Nu aplicați direct acest produs în vizuini.

Nu folosiți momeli care conțin ca substanțe active anticoagulante ca momeală permanentă pentru prevenirea infestațiilor de rozătoare sau monitorizarea activității rozătoarelor.

4.6.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare, să vă asigurați că contactul produsului cu apa este evitat.

4.6.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt

4.6.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.7. Descrierea utilizării

Tabel 7. Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – interior

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: altele: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: șoareci de casă și/sau șobolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în interior Interior
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în stații de momeală rezistente la manipulări.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șobolani folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani folosiți 10-60 g momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Pentru șobolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri. Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde șobolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada

	<p>unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu există semne de activitate de șobolani în jurul momelii pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de șobolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, creșteți cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.</p>
Categorii (categoriile) de utilizatori	profesioniști instruiți
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Mărime minimă de pachet 2,5 kg. Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac șesut din PP cu sac intern PE separat sau sac șesut PP fără sac intern. Ambalaj interior: - ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: N /A Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior# - Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg Momeală liberă până la 20 g (șobolani și șoareci) și până la 60 g (doar șobolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exterior</p>

de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton Multiplii:

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi de momeală cu capac lipit prin căldură împachetate în sta#ii de momeală rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosin#ă sau reutilizabile, toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton
Ambalaj interior: tăvi de momeală

Ambalaj exterior: sta#ii de momeală din HDPE sau PP ambalate în exterior de carton sau ambalaj blister sau man#on de carton sau punge lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu capac de carton

Multipli:

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.7.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci utiliza#i până la 20 g de momeală în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite. Fixa#i 5 - 20 g de blocuri în sta#ii de momeală rezistente la manipulări sau puncte de momeală acoperite distan#ate la 5 metri distan#ă (2 metri în zone cu infesta#ii înalte) în zone unde #oarecele sunt active. Verifica#i regulat consumul de momeală #i înlocui#i momeala consumată sau stricată până la terminarea consumului. Repeta#i tratamentul în situa#ii unde există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme sau excremente proaspete). #oarecii sunt foarte curio#i #i poate ajuta programul de control mi#carei momelii la fiecare 2-3 zile în acela#i timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspecta#i frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, #i să schimba#i orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, cre#te#i cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu cre#te#i mărimea punctelor de momeală.

Pentru #obolani utiliza#i 10 - 60 g de momeal#ă în sta#ii de momeal#ă rezistente la manipul#ări sau puncte de momeal#ă acoperite plasate la distan#e de 10 metri (5 metri în zonele cu infesta#ie înalt#ă) în zonele unde #obolanii sunt activi. Verifica#i regulat consumul de momeal#ă #i schimba#i momeala consumat#ă sau deteriorat#ă p#ână la terminarea consumului. Repeta#i tratamentul în situa#ii când există dovada unei noi infesta#ii (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu muta#i sau tulbura#i punctele de momeal#ă pentru câteva zile după a#ezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, muta#i momeala într-o zon#ă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toat#ă momeala dintr-o zon#ă specific#ă a fost consumat#ă, cre#te#i cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeal#ă . Nu cre#te#i m#ărimea punctului de momeal#ă. Înlocui#i orice momeal#ă în punctele de momeal#ă în care momeala a fost deteriorat#ă de apa sau contaminat#ă de p#ământ.

Urm#ări#i orice instruc#iune adi#ional#ă furnizat#ă de codul de cea mai bun#ă practic#ă relevant#ă.

Executa#i un sondaj înainte aplic#ării momelii asupra zonei infestate #i o evaluare la fa#a locului pentru a identifica specia de roz#ătoare, locurile lor de activitate #i de a determina probabil#ă cauz#ă #i extindere a infesta#iei.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrat#ă al unui sistem de gestiune al d#ăun#ătorilor (IPM), incluzând printre altele, m#ăsurile de igien#ă #i acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luat#ă în considerare starea de rezisten#ă a popula#iei #int#ă la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezisten#ei la anumite substan#e active este suspectat#ă, evita#i utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezisten#ei, este recomandat alternarea momelilor cu substan#e active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legisla#ia na#ional#ă o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otr#ăvirii primare #i secundare de c#ătre anticoagulant, precum #i indicând primele m#ăsurile ce trebuie luate în cazul otr#ăvirii, trebuie s#ă fie puse la dispozi#ie dealungul momelilor.

Îndep#ărta#i produsul r#ămas la sf#âr#itul perioadei de tratament.

Nu utiliza#i acest produs ca momeal#ă permanent#ă.

Dacă este folosit ca momeal#ă în impulsuri: Înlocui#i momeala consumat#ă doar după 3 zile #i apoi la intervale de maxim 7 zile.

4.7.2. M#ăsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informa#i orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate #i a împrejurimilor) despre campania de control.

Pentru a reduce riscul otr#ăvirii secundare, c#ăuta#i #i îndep#ărta#i roz#ătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomand#ările furnizate de codul de cea mai bun#ă practic#ă relevant#ă.

Nu utiliza#i acest produs ca momeal#ă permanent#ă pentru prevenirea infesta#iilor de roz#ătoare sau monitorizarea activit#ă#iilor rodenticide.

Porta#i m#ănu#i de protec#ie rezisten#i la chimicale în timpul manipul#ării produsului (EN374).

4.7.3. În func#ie de modul de utilizare, particularit#ă#i ale efectelor posibile directe sau indirecte, instruc#iuni de prim-ajutor #i m#ăsurile de urgen#ă pentru protec#ia mediului

Atunci când plasa#i sta#iile de momeal#ă în apropierea sistemelor de canalizare, s#ă v#ă asigura#i c#ă momeala nu intr#ă în contact cu apa.

4.7.4. În func#ie de modul de utilizare, instruc#iuni pentru eliminarea în siguran#ă a produsului #i a ambalajului acestuia

Nu sunt

4.7.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt

4.8. Descrierea utilizării

Tabel 8. Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – în exterior în jurul clădirilor

Tip de produs	TP 14: Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide.
Organism(e) țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Denumirea științifică: altele: Mus musculus and/or Rattus norvegicus Denumirea comună: altele: șoarece de casă și/sau șobolan maro Etapă de dezvoltare: altele: Toate
Domeniul (domeniile) de utilizare	utilizare în exterior În exterior în jurul clădirilor.
Metoda (metodele) de aplicare	Metoda: cerere momeală Descriere detaliată: Momeală gata de folosit pentru a folosi în puncte de momeală acoperite sau în stații de momeală rezistente la manipulare.
Rata (ratele) și frecvența de aplicare	Frecvența de aplicare: Pentru șobolani folosiți până la 20 g în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite. Pentru șobolani folosiți 10-60 g momeală în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite la distanțe de 10 metri. Diluare (%): 0 Numărul și calendarul de aplicare: Pentru șoareci utilizați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare. Fixați 5-20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare la distanțe de 5 metri (2 metri în zone cu infestații înalte) acolo unde șoarecii sunt active. Șoarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mutarea punctelor de momeală la fiecare 2-3 zile odată când punctele de momeală sunt inspectate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile și înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ. Dacă toată momeala a fost

	<p>consumată din anumite zone, crește cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu crește mărimea punctului de momeală. Înlocui orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.</p> <p>Pentru obolani folosiți 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulari la distanțe de 10 metri.</p> <p>Fixați 10-60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulari la distanțe de 10 metri (5 metri în zone de infestație înaltă) acolo unde obolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de exemplu urme sau excremente proaspete). Nu mutați sau deranjați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu există semne de activitate de obolani în jurul momelii pentru 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă de activitate de obolani mai mare. Dacă toată momeala a fost consumată din anumite zone, crește cantitatea de momeală prin plasarea mai multor puncte de momeală. Să nu crește mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală consumată de rozătoare sau cea care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.</p>
Categorია (categoriile) de utilizatori	profesioniști instruiți
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	<p>Mărime minimă de pachet 2,5 kg.</p> <p>Până la 25 kg în saci de hârtie multistrat cu strat antiumezeală din PE sau multistrat din hârtie cu sac intern PE separat, sau sac esut din PP cu sac intern PE separat sau sac esut PP fără sac intern.</p> <p>Ambalaj interior: -</p> <p>ambalaj exterior: saci hârtie, PP, PE, 2.5kg 3kg, 3.5kg, 4kg 4.5kg 5kg 10kg 20kg</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g din hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) Ambalaj interior: plicuri hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Plicuri 15, 20, 25, 30, 50 sau 60 g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în carton căptușit cu PE. Ambalaj interior: plicuri de hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Plicuri de 15, 20, 25, 30, 50 sau 60g hârtie/PE sau AL/PE sau hârtie/Al/PE în exterior de carton fibros/carton Ambalaj interior: hârtie/PE, AL/PE sau hârtie/Al/PE</p> <p>Ambalaj exterior: carton fibros/carton 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p> <p>Momeală liberă în pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi)</p> <p>Ambalaj interior: N / A</p> <p>Ambalaj exterior: pachete PE/PP (cuve, găleți sau pungi) 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg, 5kg, 6kg, 7kg, 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg, 15kg, 16kg, 17kg, 18kg, 19kg 20kg</p>

Momeală liberă în carton căptușit cu PE Ambalaj interior -
Ambalaj exterior: carton căptușit cu PE 2.5kg, 3kg, 3.5kg, 4kg,
5kg, 6kg, 7kg 8kg, 9kg 10kg, 11kg, 12kg, 13kg, 14kg,15kg, 16kg,
17kg, 18kg, 19kg 20kg

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până la
60 g (doar #obolani) împachetate în tăvi de momeală cu capac
lipit prin căldură ambalate cu multipli împachetate în exteriore
de carton Ambalaj interior: tăvi de momeală cu capac lipit prin
căldură

Ambalaj exterior: exterior de carton Multiplii:

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

Momeală liberă până la 20 g (#obolani #i #oareci) #i până
la 60 g (doar #obolani) ambalate în tăvi de momeală cu
capac lipit prin căldură împachetate în stații de momeală
rezistente la manipulări din HDPE sau PP de unică folosință
sau reutilizabile, toate împachetate cu multiplii de 1, 2 sau 4 în
exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau
pungă lipită prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu
capac de carton Ambalaj interior: tăvi de
momeală

Ambalaj exterior: stații de momeală din HDPE sau PP ambalate
în exterior de carton sau ambalaj blister sau manșon de carton sau
pungi lipite prin căldură sau exterior poli lipit prin căldură cu
capac de carton

Multipli:

10g –250

15g - 250

20g – 125, 144

25g – 120, 144

30g – 96, 120, 144

40g – 72, 96, 120, 144

50g – 60, 72, 96, 120, 144

60g – 48, 60, 72, 96, 120

80g – 32, 48, 60, 72, 96

90g – 32, 48, 60, 72, 96

100g – 32, 48, 60, 72, 96

120g – 24, 32, 48, 60, 72

200g – 16, 24, 32, 48, 60

240g – 16, 24, 32, 48, 60

4.8.1. Instrucțiuni specifice de utilizare

Pentru #oareci utilizați până la 20 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte
de momeală acoperite. Fixați 5 - 20 g de blocuri în stații de momeală rezistente la manipulări sau puncte
de momeală acoperite distanțate la 5 metri distanță (2 metri în zone cu infestații înalte) în zone unde
#oarecele sunt active. Verificați regulat consumul de momeală și înlocuiți momeala consumată sau stricată
până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații unde există dovada unei noi infestații (de

exemplu urme sau excremente proaspete). #oarecii sunt foarte curioși și poate ajuta programul de control mișcarei momelii la fiecare 2-3 zile în același timp când punctele de momeală sunt verificate sau reîncărcate. Inspectați frecvent punctele de momeală în primele 10-14 zile, și să schimbați orice momeală consumată de rozătoare sau care a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Dacă toată momeala a fost consumată din anumite locuri, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctelor de momeală.

Pentru #obolani utilizați 10 - 60 g de momeală în stații de momeală rezistente la manipulare sau puncte de momeală acoperite plasate la distanțe de 10 metri (5 metri în zonele cu infestație înaltă) în zonele unde #obolanii sunt activi. Verificați regulat consumul de momeală și schimbați momeala consumată sau deteriorată până la terminarea consumului. Repetați tratamentul în situații când există dovada unei noi infestații (de exemplu urme proaspete sau excremente). Nu mutați sau tulburați punctele de momeală pentru câteva zile după așezarea momelii. Dacă nu este văzut nici un semn de activitate de #obolani în jurul momelii după 7-10 zile, mutați momeala într-o zonă cu activitate de #obolani mai mare. Dacă toată momeala dintr-o zonă specifică a fost consumată, creșteți cantitatea momelii prin plasarea mai multor puncte de momeală. Nu creșteți mărimea punctului de momeală. Înlocuiți orice momeală în punctele de momeală în care momeala a fost deteriorată de apă sau contaminată de pământ.

Urmăriți orice instrucțiune adițională furnizată de codul de cea mai bună practică relevantă.

Executați un sondaj înainte aplicării momelii asupra zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica specia de rozătoare, locurile lor de activitate și de a determina probabilă cauză și extindere a infestației.

Produsul trebuie folosit doar ca parte integrată al unui sistem de gestiune al dăunătorilor (IPM), incluzând printre altele, măsurile de igienă și acolo unde este posibil metodele fizice ale controlului.

Trebuie luată în considerare starea de rezistență a populației înainte la alegerea rodenticidului dorit de a folosi. În zonele unde dovada rezistenței la anumite substanțe active este suspectată, evitați utilizarea lor. Pentru a controla dispersarea rezistenței, este recomandat alternarea momelilor cu substanțe active anticoagulante diferite.

Dacă politica sau legislația națională o cer, atunci când produsul este utilizat în locurile publice, zonele tratate trebuie marcate în timpul perioadei de tratament, explicând riscul otrăvirii primare și secundare de către anticoagulant, precum și indicând primele măsuri ce trebuie luate în cazul otrăvirii, trebuie să fie puse la dispoziție dealungul momelilor.

Îndepărtați produsul rămas la sfârșitul perioadei de tratament.

Protejați momeala de condițiile atmosferice (de exemplu ploaie, zăpadă, etc.). Plasați stațiile de momeală în locuri care nu sunt predispuși la inundații.

Nu utilizați acest produs ca momeală permanentă.

Dacă este folosit ca momeală în impulsuri: Înlocuiți momeala consumată doar după 3 zile și apoi la intervale de maxim 7 zile.

4.8.2. Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.

When used in burrows: Baits must be placed to minimise the exposure to non-target species and children. Cover or block the entrances of baited burrows to reduce the risks of bait being rejected and spilled.

Wear protective chemical resistant gloves during product handling phase (EN374).

Acolo unde este posibil, înainte de tratament informați orice posibil spectator (de exemplu utilizatorii zonei tratate și a împrejurimilor) despre campania de control. Pentru a reduce riscul otrăvirii secundare, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului la intervale frecvente, în linie cu recomandările furnizate de codul de cea mai bună practică relevantă.

Purtați mănuși de protecție rezistente la chimicale în timpul manipulării produsului (EN374).

4.8.3. În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Atunci când plasați punctele de momeală în apropierea apelor de suprafață (de exemplu râuri, lacuri, canale de apă, baraje, canale de irigație) sau sistemelor de canalizare de apă, să vă asigurați că contactul momelei cu apa este evitată.

4.8.4. În funcție de modul de utilizare, instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

Nu sunt.

4.8.5. În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Nu sunt.

Cap. 5. INSTRUCȚIUNI GENERALE DE UTILIZARE¹

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Citiți și urmăriți informația de produs precum și orice informație care însoțește produsul sau care este furnizat la punctul de vânzare, înainte de utilizare.

Luați în considerare măsurile preventive de control (de exemplu dopați găurile, îndepărtați mâncarea și băutura potențială cât se poate) pentru a îmbunătăți consumul de produs și de a reduce probabilitatea reinveziei.

Înainte de folosirea produselor rodenticide, trebuie luate în considerare metodele de control nechimice (de exemplu capcane).

Îndepărtați mâncarea care este gata disponibil pentru rozătoare (de exemplu grâu vărsat sau deșeurile alimentare). În afara de acesta să nu curățați zona infestată doar înainte de tratamentului, pentru că acesta doar o să-l deranjeze populația de rozătoare și momeala va fi mai greu acceptată.

Nu deschideți plicurile care conțin momeala (Profesioniști instruiți - Doar pentru plicuri negolabile).

Stațiile de momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată acolo unde activitatea de rozătoare a fost observată.

Acolo, unde este posibil, stațiile de momeală trebuie fixate la pământ sau de alte structuri.

Nu plasați stațiile de momeală în apropierea sistemelor de canalizare unde pot intra în contact cu apa.

Plasați stațiile de momeală departe de mâncare, băutură și furaje animale, precum și ustensile sau suprafețe care intră în contact cu acestea.

Plasați stațiile de momeală la locuri inaccesibile pentru copii, păsări, animale domestice și alte animale neîntâ.

A nu mânca, bea sau fuma în timpul utilizării a produsului. Spălați mâinile și pielea expusă direct după utilizarea acestui produs.

Profesioniști și profesioniști instruiți: Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile, consumul de momeală nu se oprește, și nu se observă un declin în activitatea de rozătoare, atunci trebuie determinate cauzele probabile. Acolo unde alte elemente au fost excluse, este posibil ca există rozătoare rezistente, deci luați în considerare utilizarea unui rodenticid ne-coagulant, acolo unde este disponibil, sau utilizarea unui rodenticid anticoagulant mai puternic. De asemenea luați în considerare utilizarea capcanelor ca măsură de control alternativă.

Profesioniști și profesioniști instruiți: - Momeală liberă: Plasați momeala în stațiile de momeală folosind o unealtă de dozare. Specificați metodele pentru a minimaliza praful (de exemplu #tergere umedă).

Îndepărtați momeala rămasă sau stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.

5.2. Măsuri de reducere a riscurilor

Să nu folosiți produse care conțin brodifacoum ca momeală permanentă (de exemplu pentru prevenirea infestației de rozătoare sau pentru a detecta activitate de rozătoare).

Eliminați rozătoarele moarte în conformitate cu cerințele locale [Metoda de eliminare trebuie descrisă specificat în SPC-ul național și să fie reflectată pe eticheta produsului].

Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte în timpul tratamentului, cel puțin atât de frecvent, cât de frecvent stațiile de momeală sunt inspectate.

Utilizarea acestui produs ar trebui să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să recomande clar, că în cazul lipsei de eficiență suspectate până la sfârșitul perioadei de tratament (de exemplu activitatea de rozătoare se mai poate observa), utilizatorul trebuie să consulte vânzătorul produsului sau să apeleze un serviciu de control al dăunătorilor.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar, că produsul nu trebuie vândut publicului general (de exemplu "doar pentru profesioniști").

¹Instrucțiunile de utilizare, măsurile de reducere a riscurilor și alte instrucțiuni de utilizare prevăzute la prezentul punct sunt valabile pentru orice utilizare autorizată.

[Pentru produse de a fi autorizate pentru utilizatori profesioniști instruiți:] Informația de produs (de exemplu etichetă și/sau prospect) trebuie să arate clar că produsul trebuie vândut doar profesioniștilor instruiți care dețin certificat doveditor de conformitate cu cerințele de instruire aplicabile (de exemplu „doar pentru profesioniști instruiți”).

5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim-ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. Dacă este înghițit, simptomele, care pot fi întârziate, pot include sângerarea nasului și a gingiilor. În cazuri severe, pot apărea vânătăi sau sânge în excremente sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/veterinar.

În caz de expunere: Expunere dermală, spălați pielea cu apă, apoi cu apă și săpun.

Expunerea ochilor, clătiți ochii cu lichid de clătire a ochilor sau apă, păstrați pleoapele deschise pentru cel puțin 10 minute.

Expunere orală, clătiți gura cu grijă cu apă. Nu dați niciodată nimic prin gură unei persoane inconștiente.

Nu provocați vomă. Dacă este înghițit, cereți ajutor medical și arătați-le containerul și eticheta produsului.

Dacă este înghițit de un animal de companie contactați un medic veterinar.

Stățiile de momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mișcați sau deschideți"; "conține un rodenticid"; "numele produsului sau numărul de autorizație"; "substanțe active" și "în caz de accident, sunați numărul Centrului Național de Informare Toxicologică (01) 809 2166".

Periculos animalelor sălbatice.

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

La sfârșitul tratamentului, eliminați momeala neconsumată și ambalajul în conformitate cu cerințele locale. Purtarea mănușilor este recomandat.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

Valabilitate: 24 luni Păstrați într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Țineți ambalajul închis și departe de lumina directă a soarelui. Păstrați în locuri inaccesibile pentru copii, păsări, și animale de fermă.

Păstrați doar în containerul original.

Cap. 6. ALTE INFORMAȚII

Din cauza modului de acțiune întârziat, rodenticidelor anticoagulant poate lua 4 - 10 zile de a deveni eficiente după consumarea momelii.

Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâna goală, purtați mănuși și unelte ca clește când îndepărtați pe ele.

Acest produs conține o substanță amară și un colorant.