



Bratislava, 8. apríla 2019

Naša značka: 15096/2019-3052-23356

Ref. číslo: bio/905/O/19/RM

## ROZHODNUTIE

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako príslušný orgán podľa ustanovenia § 5 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a ustanovení § 3 písm. a) a § 4 zákona č. 319/2013 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pre sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (biocídny zákon) v znení neskoršej novely (ďalej len „biocídny zákon“) vo veci žiadosti žiadateľa **BASF Slovensko s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika** identifikačné číslo BC-TP032436-20 o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocidného výrobku, podanej podľa článku 34 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len „nariadenie o biocídnych výrobkoch“) zo dňa **1.6.2017** rozhodlo tak, že

### a u t o r i z u j e b i o c í d n y v ý r o b o k n a z á k l a d e p a r a l e l n é h o v z á j o m n é h o u z n a n i a

Názov biocidného výrobku: **Storm Ultra**

Číslo autorizácie biocidného výrobku: **SK19-MRP-010**

Platnosť autorizácie do: **07. decembra 2023**

za podmienok uvedených v zhrnutí charakteristik biocidného výrobku v Prílohe 1 tohto rozhodnutia a v rozsahu autorizácie biocidného výrobku č. NL-0017150-0000 platnej do 07.12.2023 a udelenéj príslušným orgánom referenčného členského štátu Holandsko dňa 07.12.2018.

### O d ô v o d n e n i e :

Žiadateľ BASF Slovensko s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika doručením žiadosti identifikačné číslo BC-TP032436-20 zo dňa 1.6.2017 prostredníctvom registra pre biocidne výrobky (ďalej len „R4BP“) v zmysle čl. 71 nariadenia o biocidnych výrobkoch požiadal Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej tiež „MH SR“) o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocidného výrobku č. NL-0017150-0000 udelenéj rozhodnutím o autorizácii platnej do 07.12.2023 a udelenéj príslušným orgánom referenčného členského štátu Holandsko dňa 07.12.2018.

Preskúmaním žiadosti MH SR zistilo, že žiadosť o vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocidného výrobku spĺňa požiadavky ustanovené nariadením o biocidnych výrobkoch. Vykonaním hodnotenia biocidného výrobku MH SR dospelo k záveru, že biocidny výrobok definovaný v predloženom zhrnutí charakteristik biocidného výrobku spĺňa podmienky pre vzájomné uznanie vnútroštátnej autorizácie biocidného výrobku.

Po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia sa biocidny výrobok môže sprístupňovať na trhu v Slovenskej republike.

Informácie o autorizáciách biocidnych výrobkov je možné nájsť prostredníctvom web stránky Európskej chemickej agentúry <https://echa.europa.eu/sk/information-on-chemicals/biocidal-products>.

Držiteľ autorizácie zabezpečí, aby sa biocídny výrobok sprístupňoval na trhu v Slovenskej republike v súlade so schváleným zhrnutím charakteristik biocídneho výrobku v prílohe 1 k tomuto rozhodnutiu a v súlade s ustanoveniami nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Držiteľ autorizácie je zodpovedný za klasifikáciu, balenie a označovanie biocídneho výrobku v súlade s čl. 69 a je zodpovedný za kartu bezpečnostných údajov v súlade s článkom 70 nariadenia o biocídnych výrobkoch.

Podľa § 14 ods. 1 písm. b) biocídneho zákona MH SR vyberá ročné platby za biocídne výrobky sprístupnené na trhu Slovenskej republiky. Podľa § 14 ods. 9 biocídneho zákona sú ročné platby splatné každoročne do 30. júna kalendárneho roka po vydaní príslušného rozhodnutia o sprístupnení biocídneho výrobku na trh. V prípade nezaplatenia ročnej platby MH SR vydá rozhodnutie o ukončení sprístupňovania biocídneho výrobku na trhu v Slovenskej republike. Ročné platby sú splatné bez výzvy. Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 340/2013 Z. z. ustanovuje predmet, náležitosti a sadzbu úhrad a ročných platieb za sprístupňovanie biocídnych výrobkov na trh a ich používanie.

V súlade s ustanoveniami článku 40 nariadenia o biocídnych výrobkoch a delegovaným nariadením Komisie (EÚ) č. 492/2014 zo 7. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012, pokiaľ ide o pravidlá obnovovania autorizácií biocídnych výrobkov, ktoré podliehajú vzájomnému uznávaniu, je možná obnova autorizácie biocídneho výrobku.

#### P o u č e n i e :

Podľa článku 71 ods. 6 nariadenia o biocídnych výrobkoch sa doručenie tohto rozhodnutia prostredníctvom registra pre biocídne výrobky (R4BP) považuje za oznamenie rozhodnutia.

Podľa § 61 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno v lehote 15 dní odo dňa oznamenia tohto rozhodnutia podať rozklad na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, Mlynské Nivy 44/a, 827 15 Bratislava 212. Včas podaný rozklad má odkladný účinok.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom za podmienok stanovených v § 177 a nasl. zákona č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok.



RNDr. Ján Čepček, PhD.  
riaditeľ

Centrum pre chemické látky a prípravky

Doručiť: **BASF Slovensko s r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovenská republika**

# Príloha 1

Bratislava, 8. apríla 2019  
Naša značka: 15096/2019-3052-23356  
Ref. číslo: bio/905/O/19/RM

## 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

### 1.1. Výrobok

Názov výrobku	Storm Ultra
Obchodné názvy	Storm Ultra Storm Ultra Secure Storm Ultra Block Baits (BB) Veor Secuvia Veor Secure Secuvia Secure

### 1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	BASF Slovensko s r.o.
	Adresa	Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, Slovensko
Číslo autorizácie	SK19-MRP-010	
R4BP žiadosť o autorizáciu	BC-TP032436-20	
Dátum autorizácie	08. apríla 2019	
Dátum skončenia platnosti autorizácie	7. decembra 2023	

### 1.3. Výrobcu výrobku

Názov výrobcu	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adresa výrobcu	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	St. Michaels Industrial Estate, WA8 8TJ Widnes, Spojené kráľovstvo
	Schirm GmbH, Dieselstraße 8, 85107 Baar-Ebenhausen, Nemecko

### 1.4. Výrobcu(ovia) účinnej(ych) látky(látok)

Účinná látka	Flokumafén
Názov výrobcu	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adresa výrobcu	Huobstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ, Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	Vertellus Specialties UK Ltd. Lower Road, WA8 8 NS Halebank, Widnes, Spojené kráľovstvo

## 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Flokumafén	4-hydroxy-3-[(1RS,3RS;1RS,3RS)-1,2,3,4-tetrahydro-3-[4-(4-trifluoromethylbenzyloxy)phenyl]-1-naphthyl]coumarin	Účinná látka	90035-08-8	421-960-0	0.0025

### 2.2. Typ úpravy

RB - Návnada (na priame použitie)

## 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	-
Bezpečnostné upozornenia	-

## 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIA

### 4.1. Opis použitia

#### Použitie 1: Myš domová – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Mus musculus</i> - Myš domová - dospelé/mladé
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Aplikícia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	15 g – 25 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 1-2 metre.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 15g - 100g Návnady (5g/25g) balené v: • predplnených PP staničkách odolných voči manipulácii zabalených v PET/PE znova-uzatvárateľnej nádobe alebo v znova-uzatvárateľnej

	lepenkovej škatuli • PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedierkach s vrchnákom a uzatvárateľných nádobách • PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón
--	--

#### 4.1.1. *Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie*

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.1.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

V informáciách o výrobku (etiketa alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa aplikuje na to určených deratizačných staničkách odolných proti manipulácii (napr. "použite len v deratizačných staničkách odolných proti manipulácii");
- používateľia musia správne označiť návnadové staničky s informáciami uvedenými v časti 5.3 SPC (napr. označte deratizačné staničky podľa odporúčania výrobku).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

#### 4.1.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

## 4.2. Opis použitia

### Použitie 2: Potkany – široká verejnosť – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - dospelé mladé <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - dospelé mladé
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5-10 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 50g - 300g Návnady (5g/25g) balené v: <ul style="list-style-type: none"> <li>• predplnených PP staničkách odolných voči manipulácii zabalených v PET/PE znova-uzatvárateľnej nádobe alebo v znova-uzatvárateľnej lepenkovej škatuli</li> <li>• PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedierkach s vrchnákom a uzatvárateľných nádobach</li> <li>• PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobach ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón</li> </ul>

#### 4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Neumiestňujte deratizačné staničky blízko kanalizačnej siete, kde môžu prísť do styku s vodou.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

V informáciách o výrobku (etiketa alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa aplikuje v na to určených deratizačných staničkách odolných proti manipulácii (napr. "použite len v deratizačných staničkách odolných proti manipulácii");
- používateelia musia správne označiť návnadové staničky s informáciami uvedenými v časti 5.3 SPC (napr. označte deratizačné staničky podľa odporúčania výrobku).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

4.2.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.2.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.2.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.3. Opis použitia

#### Použitie 3: Potkany – široká verejnosť – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedy - dospelé mladé <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - dospelé mladé
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácií.
Dávkovanie a frekvencia	50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5-10 metrov.
Kategória používateľov	Široká verejnosť (neprofesionálne)
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 50g - 300g Návnady (5g/25g) balené v: • predplnených PP staničkách odolných voči manipulácii zabalených v PET/PE znova-uzatvárateľnej nádobe alebo v znova-uzatvárateľnej lepenkovej škatuli • PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedierkach s vrchnákom a uzatvárateľných nádobách • PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón

#### 4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel

hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnuadu.

Pred použitím rodenticídnych výrobkov by sa malo zvážiť použitie nechemických kontrolných metód (napr. pasce).

Neumiestňujte deratizačné staničky do blízkosti kanalizačných systémov alebo v blízkosti povrchových vôd (napr. riek, rybníkov, vodných kanálov, hrádz, zavlažovacích kanálov), kde môžu prísť do kontaktu s vodou. Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnuadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.3.2. *Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie*

V informáciách o výrobku (etiketa alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

- výrobok sa aplikuje v na to určených deratizačných staničkách odolných proti manipulácii (napr. "použite len v deratizačných staničkách odolných proti manipulácií");
- používateľia musia správne označiť návnuadové staničky s informáciami uvedenými v časti 5.3 SPC (napr. označte deratizačné staničky podľa odporúčaní výrobku).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

#### 4.3.3. *Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.3.4. *Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.3.5. *Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlosť výrobku za bežných skladovacích podmienok*

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.4. **Opis použitia**

#### **Použitie 4: Myš domová – profesionáli – vnútorné priestory**

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Mus musculus</i> - Myš domová - dospelé/mladé
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	15 g – 25 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 1-2 metre.
Kategória používateľov	Profesionálne

Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Veľkosť balenia: 3kg – 10kg  Návnady (5g/25g) balené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedrách s vrchnákom a uzatvárateľných nádobách</li> <li>• PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón</li> </ul>

#### 4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.4.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.5. Opis použitia

#### Použitie 5: Potkany – profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - dospelé mladé <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - dospelé mladé
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácií.
Dávkovanie a frekvencia	50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5-10 metrov.
Kategória používateľov	Profesionáli
Riedenie	-

Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Veľkosť balenia: 3kg – 10kg          Návnady (5g/25g) balené v:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedräch s vrchnákom a uzatvárateľných nádobách</li> <li>• PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón</li> </ul>
-------------------------------------	--

#### 4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tieľ hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.6. Opis použitia

#### Použitie 6: Myš domová a potkany – profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy.
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Mus musculus</i> - Myš domová - dospelé/mladé <i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - dospelé mladé <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - dospelé mladé
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Dávkovanie a frekvencia	Myši: 15 g – 25 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 1-2 metre.

	Potkany: 50 g – 75 g návnady na deratizačnú staničku. Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, vzdialenosť medzi nimi by mala byť 5-10 metrov.
Kategória používateľov	Profesionál
Riedenie	-
Veľkosť balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 3kg – 10kg Návnady (5g/25g) balené v: • PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedrách s vrchnákom a uzatvárateľných nádobách • PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón

#### 4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh atď.). Umiestnite deratizačné staničky v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu v deratizačnej staničke, v ktorej je návnada poškodená vodou alebo kontaminovaná nečistotou.

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni (myši) a každých 5 až 7 dní (potkany) na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplnite návnadu.

Na konci procesu odstráňte zvyšnú návnadu alebo deratizačné staničky.

#### 4.6.2. Opatrenia na znielenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.6.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Ked' umiestňujete deratizačné staničky blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedošlo k styku s vodou.

#### 4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

### 4.7. Opis použitia

#### Použitie 7: Myš domová a potkany – vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Mus musculus</i> - Myš domová - dospelé/mladé <i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - dospelé mladé

	<i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - dospelé mladé
Oblasti použitia	Vnútorné Vnútorné priestory
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
Dávkovanie a frekvencia	Pulzné umiestnenie návnady. Myš: 15 g – 25 g na každé návnadové miesto. Potkany: 50 g -70 g na každé návnadové miesto.
Kategória používateľov	Vyškolený profesionáli
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 3kg – 10kg Návnady (5g/25g) balené v: • PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedrách s vrchnákom a uzatvárateľných nádobách • PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzatvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón

#### 4.7.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Nahradte skonzumovanú návnadu až po 3 dňoch, a potom maximálne v 7-dňových intervaloch.

Pozbierajte rozliatu/rozsypanú návnadu a mŕtve hlodavce.

Frekvencia návštev ošetrovanej oblasti závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe prieskumu uskutočneného na začiatku aplikácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Vymeňte skonzumované návnady až po 3 dňoch, a potom najviac v 7-dňových intervaloch. Pozbierajte vysypanú návnadu a odstráňte uhynuté hlodavce.

Na konci aplikácie odstráňte zvyšky výrobku.

#### 4.7.2. Opatrenia na zniženie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

#### 4.7.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

#### 4.7.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.7.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.8. Opis použitia

##### Použitie 8: Myš a potkany – vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	Výrobky typu 14 - Rodenticídy
Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cielové organizmy (vrátane vývojových štadií)	<i>Mus musculus</i> - Myš domová - dospelé/mladé <i>Rattus norvegicus</i> - Potkan hnedý - dospelé mladé <i>Rattus rattus</i> - Potkan tmavý - dospelé mladé
Oblasti použitia	Vonkajšie Vonku okolo budov
Spôsob aplikácie	Aplikácia návnady. Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácií. Zakryté a chránené miesta s návnadou. Priama aplikácia návnady na okamžité použitie do brlohu.
Dávkovanie a frekvencia	Pulzné umiestnenie návnady. Myš: 15 g – 25 g na každé návnadové miesto. Potkany: 50 g -70 g na každé návnadové miesto, 50 g - 75 g návnady na brloh
Kategória používateľov	Vyškolený profesionáli
Riedenie	-
Veľkosti balenia a obalový materiál	Veľkosť balenia: 3kg – 10kg Návnady (5g/25g) balené v: • PP alebo HDPE alebo PET alebo PE vedrách s vrchnákom a uzavrvárateľných nádobách • PP alebo PE alebo PET alebo HDPE lemovaných znova-uzavrvárateľných nádobách ako je téglík, plechovka alebo lepenkový kartón

##### 4.8.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Skonzumovanú návnadu nahradťte až po 3 dňoch a potom v maximálne 7-dňových intervaloch. Zozbierajte všetku uniknutú návnadu a mŕtve hlodavce.

Frekvencia návštev ošetrovanej oblasti závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe prieskumu uskutočneného na začiatku aplikácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Pri vonkajšom použití musia byť návnadové miesta zakryté a umiestnené na strategických bodoch s cieľom minimalizovať expozíciu iných ako cieľových druhov.

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia iných ako cieľových druhov a detí. Zakryte alebo zablokujte vstupy do nôr s návnadami, aby ste obmedzili riziko odmietnutia alebo vyplavenia návnady.

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie. Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminované nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

##### 4.8.2. Opatrenia na zniženie rizika špecifické pre dané použitie

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otavy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve

hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.  
Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

**4.8.3. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

**4.8.4. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodenie výrobku a jeho obalu**

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

**4.8.5. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanливosť výrobku za bežných skladovacích podmienok**

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

## **5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE**

### **5.1. Pokyny na používanie**

Pred použitím si prečítajte a dodržujte informácie o výrobku, ako aj akékoľvek informácie priložené k výrobku alebo poskytnuté v mieste predaja.

Odstráňte potraviny, ktoré sú pre hlodavce ľahko dosiahnuteľné (napr. rozsypané obilie alebo potravinový odpad). Okrem toho nečistite zamorenú oblasť tesne pred deratizáciou, keďže čistenie len vyruší populáciu hlodavcov a sťaží dosiahnutie prijatia návnady.

Výrobok by sa mal umiestniť do bezprostrednej blízkosti miest, kde sa predtým objavili známky aktivity hlodavcov (napr. cestičky, hniezdiská, miesta kŕmenia, pelechy, brlohy atď.).

Keď to je možné, musia byť deratizačné staničky pripojené k zemi alebo k iným konštrukciám.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Umiestnite výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia a povrchov, ktoré s nimi prichádzajú do styku.

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

#### **Profesionáli a vyškolení profesionáli:**

Pred umiestnením návnady vykonajte prieskum zamorenej oblasti a vykonajte posúdenie na mieste na identifikáciu druhov hlodavcov, ich miest aktivity a určite pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Výrobok by sa mal používať len ako súčasť systému integrovanej ochrany proti škodcom, ktorý okrem iného zahŕňa hygienické opatrenia a, ak je to možné, fyzické metódy kontroly.

Deratizačné staničky musia byť jasne označené, že obsahujú rodenticídy a že sa s nimi nesmie hýbať a nesmú sa otvoriť (pozri oddiel 5.3 pre informácie, ktoré majú byť uvedené na etikete).

Keď sa výrobok používa na verejných priestranstvách, tieto by mali byť počas deratizácie označené a pri návnadách musí byť oznam s vysvetlením rizika primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantom a musí byť uvedená aj prvá pomoc, ktorá sa má poskytnúť v prípade otravy.

Návnada by mala byť zabezpečená tak, aby ju nebolo možné odtiahnuť preč od deratizačnej staničky.

Počas manipulácie s výrobkom nosťe ochranné rukavice odolné voči chemickým látкам (materiál rukavíc bližšie určí držiteľ povolenia v informáciach o výrobku).

Ak je prijem návnady pomerne malý v porovnaní so zjavným rozsahom zamorenia, zvážte presun deratizačných

staničiek na vzdialenejšie miesta a možnosť zmeny formulácie návnady.  
Ak sú návnady po období deratizácie 35 dní nadľaď konzumované a nie je možné pozorovať pokles činnosti hlodavcov, treba určiť pravdepodobnú príčinu. Ak boli vylúčené iné prvky, je pravdepodobné, že hlodavce sú rezistentné, takže zvážte použitie rodenticídu bez antikoagulantu, kde je to možné, alebo silnejšieho antikoagulantného rodenticídu. Zvážte tiež použitie pascí ako alternatívneho opatrenia na kontrolu hlodavcov.

## 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opäťovnej invázie.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnelej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas procesu deratizácie, minimálne tak často, ako sa kontrolujú deratizačné staničky.

### Profesionáli a vyškolení profesionáli:

Ked' to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

### Len profesionáli:

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát týždenne). [Ak je to náležité, uvedťte ak sa vyžaduje častejšia alebo každodenná kontrola].

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že:

výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“).

- výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácií (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácií“),

- Používateľia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

### Vyškolení profesionáli:

V informáciách o výrobku (t. j. na etikete a/alebo letáku) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať len vyškoleným profesionálnym používateľom s osvedčením, ktorým sa preukazuje dodržiavanie platných požiadaviek na odbornú prípravu (napr. „len pre vyškolených profesionálnych používateľov“).

Nepoužívajte v oblastiach, kde je podozrenie na rezistenciu na účinnú látku.

Nestriedajte použitie rôznych antikoagulantov s porovnatelnou alebo slabšou potenciou na účely zvládnutia rezistencie. Na striedavé použitie zvážte použitie neantikoagulantného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Medzi aplikáciami neumývajte vodou stanice na návnadu ani pomôcky, ktoré sa používajú na prikrytých a chránených miestach s návnadou.

## 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehlbnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce d'asná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátku: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárny personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
  - zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
  - orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehlnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltne domáce zvieratá, spojte sa s veterinárnym lekárom.
- Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“, „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [telefón: 00421 2 54 77 41 66]“.
- Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

#### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovanú návihadlo a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami.

Nepoužrite obaly na žiadten iný účel.

Odporuča sa používanie rukavíc.

#### 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácych zvierat a hospodárskych zvierat. Doba použiteľnosti výrobku je 2 roky.

### 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návihy. Hlodavce môžu prenášať choroby. Nedotýkajte sa mŕtvyh hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.

- koniec dokumentu -