


**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2020/0265/MRA/ TP18-0345**

În conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data 27.02.2020, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă paralelă eliberată în conformitate cu prevederile art. 34 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;


- Statul membru al Uniunii Europene emitent: GRECIA
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: TP18-0345

II. Data emiterii autorizatiei: 27.03.2020, rescris in data de 23.07.2020.**III. Data expirării autorizatiei:** 04.06.2029**IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID:** FENDONA 15 SC**Alte denumiri comerciale:** PAMOVA 15 SC**V.****NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România:** BASF SRL.,
Floreasca Park, Sos.Pipera nr.43, corp A, etaj 1,01425, Bucuresti**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc:** BASF Hellas A.B.E.E., Paradeisou
2 & Kifisia, 15125 Marousi, Grecia**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID:** BASF Agro B.V- Arnhem (NL) – Freienbach
Branch
Adresa producatorului: BASF Agri-Production S.A.S. Rue Jacquard Z.I. Lyon Nord 69727 Genay
Cedex Franta**NUMELE FABRICANTULUI de SUBSTANTA ACTIVA:** BASF Agro B.V- Arnhem (NL) –
Freienbach Branch
Adresa producatorului : Huobstrasse 3, 8808 , Pfaffikon SZ, Elveția
Adresa fabricii producatoare 1: Tagros Chemicals India Ltd.- Sipcot Industrial Complex
Pachayankuppam, Cuddalore-607 005,India
Adresa fabricii producatoare 2:Bayer Vapi Private Ltd. (fosta Bilag Industries Private Ltd.)
Plot Nr. 306/3; II Phase, GIDC, Vapi-396195, Gujarat, India**VI.****TIPUL DE PRODUS:** Grupa Principala 3: TP 18.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**VII.**

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: profesionali , populatie.


VIII.

TIPUL PREPARATULUI: suspensie concentrata

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ**1)Substanta activă****a) substante chimice**

Denumirea IUPAC	Alfa-cipermetrin
Numar CAS	67375-30-8
Numar CE	-
Continut de substantă activă	1.58%

2)Substanta inactivă/nonactivă-neprecizata**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substante chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS09 Atentie!
Fraze de risc H	H410 - Foarte toxic pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung. EUH208 Poate provoca o reactie alergica. Contine 1.2 Benzisothiazolin-3-one. Produsul contine alfa-cipermetrin. Poate cauza parestezie.
Fraze de prudență P	P101 - Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului P102 - A nu se lăsa la îndemâna copiilor P103 - Citiți eticheta înainte de utilizare P273 - Evitați dispersarea în mediu. P391 - Colectați scurgerile de produs. P501 - Eliminați conținutul/recipientul la o instalație de eliminare a deșeurilor periculoase.
Mențiuni:	-

XI. AMBALAREA

Utilizatori : profesionali-Flacon sau recipient betrix sau bidon polietilenă de înaltă densitate. 0,2, 0,5 și 1 litru, produsul este un concentrat lichid și se aplică prin pulverizare cu pulverizator de presiune mică, pe suprafețe.


Utilizatori: Populatie

Flacon sau recipient betrix sau bidon polietilenă de înaltă densitate: 50 ml, 100 ml. Ambalajul produsului include dozimetru.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**XI. INSTRUCIUNILE SI DOZELE DE APLICARE****Utilizatori profesionali - Igienă rurală (Cotețe animale/Adăposturi)**

Gândacul roșu de bucătărie (*Blattella germanica*), nimfe și adulți; și furnici (*Lasius niger*), adulți. Țânțari (*Culex spp.*), adulți; și viespi (*Vespula spp.*), adulți.

La interior, în următoarele subcategorii de adăposturi de animale: cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare, cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare, cuști de baterii compacte, găină ouătoare, la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare, părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseală tip grătar, părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar.

Produsul este un lichid concentrat și se aplică prin pulverizare pentru tratamentul suprafețelor infestate prin pulverizarea grosieră pentru tratarea suprafeței respective.

Atenție specială trebuie acordată pentru crăpături, fisuri și orice loc unde se pot ascunde insecte și pe suprafețele pe care se pot țiri sau așeza.

<i>FENDONA 15 SC (mL)</i> <i>DOZĂ MICĂ</i>	<i>FENDONA 15 SC (mL)</i> <i>DOZĂ MARE</i>	<i>Volumul de apă</i> <i>pentru diluție (L)</i>	<i>Suprafața tratată</i> <i>(m2)</i>
20	40	1	20
10	20	0.5	10
5	10	0.25	5

ex. Pentru tratamentul unei suprafețe de 20 m²,

- la doză mică: se diluează 20 ml produs în 1 litru apă (1:50; 2.0% v/v),
- la doza mare: 40 ml produs se diluează în 1 litru apă (1:25; 4.0% v/v).

Pentru gândaci, este stabilită o doză de aplicare de 15 mg s.a./m² pentru adăposturi cu igienă ridicată, în alte condiții, trebuie să se utilizeze o doză de 30 mg s.a./m².

Frecvența: **4 aplicări pe an:**

- cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare,
- cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare,
- cuști de baterii compacte, găină ouătoare,
- la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare
- părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseală tip grătar,
- părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar.

Populație- Igienă Rurală (Cotețe animale/Adăposturi)

Gândacul roșu de bucătărie (*Blattella germanica*), nimfe și adulți; și furnici (*Lasius niger*), adulți. Țânțari (*Culex spp.*), adulți; și viespi (*Vespula spp.*), adulți.

La interior, în următoarele subcategorii de adăposturi de animale: cuști de baterii fără tratament, găină ouătoare, cuști de baterii cu uscare forțată, găină ouătoare, cuști de baterii compacte, găină ouătoare, la sol pe pardoseală tip grătar, găină ouătoare, părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseala tip grătar, părinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar.

Produsul este un lichid concentrat și se aplică prin pulverizare pentru tratamentul suprafețelor infestate prin pulverizarea grosieră pentru tratarea suprafeței respective.

Atenție specială trebuie acordată pentru crăpături, fisuri și orice loc unde se pot ascunde insecte și pe suprafețele pe care se pot țiri sau așeza.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

<i>FENDONA 15 SC (mL) DOZĂ MICĂ</i>	<i>FENDONA 15 SC (mL) DOZĂ MARE</i>	<i>Volumul de apă pentru diluție (L)</i>	<i>Suprafața tratată (m²)</i>
20	40	1	20
10	20	0.5	10
5	10	0.25	5

ex. Pentru tratamentul unei suprafețe de 20 m²,

- la doza mică: 20 ml produs este diluat în 1 litru apă (1:50; 2.0% v/v),
- la doza mare: 40 ml produs este diluat în 1 litru apă (1:25; 4.0% v/v).

Pentru gândaci, este stabilită o doză de aplicare de 15 mg s.a./m² pentru adăposturi cu igienă crescută, în alte condiții, trebuie să se utilizeze o doză de 30 mg s.a./m².Frecvența: **4 aplicări pe an:**

- cuști de baterii fără tratament, găina ouătoare,
- cuști de baterii cu uscare forțată, găina ouătoare,
- cuști de baterii compacte, găina ouătoare,
- la sol pe pardoseala tip grătar, găina ouătoare
- părinți broiler > 18 săptămâni, la sol cu pardoseala tip grătar,
- parinți broiler în creștere, la sol cu pardoseală tip grătar.

XII. CONDIȚIILE DE DEPOZITARE:

A se feri de căldură și de acțiunea directă a razelor solare. A se proteja împotriva umezelii. A se feri de temperaturi sub 0°C. Produsul poate cristaliza dacă temperatura limită este depășită. A se feri de temperaturi mai mari de 40°C. Caracteristicile produsului se pot modifica dacă acesta este depozitat mai multă vreme la temperaturi mai înalte decât cele indicate. Respectând indicațiile prezentate, produsul poate fi utilizat în scopul propus.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDICE ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE
ALTE INFORMATII: 3 ani

Restricții pentru utilizarea produsului biocid: „-”

Prezenta autorizație este însoțită de următoarele documente:

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fișa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- Este obligatorie transmiterea de către deținătorul autorizației a fișei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca