

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

PROPASTA

Productsoort(en)

PT14: Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2013-0035

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0003392-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

| | |
|----------------------|--|
| Handelsnaam (-namen) | PROPASTA STRONG PASTA RICA PASTA BRODIPASTA MS RODETOX BRODI PASTE FORTE PASTA FORTE PASTA TUBE FORTE CREME Propasta Creme Broditox Pasta Broditox Creme |
|----------------------|--|

1.2. Toelatingshouder

| | | |
|--|-------|---------------------------------------|
| Naam en adres van de houder van de toelating | Naam | ARMOSA TECH SA |
| | Adres | Rue des Tuiliers, 1 4480 Engis België |
| Toelatingsnummer | | BE2013-0035 |
| <i>Toelatingsnummer in R4BP</i> | | BE-0003392-0000 |
| Toelatingsdatum | | 30/07/2013 |
| Vervaldatum | | 01/07/2026 |

1.3. Fabrikant(en) van het product

| | |
|------------------------|---|
| Naam van de fabrikant | ARMOSA SA |
| Adres van de fabrikant | Rue des Tuiliers 1 4480 Engis België |
| Productielocaties | ARMOSA SA site 1 Rue des Tuiliers 1 4480 Engis België |

| | |
|------------------------|--|
| Naam van de fabrikant | Compagnie Générale des Biocides (CGB) |
| Adres van de fabrikant | Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrijk |
| Productielocaties | Compagnie Générale des Biocides (CGB) site 1 Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray Frankrijk |

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

| | |
|------------------------|---|
| Werkzame stof | Brodifacum |
| Naam van de fabrikant | PelGar International Limited |
| Adres van de fabrikant | Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Hampshire Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland |
| Productielocaties | PelGar International Limited site 1 Prazska 280 02 Kolin Tsjechië |

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

| Triviale naam | IUPAC-naam | Functie | CAS-nummer | EG-nummer | Gehalte (%) |
|---------------|---|---------------|------------|-----------|---------------|
| Brodifacum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | werkzame stof | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,004 % (m/m) |

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

| | |
|--------------------------|--|
| Gevarenaanduidingen | H373: Kan schade aan organen blood veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling oral. H360D: Kan het ongeboren kind schaden. |
| Veiligheidsaanbevelingen | P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260: Stof niet inademen. P280: Draag Beschermende handschoenen. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P405: Achter slot bewaren. P501: {0:....:Inhoud Verpakking} afvoeren naar {1:....}. |

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. Huismuizen – professionals – binnen

| | |
|---|---|
| Productsoort | PT14: Rodenticiden |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant voor rodenticiden |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen |
| Toepassingsgebied(en) | gebruik binnen |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: 10 g lokaas per aasstation, elke 5m (geringe plaag) of elke 3m (grote plaag) Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Muizen Geringe plaag: 10g lokaas per aasstation elke 5m Grote plaag: 10g lokaas per aasstation elke 3m |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg Hoeveelheid lokaas in een zakje: 10g Verpakkingsmateriaal en Verpakkingsgrootte: Emmer: (PP,PE) 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartonnen doos met PE-binnenvoering 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) PP Patronen: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Oververpakking - Kartonnen doos met verpakkingen van: 50 patronen van 50g, 25 patronen van 100g, 20 patronen van 150g, 15 patronen van 200g, 10 patronen van 250g, 12 patronen |

| |
|--|
| van 250g, 18 patronen van 250g, 10 patronen van 260g, 12 patronen van 260g, 18 patronen van 260g, 10 patronen van 270g, 12 patronen van 270g, 18 patronen van 270g, 10 patronen van 280g, 12 patronen van 280g, 18 patronen van 280g, 10 patronen van 310g, 12 patronen van 310g, 18 patronen van 310g of 5 patronen van 500g. |
|--|

| |
|---|
| Lokaasdoos (PP,PS,PVC): 2*10g of 3*10g in een kartonnen doos van 2.5 kg, 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg en 5 kg |
|---|

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 2 tot 3 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

/

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer aasstations dicht bij afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. Ratten – professionals – binnen

| | |
|---|---|
| Productsoort | PT14: Rodenticiden |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant voor rodenticiden |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen |
| Toepassingsgebied(en) | gebruik binnen |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: 60 g lokaas per aasstation, elke 10m (geringe plaag) of elke 5m (grote plaag) Aantal en timing van de toepassing: Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg Hoeveelheid lokaas in een zakje: 10g Verpakkingsmateriaal en Verpakkingsgrootte: Emmer: (PP,PE) 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartonnen doos met PE-binnenvoering 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) PP Patronen: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Oververpakking - Kartonnen doos met verpakkingen van: 50 patronen van 50g, 25 patronen van 100g, 20 patronen van 150g, 15 patronen van 200g, 10 patronen van 250g, 12 patronen |

| |
|--|
| van 250g, 18 patronen van 250g, 10 patronen van 260g, 12 patronen van 260g, 18 patronen van 260g, 10 patronen van 270g, 12 patronen van 270g, 18 patronen van 270g, 10 patronen van 280g, 12 patronen van 280g, 18 patronen van 280g, 10 patronen van 310g, 12 patronen van 310g, 18 patronen van 310g of 5 patronen van 500g. |
|--|

| |
|---|
| Lokaasdoos (PP,PS,PVC): 2*10g of 3*10g in een kartonnen doos van 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg en 5 kg |
|---|

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Aan het begin van de behandeling moeten de lokaasdozen tenminste iedere 5 tot 7 dagen worden bezocht en daarna minstens eenmaal per week, teneinde na te gaan of het lokaas wordt aanvaard, de lokdozen intact zijn en om dode knaagdieren te verwijderen. Vul het lokaas aan wanneer dat nodig is.

- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

/

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer aasstations dicht bij afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. Huismuizen en/of ratten – professionals – buiten rond gebouwen

| | |
|---|--|
| Productsoort | PT14: Rodenticiden |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant voor rodenticiden |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen |
| Toepassingsgebied(en) | gebruik buiten Buiten rond gebouwen |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: - Voor ratten: 60 g lokaas per lokaaskist, elke 10m (geringe plaag) of elke 5m (grote plaag) - Voor muizen: 10 g lokaas per lokaaskist, elke 5m (geringe plaag) of elke 3m (grote plaag) Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Muizen Geringe plaag: 10g lokaas per aasstation elke 5m Grote plaag: 10g lokaas per aasstation elke 3m Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg Hoeveelheid lokaas in een zakje: 10g Verpakkingsmateriaal en Verpakkingsgrootte: Emmer: (PP,PE) 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartonnen doos met PE-binnenvoering |

10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

PP Patronen: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g

Oververpakking - Kartonnen doos met verpakkingen van: 50 patronen van 50g, 25 patronen van 100g, 20 patronen van 150g, 15 patronen van 200g, 10 patronen van 250g, 12 patronen van 250g, 18 patronen van 250g, 10 patronen van 260g, 12 patronen van 260g, 18 patronen van 260g, 10 patronen van 270g, 12 patronen van 270g, 18 patronen van 270g, 10 patronen van 280g, 12 patronen van 280g, 18 patronen van 280g, 10 patronen van 310g, 12 patronen van 310g, 18 patronen van 310g of 5 patronen van 500g.

Lokaasdoos (PP,PS,PVC): 2*10g of 3*10g in een kartonnen doos van 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg en 5 kg

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

- De aasstations dienen [voor muizen – aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen] [voor ratten – pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling] te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.

- Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Dit product niet direct in de hollen toepassen.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer aasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. Huismuizen en/of ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – binnen

| | |
|---|--|
| Productsoort | PT14: Rodenticiden |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant voor rodenticiden |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen |
| Toepassingsgebied(en) | gebruik binnen |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations of overdekt lokpunt |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: - Voor ratten: 60 g lokaas per lokaaskist, elke 10m (geringe plaag) of elke 5m (grote plaag) - Voor muizen: 10 g lokaas per lokaaskist, elke 5m (geringe plaag) of elke 3m (grote plaag) Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Muizen Geringe plaag: 10g lokaas per aasstation elke 5m Grote plaag: 10g lokaas per aasstation elke 3m Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m Gepulseerde lokaas - Muizen Geringe plaag: 10g lokaas per aasstation elke 5m Grote plaag: 10g lokaas per aasstation elke 3m Ratten |

| | |
|---|---|
| | Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | <p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg Hoeveelheid lokaas in een zakje: 10g Verpakkingsmateriaal en Verpakkingsgrootte:</p> <p>Emmer: (PP,PE) 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p> <p>Kartonnen doos met PE-binnenvoering 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p> <p>PP Patronen: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Oververpakking - Kartonnen doos met verpakkingen van: 50 patronen van 50g, 25 patronen van 100g, 20 patronen van 150g, 15 patronen van 200g, 10 patronen van 250g, 12 patronen van 250g, 18 patronen van 250g, 10 patronen van 260g, 12 patronen van 260g, 18 patronen van 260g, 10 patronen van 270g, 12 patronen van 270g, 18 patronen van 270g, 10 patronen van 280g, 12 patronen van 280g, 18 patronen van 280g, 10 patronen van 310g, 12 patronen van 310g, 18 patronen van 310g ou 5 patronen van 500g.</p> <p>Lokaasdoos (PP,PS,PVC): 2*10g of 3*10g in een kartonnen doos van 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg en 5 kg</p> |

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

- Gepulseerde lokaasbehandelingen: Vervang gegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen.

Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren. [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.
- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer aasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5. Muizen en/of ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – buiten rond gebouwen

| | |
|--------------|--------------------|
| Productsoort | PT14: Rodenticiden |
|--------------|--------------------|

| | |
|---|---|
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant voor rodenticiden |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: overig: Huismuis Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen |
| Toepassingsgebied(en) | gebruik buiten Buiten rond gebouwen |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations, of overdekt lokpunt of directe toepassing van kant-en-klaar lokaas in het hol |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: - Voor ratten: 60 g lokaas per lokaaskist, 60-100 g lokaas per hol. . - Voor muizen: 10 g lokaas per lokaaskist. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Muizen Geringe plaag: 10g lokaas per aasstation elke 5m Grote plaag: 10g lokaas per aasstation elke 3m Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m In holen: 60-100g lokaas per hol Gepulseerde lokaas Muizen Geringe plaag: 10g lokaas per aasstation elke 5m Grote plaag: 10g lokaas per aasstation elke 3m Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m |

| | |
|---|---|
| | |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | <p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg Hoeveelheid lokaas in een zakje: 10g Verpakkingsmateriaal en Verpakkingsgrootte:</p> <p>Emmer: (PP,PE) 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p> <p>Kartonnen doos met PE-binnenvoering 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)</p> <p>PP Patronen: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g Oververpakking - Kartonnen doos met verpakkingen van: 50 patronen van 50g, 25 patronen van 100g, 20 patronen van 150g, 15 patronen van 200g, 10 patronen van 250g, 12 patronen van 250g, 18 patronen van 250g, 10 patronen van 260g, 12 patronen van 260g, 18 patronen van 260g, 10 patronen van 270g, 12 patronen van 270g, 18 patronen van 270g, 10 patronen van 280g, 12 patronen van 280g, 18 patronen van 280g, 10 patronen van 310g, 12 patronen van 310g, 18 patronen van 310g of 5 patronen van 500g.</p> <p>Lokaasdoos (PP,PS,PVC): 2*10g of 3*10g in een kartonnen doos van 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg en 5 kg</p> |

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- Gepulseerde lokaasbehandelingen: Vervang gegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen.

Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren. [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt. Bedek of blokkeer de ingangen van holen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooit en verspild wordt.

[Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

In hopen : Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt.

Bedek of blokkeer de ingangen van hopen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooit en verspild wordt.

[Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].

- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (hopen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6. Ratten – gebruik gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid – Open gebieden buiten & vuilstortplaatsen

| | |
|---|---|
| Productsoort | PT14: Rodenticiden |
| Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik | Niet relevant voor rodenticiden |
| Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium) | Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: overig: Bruine rat Ontwikkelingsstadia: overig: Adulten en Juvenilen |
| Toepassingsgebied(en) | gebruik buiten overig: Other Open gebieden buiten Vuilstortplaatsen buiten |
| Toepassingsmethode(n) | Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas te gebruiken in verzegelde aasstations, of overdekt lokpunt of directe toepassing van kant-en-klaar lokaas in het hol |
| Dosering(en) en frequentie | Toe te passen dosis: Voor ratten: 60 g lokaas per lokaaskist, elke 10m (geringe plaag) of elke 5m (grote plaag), of 60-100 g lokaas per hol. Verdunning (%): 0 Aantal en timing van de toepassing: Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m In hollen: 60-100g lokaas per hol Gepulseerde lokaas - Ratten Geringe plaag: 60g lokaas per aasstation elke 10m Grote plaag: 60g lokaas per aasstation elke 5m |
| Categorie/categorieën gebruikers | professionele gebruiker |
| Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal | Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg Hoeveelheid lokaas in een zakje: 10g Verpakkingsmateriaal en Verpakkingsgrootte: Emmer: (PP,PE) 10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10) Kartonnen doos met PE-binnenvoering |

10 g: 3 kg (300*10), 3.5 kg (350*10), 4 kg (400*10), 4.5 kg (450*10), 5 kg (500*10), 5.5 kg (550*10), 6 kg (600*10), 6.5 kg (650*10), 7 kg (700*10), 7.5 kg (750*10), 8 kg (800*10), 8.5 kg (850*10), 9 kg (900*10), 9.5 kg (950*10), 10 kg (1000*10)

PP Patronen: 50 g, 100g, 150g, 200g, 250g, 260g, 270g, 280g, 310g, 500g

Oververpakking - Kartonnen doos met verpakkingen van: 50 patronen van 50g, 25 patronen van 100g, 20 patronen van 150g, 15 patronen van 200g, 10 patronen van 250g, 12 patronen van 250g, 18 patronen van 250g, 10 patronen van 260g, 12 patronen van 260g, 18 patronen van 260g, 10 patronen van 270g, 12 patronen van 270g, 18 patronen van 270g, 10 patronen van 280g, 12 patronen van 280g, 18 patronen van 280g, 10 patronen van 310g, 12 patronen van 310g, 18 patronen van 310g of 5 patronen van 500g.

Lokaasdoos (PP,PS,PVC): 2*10g of 3*10g in een kartonnen doos van 3 kg, 3.5 kg, 4 kg, 4.5 kg en 5 kg

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden (bijv. regen, sneeuw, ...). Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.

- Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.

- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

Gepulseerde lokaasbehandelingen: Vervang gegeten lokaas pas na drie dagen en dan met tussenpozen van maximaal zeven dagen.

Verzamel eventueel gemorst lokaas en dode knaagdieren. - [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt. Bedek of blokkeer de ingangen van holen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooid en verspild wordt.

[Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

In holen : Lokaas moet zo worden geplaatst dat de blootstelling van niet-doelsoorten en kinderen tot een minimum wordt beperkt.

Bedek of blokkeer de ingangen van holen die van lokaas zijn voorzien om het risico te verminderen dat lokaas eruit gegooid en verspild wordt.

[Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

/

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

/

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

PROFESSIONALS

Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.

- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
 - Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
 - Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
 - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
 - Aasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).
 - Waar mogelijk moeten aasstations aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.
 - Aasstations moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
 - [...] Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.
 - Het lokaas dient te worden vastgemaakt zodat het niet kan worden weggesleept van het aasstation.
 - Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
 - Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.
- [Indien vereist door de risicobeoordeling:
- Draag tijdens het hanteren van het product beschermende handschoenen die bestand zijn tegen chemische stoffen (materiaal van de handschoenen nader te bepalen door de vergunninghouder in de productinformatie) Specificeer indien relevant eventuele andere persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. veiligheidsbril of masker) die vereist zijn bij het hanteren van het product]
 - Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van het product.
 - Als de inname van het lokaas relatief laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van aasstations naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
 - Als het lokaas na een behandelperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en er geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdünnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdünnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve bestrijdingsmaatregel.
 - Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.
- 'Lokaas specifieke' gebruiksaanwijzingen:
- Lokaas in sachets: Maak de sachets die het lokaas bevatten niet open.

Pasta:

- a) [Indien relevant] Plaats lokaaspasta met een voldoende lange applicator (spatel) om blootstelling van de handen te verminderen. Steek uw hand niet in de emmer.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

b) [Indien relevant] Specificeer hoe de hulpmiddelen (bijv. spatel) dienen te worden gereinigd en hoe contact met resten van het lokaas kan worden vermeden.

GETRAINDE PROFESSIONALS :

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat bereikbaar is voor knaagdieren (bijvoorbeeld gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem (IPM), met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden
- Het product dient te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, voerplaatsen, hopen, nesten enz.).
- Waar mogelijk moeten de lokaaskisten aan de grond of aan andere structuren worden vastgemaakt.
- Lokaaskisten moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat ze rodenticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).

- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.

- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.
- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Verwijderd houden van eten, drinken en diervoeders, alsmede van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die in contact staan hiermee.
- Draag beschermende handschoenen bij het uitvoeren van alle taken waarbij contact met het product mogelijk is (EN374).

- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product. Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.

- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.

- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

- Zakjes met het lokaas niet openen.

- Pasta:

o a) [indien van toepassing] plaats lokaaspasta met een voldoende lange applicator (spatel) om blootstelling van de handen te minimaliseren – Steek uw hand niet in de emmer.

o b) [indien van toepassing] Specificeer hoe de hulpmiddelen (bijvoorbeeld de spatel) dienen te worden gereinigd en hoe contact met resten van het lokaas kan worden vermeden.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

PROFESSIONALS

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".

- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten. Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan.

- De producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en van de werkzaamheid van de behandeling.

- Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdunnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat:

- Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals").

- het product dient te worden gebruikt in daarvoor geschikte verzegelde aasstations (bijv. "uitsluitend gebruiken in verzegelde aasstations");

- gebruikers aasstations passend dienen te voorzien van de informatie die in rubriek 5.3 van de samenvatting van de productkenmerken staat (bijv. "etiketteer aasstations conform de productaanbevelingen").

- Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.

- Was de aasstations niet met water tussen behandelingen door.

- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten.

GETRAINDE PROFESSIONALS :

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".

- In de productinformatie (d.w.z. het etiket en/of de bijsluiter) moet duidelijk worden vermeld dat het product enkel gebruikt mag worden door opgeleide professionele gebruikers die in het bezit zijn van een certificering die aantoont dat ze aan de vereiste opleidingsvereisten voldoen (bijv. "enkel voor opgeleide professionele gebruikers").

- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.

- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.

- Gebruik met het oog op resistentie management geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

- Reinig tussen het toepassen de lokaaskisten niet met water.

- Verwijder dode knaagdieren in overeenstemming met lokale vereisten [Dode knaagdieren moeten afgevoerd en vernietigd worden door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen (mogelijk et enige vertraging) symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.

- Tegengif: vitamine K1 uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.

- In geval van:

- blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.

-
- blootstelling van de ogen: ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden tenminste 10 minuten open houden.
 - blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.
 - Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "PROPASTA of BE2013-0035"; "Brodifacoum" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingeninformatiecentrum (070 245 245)".
 - Gevaarlijk voor dieren in het wild.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Bij elke controle en wanneer de opname van lokaas is gestopt, de resten van het lokaas verzamelen en veilig verwijderen als gevaarlijk afval naar geschikte afvalverzamelpunten.

Gebruik van handschoenen wordt aanbevolen.

Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Houdbaarheid: 24 maanden

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.

Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdieren geen toegang hebben.

In originele verpakking houden.

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

- Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van het lokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen.
- Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.
- De P-zinnen, zoals weergegeven op deze samenvatting van de productkenmerken, bevatten enkele fouten die niet aangepast kunnen worden. De correcte zinnen zijn: P501 - Inhoud/verpakking afvoeren in overeenstemming met geldende nationale/regionale regelgeving.