

SL

PRILOGA

POVZETEK ZNAČILNOSTI BIOCIDNEGA PROIZVODA

Murin Pasta Extreme

Vrsta(-e) proizvoda(-ov)

Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi

Številka dovoljenja: SI-0015773-0000

Številka proizvoda v R4BP: SI-0015773-0000

Poglavje 1. UPRAVNE INFORMACIJE

1.1. Trgovska imena proizvoda

| | |
|--------------|---------------------|
| Trgovsko ime | Murin Pasta Extreme |
|--------------|---------------------|

1.2. Imetnik dovoljenja

| | | |
|-------------------------------------|--------|---|
| Ime in naslov imetnika dovoljenja | Ime | Vebi Istituto Biochimico s.r.l. |
| | Naslov | via Desman, 43 35010 Borgoricco Italija |
| Številka dovoljenja | | SI-0015773-0000 |
| Številka proizvoda v R4BP | | SI-0015773-0000 |
| Datum dovoljenja | | 05/06/2018 |
| Datum izteka veljavnosti dovoljenja | | 31/12/2026 |

1.3. Proizvajalec(-ci) proizvoda

| | |
|--------------------------|--|
| Ime proizvajalca | Vebi Istituto Biochimico s.r.l. |
| Naslov proizvajalca | via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italija |
| Kraj proizvodnih obratov | via Desman, 43 35010 Borgoricco (PD) Italija |

1.4. Proizvajalec(-ci) aktivne(-ih) snovi

| | |
|--------------------------|---|
| Aktivna snov | Brodifakum |
| Ime proizvajalca | Dr Tezza s.r.l. |
| Naslov proizvajalca | via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija |
| Kraj proizvodnih obratov | via Tre Ponti, 22 37050 Santa Maria di Zevio (VR) Italija |

Poglavje 2. SESTAVA IN FORMULACIJA PROIZVODA

2.1. Kakovostne in količinske informacije o sestavi proizvoda

| Splošno ime | Ime IUPAC | Funkcija | Številka CAS | številka EC | Vsebnost (%) |
|-------------|---|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Brodifakum | 3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin | aktivna snov | 56073-10-0 | 259-980-5 | 0,0025 |

2.2. Vrsta(-e) formulacije

PA Pasta

Poglavje 3. STAVKI O NEVARNOSTI IN PREVIDNOSTNI STAVKI

| | |
|---------------------|---|
| Stavki o nevarnosti | H373: Lahko škoduje organom (kri) pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti {1:navesti način izpostavljenosti, če je prepričljivo dokazano, da noben drug način izpostavljenosti ne povzroča takšne nevarnosti:}. |
| Previdnostni stavki | P103: Pozorno preberite in upoštevajte vsa navodila. P270: Ne jesti, piti ali kaditi med uporabo tega izdelka. P273: Preprečiti sproščanje v okolje. P301 + P310: PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite zdravnika. P102: Hraniti zunaj dosega otrok. P501: Odstraniti vsebino v skladu z nacionalnimi predpisi.. |

Poglavje 4. DOVOLJENA(-E) UPORABA(-E)

4.1. Opis uporabe

Tabela 1. splošna uporaba

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Ni pomembno za rodenticide |
| Ciljni organizem(-i) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Rattus norvegicus Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Rattus rattus Splošno ime: roof rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: Mus musculus Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči |
| Področje(-a) uporabe | uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem V in okoli zgradb miš: V notranjih prostorih podgane V notranjih prostorih in zunaj okrog stavb |
| Način(-i) uporabe | Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki |
| Odmarki in pogostost uporabe | Odmerek: podgane 150 g, miš 50 g Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: miš Proizvodi v obliki vabe: 50g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov. V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 2 metrov. |

| | |
|--------------------------------|--|
| | <p>miš Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p> <p>podgane: Proizvodi v obliki vabe: 150g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 10 metrov.</p> <p>V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 5 metrov.</p> <p>podgane: Postaje za nastavljanje vab pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p> |
| Skupina(-e) uporabnikov | splošna uporaba (nepoklicni uporabniki) |
| Velikosti in material embalaže | <p>Murin Pasta Extreme je na voljo v dveh različnih formatih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odmerki paste v ovoju iz jedilnega papirja po 10 do 15 g na vabo 2 plastične posodice z odmerki po 25- 30- 40- 50- 75 -80 -100 g <p>Velikost embalaže: od 50 do 150 g</p> <p>Material pakiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovoj, plastika: koekstrudirana / HDPE / polietilen - pločevinka, papir, lepenka; - posodica, papir, lepenka z vsebovanim ovojem koekstrudirana / HDPE / polietilen - plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 |

4.1.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Postaje namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju.
- Zamenjajte vabe v postaji, ki so bile poškodovane zaradi vode ali onesnažene z umazanijo.
- Pred uporabo proizvoda preberite in upoštevajte navodila za uporabo in druge ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Pred uporabo rodenticidov razmislite o nekemičnih metodah nadzora (npr. pasti).
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Poleg tega pred nastavljanjem vabe napadeno območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
- Postaje postavite v neposredno bližino območja, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).

-
- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.
 - Ne odpirajte vrečk z vabo
 - Če uporabljate izdelek v posodicah z enkratnim odmerkom, morate pred namestitvijo vabe z zgornje strani posodice odstraniti zaščitno folijo.

- Postaje namestite izven dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Postaje namestite stran od hrane, pijače in krme za živali ter od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Postaj ne nameščajte blizu sistemov za odtok vode, kjer bi lahko prišle v stik z vodo.
 - Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.
- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.

4.1.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.1.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.
- Antikoagulacijskih rodenticidov ne uporabljajte kot stalne vabe (npr. za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti).
- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da:
 - se mora proizvod uporabljati v postajah, zaščitnih pred zunanjimi dejavniki;
 - morajo uporabniki pravilno označiti postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti proizvoda (npr. označevanje postaj v skladu s priporočili za proizvod).
 - Z uporabo tega proizvoda naj bi glodavce odstranili v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda povprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev (DDD).
 - Poiščite in odstranite poginule glodavce med obdobjem učinkovanja vsaj tako pogosto, kot preverjate postaje.
 - Poginule glodavce zapakirajte v dvojno plastično vrečko in odstranite kot komunalni odpadek.

4.1.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.
 - Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.
 - V primeru:
 - izpostavljenosti kože; umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.
 - izpostavljenosti oči; izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.
 - oralne izpostavljenosti; previdno izperite usta z vodo.
- Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta.
Ne izzivajte bruhanja.
Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja.

Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; Murin pasta extreme in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“.

- Nevarno za divje živali.

4.1.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo.
- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

4.1.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

4.2. Opis uporabe

Tabela 2. Poklicni uporabniki

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Ni pomembno za rodenticide |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli |
| | Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči |
| | Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: roof rat Razvojna faza: odrasli |
| | Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: roof rat Razvojna faza: mladiči |
| | Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli |
| | Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči |
| Področje(-a) uporabe | uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem |

| | |
|--------------------------------|---|
| | V in okoli zgradb miš: V notranjih prostorih podgane V notranjih prostorih i Zunaj okrog stavb |
| Način(-i) uporabe | Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki |
| Odmerki in pogostost uporabe | Odmerek: podgane 200 g, miš 50 g Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: miš Proizvodi v obliki vabe: 50g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov. V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 2 metrov. miš Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo. podgane: Proizvodi v obliki vabe: 200g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 10 metrov. V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 5 metrov. podgane: Postaje za nastavljanje vab pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo. |
| Skupina(-e) uporabnikov | industrijska uporaba ; strokovnjak |
| Velikosti in material embalaže | Murin Pasta Extreme je na voljo v dveh različnih formatih 1. odmerki paste v ovoju iz jedilnega papirja po 10 do 15 g na vabo 2 plastične posodice z odmerki po 25- 30- 40- 50- 75 -80 -100 g Velikost embalaže: od 1,5 do 25 g V primeru embalaže, težje od 10 kg, so posamezni embalažni ovitki ločeno zapakirani največja velikost vreč 5 ali 10 kg Material pakiranja: - ovoj, plastika: koekstrudirana / HDPE / polietilen - pločevinka, papir, lepenka; - posodica, papir, lepenka z vsebovanim ovojem koekstrudirana / HDPE / polietilen |

- | | |
|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none">- plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45- plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60- posodica: HDPE |
|--|--|

4.2.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.

- Odstranite hrano, ki je glodavcem na doseg (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Poleg tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.
- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- Postaje za nastavljanje vab postavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).

- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.

- Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).

- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.

- Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvleči iz postaje za nastavljanje vab.

- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.

- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.

- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije

- Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.

- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.

- Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.

Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid.

Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

- Ob koncu obdobja učinkovanja odstranite preostalo vabo ali postaje za nastavljanje vab.

- ne segajte v vedro.

- Če uporabljate izdelek v posodicah z enkratnim odmerkom, morate pred namestitvijo vabe z zgornje strani posodice odstraniti zaščitno folijo.

4.2.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.2.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe (npr. uporabnike območja učinkovanja vabe in okolice) o tretiranju za nadzor glodavcev

- Za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve iščite in odstranjujte poginule glodavce dovolj pogosto med obdobjem tretiranja (npr. najmanj dvakrat tedensko).

- Proizvoda ne smete uporabljati več kot 35 dni brez evalvacije stanja napada škodljivcev in učinkovitosti proizvoda.

- Ne uporabljajte antikoagulacijskih rodenticidov kot stalne vabe za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

- Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno, da: proizvod ni na voljo za splošno uporabo (npr. „samo za poklicne uporabnike“);

- se mora proizvod uporabljati v postajah, ki so varne pred zunanjimi dejavniki;

- morajo uporabniki pravilno označiti postaje z informacijami iz poglavja 5.3 povzetka značilnosti proizvoda (npr. označevanje postaj za nastavljanje vab v skladu s priporočili za proizvod).

- Z uporabo tega proizvoda se lahko glodavcev znebite v 35 dneh. Iz informacij o proizvodu (tj. etiketa in/ali letak) mora biti jasno razvidno priporočilo, da mora uporabnik v primeru pričakovanega pomanjkanja učinkovitosti do konca obdobja učinkovanja (tj. aktivnost glodavcev je še vedno prisotna) pri dobavitelju proizvoda p ovprašati za nasvet ali poklicati službo za zatiranje škodljivcev.

- Med tretiranjem ne umivajte postaj za nastavljanje vab z vodo.

- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo

4.2.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje

- V primeru:

- izpostavljenosti kože, umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- izpostavljenosti oči, izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.

- oralne izpostavljenosti, previdno izperite usta z vodo.

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta.

Ne izzivajte bruhanja.

Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite embalažo ali etiketo proizvoda.

Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; Murin pasta extreme in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.“

- Nevarno za divje živali.

4.2.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Po končanem obdobju tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo s področja ravnanja z odpadki.

- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

4.2.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.

- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

- Rok uporabnosti: 2 leta

4.3. Opis uporabe

Tabela 3. Usposobljeni poklicni uporabniki

| | |
|--|--|
| Vrsta proizvoda | Vrsta proizvoda 14 (PT14): Rodenticidi |
| Natančen opis dovoljene uporabe, kjer je to potrebno | Ni pomembno za rodenticide |
| Ciljni organizem(-mi) (vključno z razvojno stopnjo) | Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: <i>Rattus norvegicus</i> Splošno ime: brown rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: roof rat Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: <i>Rattus rattus</i> Splošno ime: roof rat Razvojna faza: mladiči Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: odrasli Znanstveno ime: <i>Mus musculus</i> Splošno ime: house mouse Razvojna faza: mladiči |
| Področje(-a) uporabe | uporaba v zaprtih prostorih uporaba na prostem hišne miši in Odprta zunanja območja: V notranjih prostorih in Zunaj okrog stavb podgane: Odprta zunanja območja podgane: Zunanja odlagališča odpadkov |
| Način(-i) uporabe | Metoda: Uporaba vabe Podroben opis: Vaba, pripravljena za uporabo, namenjena uporabi v postajah, ki so verne pred zunanjimi dejavniki vaba za takojšnjo uporabo, namestiti v pokrite in zaščitene pasti za vabo |
| Odmerki in pogostost uporabe | Odmerek: podgane 200 g, miš 50 g Redčenje (%): 0 Število in časovni raspored uporabe: |

| | |
|--------------------------------|---|
| | <p>miš Proizvodi v obliki vabe: 50g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 5 metrov.</p> <p>V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 2 metrov.</p> <p>miš Postaje pregledujte najmanj enkrat na dva do tri dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p> <p>podgane: proizvodi v obliki vabe: 200g vabe na postajo. Če je potrebnih več postaj, mora znašati najmanjša razdalja med postajami 10 metrov.</p> <p>V primeru visoke stopnje okuženosti nastavite vabe na medsebojni razdalji 5 metrov.</p> <p>podgane: Postaje za nastavljanje vab pregledujte najmanj enkrat na pet do sedem dni od začetka tretiranja in nato najmanj enkrat tedensko, da preverite, ali je bila vaba sprejeta in ali so postaje nedotaknjene, ter da odstranite poginule glodavce. Po potrebi ponovno napolnite vabo.</p> |
| Skupina(-e) uporabnikov | usposobljeni strokovnjak |
| Velikosti in material embalaže | <p>Murin Pasta Extreme je na voljo v dveh različnih formatih</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. odmerki paste v ovoju iz jedilnega papirja po 10 do 15 g na vabo 2. plastične posodice z odmerki po 25- 30- 40- 50- 75 -80 -100 g <p>Velikost embalaže: od 1,5 do 25 g</p> <p>V primeru embalaže, težje od 10 kg, so posamezni embalažni ovitki ločeno zapakirani Največja velikost vreč 5 ali 10 kg</p> <p>Material pakiranja:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ovoj, plastika: koekstrudirana / HDPE / polietilen - pločevinka, papir, lepenka; - posodica, papir, lepenka z vsebovanim ovojem koekstrudirana / HDPE / polietilen - plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE45 - plastični ovoj: PP MAT20 + PET MET 12 + PE60 - posodica: HDPE |

4.3.1. Uporaba – posebna navodila za uporabo

- Preden začnete uporabljati proizvod, preberite in upoštevajte navodila za uporabo proizvoda in druge informacije, ki so priložene proizvodu ali so na voljo na prodajnem mestu.
- Izvedite pregled prizadetega območja pred nastavljanjem vabe in oceno na mestu uporabe, da opredelite vrste glodavcev in njihova mesta aktivnosti ter da določite verjeten razlog in obseg napada škodljivcev.
- Odstranite hrano, ki je glodavcem na dosegu (npr. razsuto zrnje ali odpadki hrane). Poleg tega pred nastavljanjem vabe prizadetega območja ne čistite, saj to zmoti populacijo glodavcev in vabo težje sprejmejo.

- Proizvod nastavite v neposredno bližino območij, kjer je bila opažena aktivnost glodavcev (npr. poti premikanja, legla, krmišča, luknje, rovi itd.).

- Proizvod se sme uporabljati samo kot del celostnega sistema zatiranja škodljivcev, ki med drugim vključuje higienske ukrepe in, kjer je mogoče, fizične metode nadzora.

- Vabe je treba nastaviti tako, da se čim bolj zmanjša izpostavljenost neciljnih vrst in otrok.
- *Zavarujte vabo pred vremenskimi vplivi. Vabe namestite na območja, ki niso izpostavljena poplavljanju.*
- Pokrijte ali zablokirajte vhode v rove, kjer ste nastavili vabo, da zmanjšate tveganje, da jo žival zavrne in da se vaba raztrese.

- Kjer je mogoče, pritrdite postaje na tla ali druge strukture.

- Postaje za nastavljanje vab morajo vsebovati jasno oznako, da vsebujejo rodenticide in da jih ni dovoljeno premikati ali odpirati (za informacije, ki morajo biti navedene na etiketi, glejte poglavje 5.3).
- Kadar proizvod uporabljate na javnih območjih, morajo biti območja učinkovanja označena in v bližini vab mora biti obvestilo z razlago tveganja primarne ali sekundarne zastrupitve z antikoagulantom ter navedbo prvih ukrepov v primeru zastrupitve.

- Zamenjajte morebitne vabe v postajah, ki so bile poškodovane zaradi vode ali zamazane z umazanijo.

- Vaba mora biti pritrjena, da je ni možno odvreči iz postaje za nastavljanje vab.
- Proizvod namestite zunaj dosega otrok, ptic, hišnih in domačih živali ter drugih neciljnih živali.
- Proizvod namestite stran od hrane, pijače in krme za živali, in tudi stran od pripomočkov ali površin, ki so v stiku z njimi.
- Med rokovanjem s proizvodom nosite zaščitne rokavice, odporne na kemikalije

- Med uporabo proizvoda ne jejte, pijte ali kadite. Po uporabi proizvoda si umijte roke in kožo, ki je bila neposredno izpostavljena.

- Pogostost obiskov na območje učinkovanja je prepuščena presoji upravljavca, pri čemer mora upoštevati raziskavo, izvedeno ob začetku učinkovanja.
Ta pogostost mora biti v skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse.

- Če je zaužitje vabe relativno nizko glede na velikost napada škodljivcev, razmislite o premestitvi postaj za nastavljanje vab ali zamenjavi pripravka v vabi.
- Če se uživanje pripravka iz vab po obdobju učinkovanja 35 dni nadaljuje in ni opaziti zmanjšanja aktivnosti glodavcev, je treba ugotoviti verjeten razlog.
Če so bili drugi elementi izključeni, obstaja verjetnost, da so glodavci odporni, zato, kjer je mogoče, uporabite rodenticid, ki ni antikoagulacijski, ali močnejši antikoagulacijski rodenticid. Razmislite tudi o uporabi pasti kot alternativni ukrep nadzora.

- *Odstranite preostali proizvod ob koncu obdobja tretiranja*

- *V primeru uporabe v okviru sistema nastavljanja s prekinitvami* Zaužito vabo zamenjajte po treh dneh in nato v intervalih največ 7 dni. Odstranite morebitno raztreseno vabo in poginule glodavce.
- ne segajte v vedro.

- Če uporabljate izdelek v posodicah z enkratnim odmerkom, morate pred namestitvijo vabe z zgornje strani posodice odstraniti zaščitno folijo.

4.3.2. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

4.3.3. Uporaba – posebni ukrepi za zmanjšanje tveganja

- Kjer je mogoče, pred začetkom tretiranja obvestite morebitne prisotne osebe o tretiranju za nadzor glodavcev

- Upoštevajte preventivne ukrepe nadzora (v čim večji meri zamašite luknje, odstranite morebitno hrano in pijačo), da se izboljša zaužitje proizvoda in zmanjša verjetnost ponovne invazije.

- V skladu s priporočili iz ustreznega kodeksa najboljše prakse za zmanjšanje tveganja sekundarne zastrupitve med tretiranjem dovolj pogosto pregledajte tretirano območje in poginule glodavce odstranite.

- Vabe smete nameščati samo v kanalizacijske sisteme, ki so povezani s čistilnimi napravami.

- Ne uporabljajte na območjih, na katerih obstaja sum za odpornost na aktivno učinkovino.

- Iz informacij o proizvodu (tj. etikete in/ali letaka) mora biti jasno razvidno, da se proizvod lahko dobavlja le usposobljenim poklicnim uporabnikom s potrdilom, ki dokazuje skladnost z veljavnimi zahtevami usposabljanja (npr. „samo za usposobljene poklicne uporabnike“).

- Proizvoda ne uporabljajte kot stalno vabo za preprečevanje napada glodavcev ali odkrivanje njihove aktivnosti.

- Za namene obvladovanja odpornosti ne menjajte različnih antikoagulantov s primerljivo ali šibkejšo učinkovitostjo.

Pri izmenjujoči uporabi raje uporabite neantikoagulacijski rodenticid (če je na voljo) ali močnejši antikoagulant.

- Med posameznimi uporabami posodic za vabo ali pripomočkov, ki se uporabljajo na pokritih ali zaščitnih mestih za vabo, ne umivajte z vodo.

- Odstranite poginule glodavce v skladu z nacionalno zakonodajo

4.3.4. Kjer je specifična uporaba, možni direktni ali indirektni učinki, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu in dlesni.

V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.

- V primeru:

- izpostavljenosti kože umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- izpostavljenosti oči izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.

- oralne izpostavljenosti previdno izperite usta z vodo.

Nezavestni osebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Murin Pasta Extreme in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.
- Nevarno za divje živali.

4.3.5. Kjer je specifična uporaba, navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Ob koncu tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo

- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

4.3.6. Kjer je specifična uporaba, pogoji skladiščenja in rok uporabnosti proizvoda v običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.

- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.

- Rok uporabe: 2 leta.

Poglavje 5. SPLOŠNA NAVODILA ZA UPORABO¹

5.1. Navodila za uporabo

se obrnite na pooblaščen službe

5.2. Ukrepi za zmanjšanje tveganja

se obrnite na pooblaščen službe

5.3. Značilnosti verjetnih direktnih ali indirektnih učinkov, navodila za prvo pomoč in nujni ukrepi za zaščito okolja

- Pri nameščanju postaj blizu sistemov za odvajanje vode se prepričajte, da vaba ne more priti v stik z vodo.

- Ta proizvod vsebuje antikoagulant. Če ga zaužijete, se lahko, tudi z zakasnitvijo, pojavijo simptomi, ki lahko vključujejo krvavitve iz nosu

in dlesni. V resnih primerih lahko nastanejo podplutbe ali se pojavi kri v blatu ali urinu.

- Antidot: Vitamin K1, ki ga sme dajati samo zdravstveno/veterinarsko osebje.

- V primeru:

- izpostavljenosti kože umijte kožo z vodo in nato z vodo in milom.

- izpostavljenosti oči izpirajte oči s tekočino za izpiranje oči ali vodo, veke držite odprte najmanj 10 minut.

- oralne izpostavljenosti previdno izperite usta z vodo.

Nezavestniosebi ne dajajte ničesar v usta. Ne izzivajte bruhanja. Če proizvod pogoltnete, nemudoma poiščite zdravniško pomoč in pokažite škatlo ali etiketo proizvoda. Če proizvod zaužije žival, se obrnite na veterinarja

- Postaje morajo biti označene z naslednjimi informacijami: „Ne premikajte in ne odpirajte.“; „Vsebuje rodenticid.“; „Murin Pasta Extreme in številka odobritve“; „aktivne snovi“ in „V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč ali pokličite 112.

- Nevarno za divje živali.

5.4. Navodila za varno odstranjevanje proizvoda in njegove embalaže

- Ob koncu tretiranja odstranite nezaužito vabo in embalažo v skladu z nacionalno zakonodajo.

- Priporočljivo je, da uporabljate rokavice.

¹Navodila za uporabo, ukrepi za zmanjšanje tveganj in druge smernice za uporabo iz tega oddelka veljajo za vse dovoljene uporabe.

5.5. Pogoji za shranjevanje in rok uporabnosti proizvoda pri običajnih pogojih skladiščenja

- Hranite na suhem, hladnem in dobro prezračevanem mestu. Hranite v zaprti posodi stran od direktne sončne svetlobe.
- Hranite na mestih, kamor nimajo dostopa otroci, ptice, hišne in domače živali.
- Rok uporabe: 2 leta.

Poglavje 6. DRUGE INFORMACIJE

- Zaradi zakasnitve delovanja se učinkovitost antikoagulacijskih rodenticidov pokaže v obdobju od štiri do 10 dni od zaužitja vabe.
- Glodavci so lahko prenašalci bolezni. Ne dotikajte se poginulih glodavcev z golimi rokami, ampak pri njihovem odstranjevanju uporabite rokavice ali orodje, npr. kleščice.
- Ta proizvod vsebuje grenko snov in barvilo.