

PL

ZAŁĄCZNIK

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU BIOBÓJCZEGO

Product 1-4 - Quaron

Grupa produktowa

PT03: Higiena weterynaryjna

Numer zezwolenia: PL/2024/0646/MR/BPF 1-1

Numer zasobu w R4BP: PL-0030926-0004

Rozdział 1. INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

1.1. Nazwa(-y) handlowa(-e) produktu

Nazwa handlowa	Product 1-4 - Quaron
----------------	----------------------

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza pozwolenia	Nazwa	STOCKMEIER FRANCE SAS
	Adres	3 rue de la Buhotière 35091 RENNES Francja
Numer zezwolenia		PL/2024/0646/MR/BPF 1-1
<i>Numer zasobu w R4BP</i>		PL-0030926-0004
Data udzielenia zezwolenia		24/04/2024
Data ważności zezwolenia		19/09/2033

1.3. Producent(-ci) produktu

Nazwa producenta	QUARON SAS
Adres producenta	3 rue de la Buhotière – Saint-Jacques de la Lande - BP 89 152 F-35091 Rennes CEDEX 9 Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	QUARON SAS site 1 3 rue de la Buhotière F-35136 Saint-Jacques de la Lande France Francja QUARON SAS site 2 Rue des Criquiers F-60220 Formerie Francja

1.4. Producent(-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	L-(+)-lactic acid
Nazwa producenta	Jungbunzlauer S.A
Adres producenta	ZI Portuaire - BP 32 F-67390 Marcklosheim Francja
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Jungbunzlauer S.A site 1 Jungbunzlauer S.A - ZI Portuaire - BP 32 F-67390 Marcklosheim Francja

Substancja czynna	L-(+)-lactic acid
Nazwa producenta	Purac Bioquimica sa
Adres producenta	Gran Vial 19-25 08160 MONTMELÓ Hiszpania
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Purac Bioquimica sa site 1 Gran Vial 19-25 E-08160 MONTMELÓ Hiszpania

Substancja czynna	L-(+)-lactic acid
Nazwa producenta	Purac Bioquimica sa
Adres producenta	Gran Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Holandia
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Purac Bioquimica sa site 1 Gran Arkelsedijk 46 4206 AC Gorinchem Holandia

Rozdział 2. SKŁAD I POSTAĆ UŻYTKOWA PRODUKTU

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe dotyczące składu produktu

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer EC	Zawartość (%)
L-(+)-lactic acid		substancja czynna	79-33-4	201-196-2	10,26

2.2. Rodzaj(e) postaci użytkowej

XX Inne: produkt gotowy do użycia płyn (AL)

Rozdział 3. ZWROTY WSKAZUJĄCE RODZAJ ZAGROŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	H318: Powoduje poważne uszkodzenie oczu. EUH208: Zawiera Carvone and d-limonene. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	P280: Stosować ochronę oczu. P280: Stosować rękawice ochronne. P305+P351+P338: W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P310: Natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Rozdział 4. ZASTOSOWANIE(-A) OBJĘTE ZEZWOLENIEM

4.1. Opis zastosowań

Tabela 1. 4.1. Zastosowanie 1: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą ręcznego zanurzenia w płynie przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	inne: Wewnątrz pomieszczeń Gotowy do użycia produkt w formie płynu przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji strzyków zwierząt mlecznych Higiena weterynaryjna
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie Szczegółowy opis: Ręczne zanurzenie przed udojem oraz/lub po udoju
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: Dawka: Krowy i bawoły: 3 – 10 ml; Owce: 1,5 – 5 ml; Kozy: 2,5 – 6 ml. Częstotliwość stosowania: krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju. Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej.
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka (HDPE) o pojemności: 1 L; Kanister (HDPE) o pojemności: 5 L, 10 L, 20 L, 22 L; Beczka (HDPE) o pojemności: 60 L, 220 L; Kontener (HDPE) o pojemności: 1000 L.
---	--

4.1.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Czysty i suchy kubek zanurzeniowy o pojemności 300 ml napełnić ręcznie 225 ml gotowego do użycia produktu.

Kubek zanurzeniowy ścisnąć od 3 do 6 razy, aby płynny produkt uniósł się do 2/3 wysokości kubka.

Aplikować produkt poprzez ręczne zanurzanie strzyków zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem.

W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.1.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.1.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W czasie obchodzenia się z produktem, tj. w czasie napełniania, aplikowania oraz czyszczenia sprzętu, użytkownik profesjonalny musi nosić chemicznie odporne rękawice oraz okulary ochronne.

4.1.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.2. Opis zastosowań

Tabela 2. Zastosowanie 2: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą ręcznego zanurzania w pianie przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-

Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	<p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bacteria Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Yeasts Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Enveloped viruses Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bacteriophages (pre-milking only) Etap rozwoju: brak danych</p>
Obszar(y) zastosowania	<p>użytkowanie w pomieszczeniach</p> <p>Wewnątrz pomieszczeń. Gotowy do użycia produkt w formie piany przeznaczony do powierzchniowej dezynfekcji strzyków zwierząt mlecznych.</p>
Sposób(-oby) nanoszenia	<p>Metoda: System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie</p> <p>Szczegółowy opis: Ręczne zanurzenie przed udojem oraz/lub po udoju.</p>
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	<p>Stosowana dawka: -</p> <p>Rozcieńczenie (%): -</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji: Dawka: Krowy i bawoły: 3 – 10 ml; Owce: 1,5 – 5 ml; Kozy: 2,5 – 6 ml.</p> <p>Częstotliwość stosowania: krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju.</p> <p>Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej</p>
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1L HDPE Bottle 5L HDPE Jerrican 10L HDPE Jerrican 20L HDPE Jerrican 22L HDPE Jerrican 60L HDPE Drum 220L HDPE Drum 1000L HDPE Container

4.2.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Nacisnąć spust w celu napełnienia kubka zanurzeniowego płynnym produktem.

Aplikować produkt poprzez ręczne zanurzenie strzyków zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem.

W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.2.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.2.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W czasie obchodzenia się z produktem, tj. w czasie napełniania, aplikowania oraz czyszczenia sprzętu, użytkownik profesjonalny musi nosić chemicznie odporne rękawice oraz okulary ochronne

4.2.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.2.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.2.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.3. Opis zastosowań

Tabela 3. Zastosowanie 3: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą półautomatycznego zanurzenia w płynie przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Półautomatyczne zanurzenie przed udojem oraz/lub po udoju.
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakterie

	<p>Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych</p>
Obszar(y) zastosowania	<p>użytkowanie w pomieszczeniach</p> <p>Higiena weterynaryjna</p>
Sposób(-oby) nanoszenia	<p>Metoda: System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie</p> <p>Szczegółowy opis: Półautomatyczne zanurzenie przed udojem oraz/lub po udoju.</p>
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	<p>Stosowana dawka: -</p> <p>Rozcieńczenie (%): -</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji: Dawka: Krowy i bawoły: 3 – 10 ml; Owce: 1,5 – 5 ml; Kozy: 2,5 – 6 ml. Częstotliwość stosowania: krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju. Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej.</p>
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Butelka (HDPE) o pojemności: 1 L; Kanister (HDPE) o pojemności: 5 L, 10 L, 20 L, 22 L; Beczka (HDPE) o pojemności: 60 L, 220 L; Kontener (HDPE) o pojemności: 1000 L.</p>

4.3.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Podłączyć pojemnik do półautomatycznego urządzenia zanurzeniowego.

Nacisnąć spust w celu napełnienia kubka zanurzeniowego płynnym produktem.

Aplikować produkt poprzez ręczne zanurzenie strzyków zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem.

W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.3.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.3.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W czasie obchodzenia się z produktem, tj. w czasie napełniania, aplikowania oraz czyszczenia sprzętu, użytkownik profesjonalny musi nosić chemicznie odporne rękawice oraz okulary ochronne.

4.3.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.3.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.3.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.4. Opis zastosowań

Tabela 4. Zastosowanie 4: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą pół-automatycznego zanurzania w pianie przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakteria Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych

Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach Higiena weterynaryjna
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: System otwarty: krótkotrwałe zanurzenie Szczegółowy opis: Półautomatyczne zanurzenie przed udojem oraz/lub po udoju.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: Dawka: Krowy i bawoły: 3 – 10 ml; Owce: 1,5 – 5 ml; Kozy: 2,5 – 6 ml. Częstotliwość stosowania: krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju. Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej.
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	1L HDPE Bottle 5L HDPE Jerrican 10L HDPE Jerrican 20L HDPE Jerrican 22L HDPE Jerrican 60L HDPE Drum 220L HDPE Drum 1000L HDPE Container

4.4.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Podłączyć pojemnik do półautomatycznego urządzenia zanurzeniowego.

Nacisnąć spust w celu napełnienia kubka zanurzeniowego produktem w postaci piany.

Aplikować produkt poprzez ręczne zanurzenie strzyków zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem.

W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.4.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.4.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W czasie obchodzenia się z produktem, tj. w czasie napełniania, aplikowania oraz czyszczenia sprzętu, użytkownik profesjonalny musi nosić chemicznie odporne rękawice oraz okulary ochronne.

4.4.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
patrz sekcja 5.3

4.4.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
patrz sekcja 5.4

4.4.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania
patrz sekcja 5.5

4.5. Opis zastosowań

Tabela 5. Zastosowanie 5: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą ręcznego natrysku przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach Higiena weterynaryjna
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Ręczny natrysk przed udojem oraz/lub po udoju.
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): -

	<p>Liczba i harmonogram aplikacji:</p> <p>Dawka: krowy i bawoły: 6 – 20 ml; owce: 3 – 10 ml; kozy: 5 – 12 ml. Częstotliwość stosowania: krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju. Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej.</p>
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka (HDPE) o pojemności: 1 L; Kanister (HDPE) o pojemności: 5 L, 10 L, 20 L, 22 L; Beczka (HDPE) o pojemności: 60 L, 220 L; Kontener (HDPE) o pojemności: 1000 L.

4.5.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Napełnić ręcznie zbiornik zasobnikowy dostosowanego do adaptera spustowego będącego w dobrym stanie. Aplikować produkt na strzyki zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu poprzez naciśnięcie spustu od spryskiwacza.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem. W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut). Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.5.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.5.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W czasie obchodzenia się z produktem, tj. w czasie napełniania, aplikowania oraz czyszczenia sprzętu, użytkownik profesjonalny musi nosić chemicznie odporne rękawice oraz okulary ochronne. Osoba przebywająca w otoczeniu użytkownika profesjonalnego musi nosić takie same środki ochrony indywidualnej jak użytkownik profesjonalny.

4.5.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach
patrz sekcja 5.3

4.5.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania
patrz sekcja 5.4

4.5.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.6. Opis zastosowań

Tabela 6. Zastosowanie 6: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą półautomatycznego natrysku przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna	
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Non-medical teat disinfection	
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakterie Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych	
Obszar(y) zastosowania	użytkowanie w pomieszczeniach Higiena weterynaryjna	
Sposób(-oby) nanoszenia	Metoda: Natrysk Szczegółowy opis: Półautomatyczny natrysk przed udojem oraz/lub po udoju.	
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: <table border="1"><tr><td>Dawka: krowy i bawoły: 6 – 20 ml; owce: 3 – 10 ml; kozy: 5 – 12 ml. Częstotliwość stosowania:</td></tr></table>	Dawka: krowy i bawoły: 6 – 20 ml; owce: 3 – 10 ml; kozy: 5 – 12 ml. Częstotliwość stosowania:
Dawka: krowy i bawoły: 6 – 20 ml; owce: 3 – 10 ml; kozy: 5 – 12 ml. Częstotliwość stosowania:		

	<p>krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju. Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej.</p>
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka (HDPE) o pojemności: 1 L; Kanister (HDPE) o pojemności: 5 L, 10 L, 20 L, 22 L; Beczka (HDPE) o pojemności: 60 L, 220 L; Kontener (HDPE) o pojemności: 1000 L.

4.6.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Podłączyć pojemnik do półautomatycznego urządzenia natryskowego.

Aplikować produkt na strzykach zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu poprzez naciśnięcie spustu od spryskiwacza.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem.

W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.6.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.6.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

W czasie obchodzenia się z produktem, tj. w czasie napełniania, aplikowania oraz czyszczenia sprzętu, użytkownik profesjonalny musi nosić chemicznie odporne rękawice oraz okulary ochronne.

Osoba przebywająca w otoczeniu użytkownika profesjonalnego musi nosić takie same środki ochrony indywidualnej jak użytkownik profesjonalny.

4.6.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.6.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.6.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.7. Opis zastosowań

Tabela 7. Zastosowanie 7: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą automatycznego natrysku przy użyciu robota natryskowego przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	Non-medical teat disinfection
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	<p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakterie Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych</p>
Obszar(y) zastosowania	<p>użytkowanie w pomieszczeniach</p> <p>Higiena weterynaryjna</p>
Sposób(-oby) nanoszenia	<p>Metoda: Natrysk</p> <p>Szczegółowy opis: Automatyczny natrysk przy użyciu robota natryskowego przed udojem oraz/lub po udoju.</p>
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	<p>Stosowana dawka: -</p> <p>Rozcieńczenie (%): -</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Dawka: krowy i bawoły: 6 – 20 ml; owce: 3 – 10 ml; kozy: 5 – 12 ml. Częstotliwość stosowania: krowy i bawoły: 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 2 – 3 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju; owce i kozy: 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji przed udojem i/lub 1 – 2 razy dziennie w celu dezynfekcji po udoju. Czas kontaktu: 1 minuta w przypadku dezynfekcji przed udojem; 5 minut w przypadku dezynfekcji po udoju. Stosować w temperaturze pokojowej.</p> </div>

Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	Butelka (HDPE) o pojemności: 1 L; Kanister (HDPE) o pojemności: 5 L, 10 L, 20 L, 22 L; Beczka (HDPE) o pojemności: 60 L, 220 L; Kontener (HDPE) o pojemności: 1000 L.

4.7.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Podłączyć pojemnik do elementów robota natryskowego.

Aplikować produkt na strzykach zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu poprzez automatyczny natrysk.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem. W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.7.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.7.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Patrz sekcja 5.2

4.7.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz sekcja 5.3

4.7.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz sekcja 5.4

4.7.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz sekcja 5.5

4.8. Opis zastosowań

Tabela 8. Zastosowanie 8: Przedudojowa i/lub poudojowa dezynfekcja strzyków u zwierząt mlecznych metodą automatycznego natrysku przy użyciu robota udojowego przez użytkownika profesjonalnego

Grupa produktowa	PT03: Higiena weterynaryjna
------------------	-----------------------------

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego zezwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(y) (w tym etapy rozwoju)	<p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: Bakterie Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: drożdże Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: wirusy otoczkowe Etap rozwoju: brak danych</p> <p>Nazwa naukowa: brak danych Nazwa zwyczajowa: inne: bakteriofagi (tylko przed udojem) Etap rozwoju: brak danych</p>
Obszar(y) zastosowania	<p>użytkowanie w pomieszczeniach</p> <p>Higiena weterynaryjna</p>
Sposób(-oby) nanoszenia	<p>Metoda: Natrysk</p> <p>Szczegółowy opis: Automatyczny natrysk przy użyciu robota udojowego przed udojem oraz/lub po udoju.</p>
Stosowane dawki i częstotliwość stosowania	<p>Stosowana dawka: -</p> <p>Rozcieńczenie (%): -</p> <p>Liczba i harmonogram aplikacji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - cows and buffaloes: 2 to 3 times per day for pre-milking disinfection and/or 2 to 3 times per day for post-milking disinfection - sheep and goats: 1 to 2 times per day for pre-milking disinfection and/or 1 to 2 times per day for post-milking disinfection
Kategoria(-e) użytkowników	profesjonalny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	<p>Butelka (HDPE) o pojemności: 1 L; Kanister (HDPE) o pojemności: 5 L, 10 L, 20 L, 22 L; Beczka (HDPE) o pojemności: 60 L, 220 L; Kontener (HDPE) o pojemności: 1000 L.</p>

4.8.1. Instrukcja stosowania dla danego zastosowania

Napełnić pojemnik automatycznego zrobotyzowanego urządzenia udojowego.

Aplikować produkt na strzykach zwierzęcia na całej ich długości przed lub po dojeniu poprzez automatyczny natrysk.

W przypadku stosowania produktu przed udojem, dokładnie oczyścić strzyki przed nałożeniem produktu. Po aplikacji, pozostawić produkt na 1 minutę a następnie wytrzeć go jednorazowym papierem lub ręcznikiem.

W przypadku stosowania produktu po dojeniu, pozostawić produkt do następnego dojenia. Utrzymać zwierzę w pozycji stojącej do czasu całkowitego wyschnięcia preparatu (co najmniej 5 minut).

Sprzęt do aplikacji produktu należy regularnie czyścić przy użyciu wody.

4.8.2. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

4.8.3. Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

Patrz sekcja 5.2

4.8.4. Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Patrz sekcja 5.3

4.8.5. Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Patrz sekcja 5.4

4.8.6. Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Patrz sekcja 5.5

Rozdział 5. OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE STOSOWANIA¹

5.1. Instrukcje stosowania

Przed użyciem zapoznać się z etykietą produktu. Postępować zgodnie z instrukcją.

Przestrzegać warunków stosowania produktu (stężenie produktu, czas kontaktu, temperatura, pH, itp.).

W przypadku gdy produkt jest nieskuteczny, użytkownik powinien niezwłocznie zgłosić to do posiadacza pozwolenia.

Przed zastosowaniem, należy doprowadzić produkt do temperatury powyżej 20°C

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

Brak

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc:

W przypadku dostania się do dróg oddechowych: W przypadku wystąpienia wszelkich objawów skontaktować się z lekarzem lub Ośrodkiem Toksykologicznym.

W przypadku połknięcia: Natychmiast przepłukać usta. Podać poszkodowanemu coś do picia, jeśli osoba wystawiona na narażenie jest w stanie przełykać. NIE WYWOŁYWAĆ wymiotów. Zadzwonić pod numer 112 lub na pogotowie w celu uzyskania pomocy medycznej.

W przypadku kontaktu ze skórą: Po kontakcie ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody. Zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać ją przed następnym użyciem. Kontynuować mycie skóry wodą przez 15 minut. Skontaktować się z lekarzem lub Ośrodkiem Toksykologicznym.

W przypadku dostania się do oczu: Natychmiast płukać dużą ilością wody, przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeśli są założone i można je łatwo usunąć. Kontynuować płukanie przez co najmniej 15 minut. Zadzwonić pod numer 112 lub na pogotowie w celu uzyskania pomocy medycznej. Zasięgnąć porady lekarza.

Dodatkowe informacje dla lekarza/personelu medycznego: Oczy należy również wielokrotnie płukać w drodze do lekarza, w przypadku gdy są one narażone na działanie alkalicznych substancji chemicznych o pH > 11, amin, kwasów takich jak kwas octowy, kwas mrówkowy lub kwas propionowy.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

Opakowania po produkcji oraz pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oryginalnym opakowaniu, usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. spalarnie). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

Nie usuwać pozostałości produktu do gleby, cieków wodnych, odpływów (zlew, toaleta) ani kanalizacji.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

Produkt przechowywać w temperaturze poniżej 40°C oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt niebędących przedmiotem zwalczania. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt. Chronić przed zamarzaniem.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat (od daty produkcji).

¹Instrukcje stosowania, środki zmniejszające ryzyko oraz pozostałe wskazówki dotyczące stosowania na podstawie niniejszego punktu obowiązują w przypadku wszystkich zastosowań objętych zezwoleniem.

Rozdział 6. INNE INFORMACJE