



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E, DEL  
SERVIZIO FARMACEUTICO  
Ufficio 1 – Prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici  
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

Classif: I.5.i.d.2/371

Allegati: 1 decreto + 2 allegati

Ministero della Salute  
0033440-14/06/2018-DGDMF-MDS-P  
DGDMF

0033440-P-14/06/2018

I.5.i.d.2/2012/371



285361507

SPETT.LE  
BLEU LINE S.r.l.  
Via Virgilio 28  
Zona Industriale Villanova  
47122 FORLÌ

**OGGETTO: Prodotto biocida BRODIBLEU BLOCK  
Trasmissione decreto di rinnovo.**

Si trasmette, in allegato, il decreto di autorizzazione all'immissione in commercio del biocida indicato in oggetto n. IT/2014/00253/AUT.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I  
Dr.ssa Paola D' Alessandro

Referente tecnico: Raffaella Perrone – 06.5994 2520  
email: r.perrone@sanita.it  
F.G.



# Ministero della Salute

## DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO

UFFICIO I ex DGDFM- Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici

### IL DIRETTORE DELL' UFFICIO I

I.5.i.d.2/371

**VISTA** la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi;

**VISTA** la Direttiva 2010/10/UE della Commissione del 9 febbraio 2010 recante modifica della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di includere il brodifacum come principio attivo nell'allegato I della direttiva;

**VISTO** il Regolamento n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del regolamento n. 528/2012 relativo al rinnovo delle autorizzazioni nazionali;

**VISTO** il decreto direttoriale del 30 settembre 2014, e successive modificazioni, con il quale è stato autorizzato con il numero di autorizzazione IT/2014/00253/AUT il prodotto biocida denominato BRODIBLEU BLOCK di cui è titolare la società BLEU LINE S.R.L, con sede legale in via Virgilio, 28 – Zona industriale Villanova – 47122, Forlì (FC);

**VISTO** il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1381 della Commissione del 25 luglio 2017 che rinnova l'approvazione del brodifacum come principio attivo destinato all'uso nei biocidi del tipo di prodotto 14;

**VISTA** l'istanza di rinnovo BC-FT018518-20;

### DECRETA

L'autorizzazione del biocida denominato BRODIBLEU BLOCK, autorizzazione numero IT/2014/00253/AUT – ASSET NUMBER IT-0008122-0000 è rinnovata fino al 31 dicembre 2022.

E' approvato e fa parte integrante del presente decreto il sommario delle caratteristiche del prodotto (**allegato 1**).

Si allega copia delle etichette. Le modifiche a tali etichette non rientranti tra quelle indicate nell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 354/2013 della Commissione del 18 aprile 2013, possono essere apportate dalla società titolare autonomamente e sotto la propria responsabilità. (**allegato 2**).


Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Il presente decreto viene redatto in duplice originale, di cui un esemplare è notificato in via amministrativa alla società interessata e l'altro è conservato agli atti di questo Ufficio.

Roma,

12 GIU. 2018

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO I  
(Dr.ssa Paola D'Alessandro)



## 1. Administrative information

### 1.1. Trade names of the product

<b>Market area</b>	<b>Trade name(s)</b>
Italy	BRODIBLEU BLOCK

### 1.2. Authorisation holder

**Authorisation number**

Not defined

**Date of the authorisation**

Not defined

**Expiry date of the authorisation**

Not defined

**Name and address of the authorisation holder**

**Name  
Address**

Not defined  
Not defined

### 1.3. Manufacturers of the product

<b>Name of the manufacturer</b>	BLEU LINE S.r.l.
<b>Address of the manufacturer</b>	Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova 47122 Forlì (FC) Italy
<b>Location of manufacturing sites</b>	FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - C/da Ripoli 64023 Mosciano S. Angelo (TE) Italy INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia, 25 35020 Arre (PD) Italy UNICHEM d.o.o. - Sinja Gorica 2 SI-1360 Vrhnika Slovenia G.M.B. Internacional S.A. - Avenida Mas del Oli, 144 46940 Manises (Valencia) Spain BIOSOL ITALIA S.r.l.s. - Via Nettunense Km 23,400 04011 Aprilia (LT) Italy SELECTA S.r.l. (packaging operations only) - Via Tacito, 9 20094 Corsico (MI) Italy

### 1.4. Manufacturer(s) of the active substance(s)

**BAS number: 11**

**Name of the manufacturer**

Activa S.r.l.

**Address of the manufacturer**

Via Feltre, 32 20132 Milano Italy

**Location of manufacturing sites**

Dr Tezza S.r.l. - Via Tre Ponti, 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Italy

## 2. Product composition and formulation

### 2.1. Qualitative and quantitative information on the composition of the product

BAS number	EC number	CAS number	Common name	IUPAC name	Function	Content (%)
11	259-980-5	56073-10-0	Brodifacoum	3-[3-(4'-bromobiphenyl- 4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	Active Substance	0.005
-			Denatonium benzoate		Bittering agent	0.001

### 2.2. Type of formulation

RB - Bait (ready for use)

## 3. Hazard and precautionary statements

**Hazard statements**

May damage the unborn child.  
May cause damage to organs (*blood*) through prolonged or repeated

exposure .

**Precautionary statements**

Keep out of reach of children

Do not handle until all safety precautions have been read and understood.

**Wear protective gloves**

IF exposed or concerned: Get medical advice.

Dispose of contents to special waste in accordance with national regulations.

## 4. Authorised use(s)

### 4.1. House mice - professional - indoor

<b>Product type(s)</b>	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	Not relevant for rodenticides.		
<b>Field(s) of use</b>	Indoor Indoor		
<b>Category(ies) of users</b>	Industrial, Professional		
<b>Target organisms</b>	<b>Scientific name</b>	<b>Common name</b>	<b>Development stage</b>
	Mus musculus	House mouse	Juvenies to adults
<b>Application method(s)</b>			
<b>Method</b>	Bait application		
<b>Description</b>	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations		
<b>Rate:</b>	40 g of bait per bait point. If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
<b>Dilution:</b>	0%		
<b>Timing:</b>	If more than one bait station is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Bait product of 20 g units.		
1,5-3-5-10-20-25 kg			
Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg			
Packaging material: Plastic composite-triple layer (polyester/pet MET/polyethylene)			
<b>Type of packaging</b>			
<b>Size/volume of the packaging</b>			
<b>Material of the packaging</b>			
<b>Type and material of closure(s)</b>			
<b>Compatibility of the product with the proposed packaging materials (Yes/No)</b>			
Labelled or printed Bag/Sack 1,5-3-5-10-20-25 kg Plastic composite Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded Yes			
Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner 1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg Plastic composite Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded Yes			
Labelled plastic (HDPE) Bucket 1,5-3-5-10-20-25 kg Labelled plastic (HDPE) Bucket Rectangular or truncated cone bucket sealed Yes			
Labelled plastic (HDPE) Bucket- with inner plastic liner 1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg Labelled plastic (HDPE) Bucket- Rectangular or truncated cone bucket sealed Yes			
Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner 1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each Carton+plastic composite Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded Yes			

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner  
 1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
 Carton+plastic composite  
 Prefabricated cardboard  
 Yes

#### 4.1.1. Use-specific instructions for use

The bait stations should be visited at least every 2 to 3 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

#### 4.1.2. Use-specific risk mitigation measures

Use-specific risk mitigation measures are not necessary when risk mitigation measures, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

#### 4.1.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

#### 4.1.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented

#### 4.1.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

Shelf life. 24 months.

## 4.2. Rats - professional - indoor

<b>Product type(s)</b>	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	Not relevant for rodenticides		
<b>Field(s) of use</b>	Indoor		
<b>Category(ies) of users</b>	Industrial, Professional		
<b>Target organisms</b>	<b>Scientific name</b>	<b>Common name</b>	<b>Development stage</b>
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
<b>Application method(s)</b>			
<b>Method</b>	Bait application		
<b>Description</b>	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations.		
<b>Rate:</b>	60-100 g of bait per bait point. If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters		
<b>Dilution:</b>	0%		
<b>Timing:</b>	If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.		
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Bait product of 20 g units.		
1,5-3-5-10-20-25 kg			
Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg			
Packaging material. Plastic composite-triple layer (polyester/pet MET/polyethylene)			
Type of packaging			
Size/volume of the packaging			
Material of the packaging			

**Type and material of closure(s)****Compatibility of the product with the proposed packaging materials (Yes/No)**

Labelled or printed Bag/Sack  
1,5-3-5-10-20-25 kg  
Plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
Plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled plastic (HDPE)  
Bucket  
1,5-3-5-10-20-25 kg  
Labelled plastic (HDPE)  
Bucket  
Rectangular or truncated cone bucket sealed  
Yes

Labelled plastic (HDPE) Bucket- with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
Labelled plastic (HDPE) Bucket  
Rectangular or truncated cone bucket sealed  
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner  
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
Carton+plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
Carton+plastic composite  
Prefabricated cardboard  
Yes

**4.2.1. Use-specific instructions for use**

The bait stations should be visited only 5 to 7 days at the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

**4.2.2. Use-specific risk mitigation measures**

Use-specific risk mitigation measures are not necessary when risk mitigation measures, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

**4.2.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment**

When placing bait stations close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

**4.2.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging**

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

**4.2.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage**

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months.

**4.3. House mice and rats - professional - outdoor around buildings**

Product type(s)

PT14 - Rodenticides (Pest control)

**Where relevant, an exact description of the authorised use** Not relevant for rodenticides.

**Field(s) of use** Outdoor  
Outdoor around buildings

**Category(ies) of users** Industrial, Professional

Target organisms	Scientific name	Common name	Development stage
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults

**Application method(s)**

**Method** Bait application

**Description** Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations.

**Rate:** House mouse:40 g of bait per bait point. Rats: 60-100 g of bait per bait point. If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.

**Dilution:** 0%

**Timing:** If more than one bait point is needed, the minimum distance between bait stations should be of 5 meters.

**Pack sizes and packaging material** Bait product of 20 g units

1,5-3-5-10-20-25 kg

Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg

**Packaging material:** Plastic composite-triple layer (polyester/pet MEI/polyethylene)

**Type of packaging**

**Size/volume of the packaging**

**Material of the packaging**

**Type and material of closure(s)**

**Compatibility of the product with the proposed packaging materials (Yes/No)**

Labelled or printed Bag/Sack  
1,5-3-5-10-20-25 kg  
Plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
Plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled plastic (HDPE)  
Bucket  
1,5-3-5-10-20-25 kg  
Labelled plastic (HDPE)  
Bucket  
Rectangular or truncated cone bucket sealed  
Yes

Labelled plastic (HDPE) Bucket- with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
Labelled plastic (HDPE) Bucket  
Rectangular or truncated cone bucket sealed  
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner  
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
Carton+plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each

Carton+plastic composite  
 Prefabricated cardboard  
 Yes

**4.3.1. Use-specific instructions for use**

- Protect bait from the atmospheric conditions (e.g. rain, snow, etc.). Place the bait stations in areas not liable to flooding.

- The bait stations should be visited [for mice - at least every 2 to 3 days at] [for rats - only 5 to 7 days after] the beginning of the treatment and at least weekly afterwards, in order to check whether the bait is accepted, the bait stations are intact and to remove rodent bodies. Re-fill bait when necessary.

- Replace any bait in a bait station in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.

**4.3.2. Use-specific risk mitigation measures**

Do not apply this product directly in the burrows.

**4.3.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment**

When placing bait stations close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

**4.3.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging**

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

**4.3.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage**

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months

**4.4. House mice and rats - trained professionals - indoor**

<b>Product type(s)</b>	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	Not relevant for rodenticides.		
<b>Field(s) of use</b>	Indoor		
<b>Category(ies) of users</b>	Trained professional		
<b>Target organisms</b>	<b>Scientific name</b>	<b>Common name</b>	<b>Development stage</b>
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
<b>Application method(s)</b>			
<b>Method</b>	Bait application		
<b>Description</b>	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait station.		
<b>Rate:</b>	Rats:- High infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait for baiting point.		
<b>Dilution:</b>	0%		
<b>Timing:</b>	Rats:- High infestation: 100 g of bait per baiting point - Low infestation: 60 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait for baiting point.		

Pack sizes and packaging material



Bait product of 20 g units.

1,5-3-5-10-20-25 kg

Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg

Packaging material: Plastic composite-triple layer (polyester/pet MET/polyethylene)

**Type of packaging**

**Size/volume of the packaging**

**Material of the packaging**

**Type and material of closure(s)**

**Compatibility of the product with the proposed packaging materials (Yes/No)**

Labelled or printed Bag/Sack  
1,5-3-5-10-20-25 kg  
Plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
Plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled plastic (HDPE)  
Bucket  
1,5-3-5-10-20-25 kg  
Labelled plastic (HDPE)  
Bucket  
Rectangular or truncated cone bucket sealed  
Yes

Labelled plastic (HDPE) Bucket- with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
Labelled plastic (HDPE)  
Bucket Rectangular or truncated cone bucket sealed  
Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner  
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
Carton+plastic composite  
Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
Yes

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner  
1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
Carton+plastic composite  
Prefabricated cardboard  
Yes

#### 4.4.1. Use-specific instructions for use

Remove the remaining product at the end of treatment period.

#### 4.4.2. Use-specific risk mitigation measures

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign (in accordance with the applicable code of good practice, if any)

- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion

- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.

- Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.

- Do not use the product in pulsed baiting treatments.

**4.4.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment**

When placing bait points close to water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

**4.4.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging**

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

**4.4.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage**

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented

Shelf life: 24 months.

**4.5. Mice and rats - trained professionals - outdoor around buildings**

<b>Product type(s)</b>	PT14 - Rodenticides (Pest control)		
<b>Where relevant, an exact description of the authorised use</b>	Not relevant for rodenticides.		
<b>Field(s) of use</b>	Outdoor		
<b>buildings.</b>	Outdoor around		
<b>Category(ies) of users</b>	Trained professional		
<b>Target organisms</b>	<b>Scientific name</b>	<b>Common name</b>	<b>Development stage</b>
	Mus musculus	House mouse	Juveniles to adults
	Rattus norvegicus	Brown rat	Juveniles to adults
	Rattus rattus	Roof rat	Juveniles to adults
<b>Application method(s)</b>			
<b>Method</b>	Bait application		
<b>Description</b>	Ready-to-use bait to be used in tamper-resistant bait stations or covered and protected baiting points as long as they provide the same level of protection for non-target species and humans as tamper-resistant bait station.		
<b>Rate:</b>	* Bait products: Rats: - High infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait for baiting point.		
<b>Dilution:</b>	0%		
<b>Timing:</b>	Bait products: Rats: - High infestation: 100 g of bait per baiting point. - Low infestation: 60 g of bait per baiting point. Mice: 40 g of bait for baiting point		
<b>Pack sizes and packaging material</b>	Bait product of 20 g units.		
1,5-3-5-10-20-25 kg			
<b>Where applicable, package is restricted to separately packed bags with a maximum bag size of 10 kg</b>			
<b>Packaging material:</b>	Plastic composite-triple layer (polyester/pet MET/polyethylene)		
<b>Type of packaging</b>			
<b>Size/Volume of the packaging</b>			
<b>Material of the packaging</b>			
<b>Type and material of closure(s)</b>			
<b>Compatibility of the product with the proposed packaging materials (Yes/No)</b>			
<b>Labelled or printed Bag/Sack</b>	1,5-3-5-10-20-25 kg		
<b>Plastic composite Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded</b>	Yes		

Labelled or printed Bag/Sack- with inner plastic liner  
 1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
 Plastic composite  
 Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
 Yes

Labelled plastic (HDPE)  
 Bucket  
 1,5-3-5-10-20-25 kg  
 Labelled plastic (HDPE)  
 Bucket  
 Rectangular or truncated cone bucket sealed  
 Yes

Labelled plastic (HDPE) Bucket- with inner plastic liner  
 1,5-3-5-10 kg – max size inner liner 10 kg  
 Labelled plastic (HDPE)  
 Bucket Rectangular or truncated cone bucket sealed  
 Yes

Labelled or printed Carton sachet with plastic inner liner  
 1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
 Carton+plastic composite  
 Prefabricated bags or serial production bags, both thermal welded  
 Yes

Labelled or printed Cardboard with inner plastic liner  
 1,5-3-5-10 kg – single inner plastic bags of up to 10 kg each  
 Carton+plastic composite  
 Prefabricated cardboard  
 Yes

#### 4.5.1. Use-specific instructions for use

- Protect bait from the atmospheric conditions. Place the baiting points in areas not liable to flooding.
- Replace any bait in baiting points in which bait has been damaged by water or contaminated by dirt.
- Remove the remaining product at the end of treatment period.

For application in covered and protected bait points:

- For outdoor use, baiting points must be covered and placed in strategic sites to minimise the exposure to non-target species.
- Follow any additional instructions provided by the relevant code of best practice.

#### 4.5.2. Use-specific risk mitigation measures

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign (in accordance with the applicable code of good practice, if any).
- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.
- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents during treatment at frequent intervals, in line with the recommendations provided by the relevant code of best practice.
- Do not use the product as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.
- Do not use the product in pulsed baiting treatments.
- Do not apply this product directly in the burrows.

#### 4.5.3. Where specific to the use, the particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

When placing bait points close to surface waters (e.g. rivers, ponds, water channels, dykes, irrigation ditches) or water drainage systems, ensure that bait contact with water is avoided.

#### 4.5.4. Where specific to the use, the instructions for safe disposal of the product and its packaging

Use specific instruction for safe disposal of the product and its packaging are not necessary when instruction for safe disposal of the product and its packaging,

as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

#### 4.5.5. Where specific to the use, the conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Use specific conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage are not necessary when conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage, as detailed in the section "General directions for use (trained professionals)", are implemented.

Shelf life: 24 months.

## 5. General directions for use

### 5.1. Instructions for use

#### For professionals:

- Read and follow the product information as well as any information accompanying the product or provided at the point of sale before using it.
- Carry out a pre-baiting survey of the infested area and an on-site assessment in order to identify the rodent species, their places of activity and determine the likely cause and the extent of the infestation.
- Remove food which is readily attainable for rodents (e.g. spilled grain or food waste). Apart from this, do not clean up the infested area just before the treatment, as this only disturbs the rodent population and makes bait acceptance more difficult to achieve.
- The product should only be used as part of an integrated pest management (IPM) system, including, amongst others, hygiene measures and, where possible, physical methods of control.
- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.
- Bait stations should be placed in the immediate vicinity of places where rodent activity has been previously observed (e.g. travel paths, nesting sites, feedlots, holes, burrows etc.).
- Where possible, bait stations must be fixed to the ground or other structures.
- Bait stations must be clearly labelled to show they contain rodenticides and that they must not be moved or opened (see section 5.3 for the information to be shown on the label).
- When the product is being used in public areas, the areas treated should be marked during the treatment period and a notice explaining the risk of primary or secondary poisoning by the anticoagulant as well as indicating the first measures to be taken in case of poisoning must be made available alongside the baits.
- Bait should be secured so that it cannot be dragged away from the bait station.
- Place the product out of the reach of children, birds, pets and farm animals and other non-target animals.
- Place the product away from food, drink and animal feeding stuffs, as well as from utensils or surfaces that have contact with these.
- Wear protective chemical resistant gloves during product handling phase
- When using the product do not eat, drink or smoke. Wash hands and directly exposed skin after using the product.
- If bait uptake is low relative to the apparent size of the infestation, consider the replacement of bait stations to further places and the possibility to change to another bait formulation.
- If after a treatment period of 35 days baits are continued to be consumed and no decline in rodent activity can be observed, the likely cause has to be determined. Where other elements have been excluded, it is likely that there are resistant rodents so consider the use of a non-anticoagulant rodenticide, where available, or a more potent anticoagulant rodenticide. Also consider the use of traps as an alternative control measure.
- Remove the remaining bait or the bait stations at the end of the treatment period.

#### For trained professionals:

- Read and follow the product information as well as any information accompanying the product or provided at the point of sale before using it.
- Carry out a pre-baiting survey of the infested area and an on-site assessment in order to identify the rodent species, their places of activity and determine the likely cause and the extent of the infestation.
- Remove food which is readily attainable for rodents (e.g. spilled grain or food waste). Apart from this, do not clean up the infested area just before the treatment, as this only disturbs the rodent population and makes bait acceptance more difficult to achieve.

- The product should only be used as part of an integrated pest management (IPM) system, including, amongst others, hygiene measures and, where possible, physical methods of control.
- Consider preventive control measures (e.g. plug holes, remove potential food and drinking as far as possible) to improve product intake and reduce the likelihood of reinvasion.
- The product should be placed in the immediate vicinity of places where rodent activity has been previously explored (e.g. travel paths, nesting sites, feedlots, holes, burrows etc.).
- Where possible, bait stations must be fixed to the ground or other structures.
- Bait stations must be clearly labelled to show they contain rodenticides and that they must not be moved or opened (see section 5.3 for the information to be shown on the label).
- When the product is being used in public areas, the areas treated should be marked during the treatment period and a notice explaining the risk of primary or secondary poisoning by the anticoagulant as well as indicating the first measures to be taken in case of poisoning must be made available alongside the baits.
- Bait should be secured so that it cannot be dragged away from the bait station.
- Place the product out of the reach of children, birds, pets and farm animals and other non-target animals.
- Place the product away from food, drink and animal feeding stuffs, as well as from utensils or surfaces that have contact with these.
- Wear protective chemical resistant gloves during product handling phase.
- When using the product do not eat, drink or smoke. Wash hands and directly exposed skin after using the product.
- The frequency of visits to the treated area should be at the discretion of the operator, in the light of the survey conducted at the outset of the treatment. That frequency should be consistent with the recommendations provided by the relevant code of best practice.
- If bait uptake is low relative to the apparent size of the infestation, consider the replacement of bait points to further places and the possibility to change to another bait formulation.
- If after a treatment period of 35 days baits are continued to be consumed and no decline in rodent activity can be observed, the likely cause has to be determined. Where other elements have been excluded, it is likely that there are resistant rodent so consider the use of a non-anticoagulant rodenticide, where available, or a more potent anticoagulant rodenticide. Also consider the use of traps as an alternative control measure.
- Remove the remaining bait or the bait stations at the end of the treatment period.

## 5.2. Risk mitigation measures

### For professionals:

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders (e.g. users of the treated area and their surroundings) about the rodent control campaign.
- To reduce risk of secondary poisoning, search for and remove dead rodents at frequent intervals during treatment (e.g. at least twice a week).
- Products shall not be used beyond 35 days without an evaluation of the state of the infestation and of the efficacy of the treatment.
- Do not use baits containing anticoagulant active substances as permanent baits for the prevention of rodent infestation or monitoring of rodent activities.
- The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly show that the product shall not be supplied to the general public (e.g. "for professionals only"); the product shall be used in adequate tamper resistant bait stations (e.g. "use in tamper resistant bait stations only"); users shall properly label bait stations with the information referred to in section 5.3 of the SPC (e.g. label bait stations according to the product recommendations).
- Using this product should eliminate rodents within 35 days. The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly recommend that in case of suspected lack of efficacy by the end of the treatment (i.e. rodent activity is still observed), the user should seek advice from the product supplier or call a pest control service.
- Do not wash the bait stations with water between applications.
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

### For Trained professionals:

- Where possible, prior to the treatment inform any possible bystanders about the rodent control campaign.
- The product information (i.e. label and/or leaflet) shall clearly show that the product shall only be supplied to trained professional users holding certification demonstrating compliance with the applicable training requirements (e.g. "for trained professionals only").

- Do not use in areas where resistance to the active substance can be suspected.
- Products shall not be used beyond 35 days without an evaluation of the state of the infestation and of the efficacy of the treatment.
- Do not rotate the use of different anticoagulants with comparable or weaker potency for resistance management purposes. For rotational use, consider using a non-anticoagulant rodenticide, if available, or a more potent anticoagulant
- Do not wash the bait stations or utensils used in covered and protected bait points with water between applications.
- Dispose dead rodents in accordance with local requirements.

### 5.3. Particulars of likely direct or indirect effects, first aid instructions and emergency measures to protect the environment

This product contains an anticoagulant substance. If ingested, symptoms, which may be delayed, may include nosebleed and bleeding gums. In severe cases, there may be bruising and blood present in the faeces or urine.

- Antidote:  
Vitamin K1 administered by medical/veterinary personnel only.

- In case of:

Dermal exposure, wash skin with water and then with water and soap.

Eye exposure, rinse eyes with eyes-rinse liquid or water, keep eyes lids open at least 10 minutes.

Oral exposure, rinse mouth carefully with water.

Never give anything by mouth to unconscious person. Do not provoke vomiting. If swallowed, seek medical advice immediately and show the product's container or label. Contact a veterinary surgeon in case of ingestion by a pet.

- Bait stations must be labelled with the following information: "do not move or open", "contains a rodenticide"; "product name or authorisation number"; "active substance" and "in case of incident, call a poison centre".

- Hazardous to wildlife.

### 5.4. Instructions for safe disposal of the product and its packaging

At the end of the treatment, dispose the uneaten bait and the packaging in accordance with local requirements.

### 5.5. Conditions of storage and shelf-life of the product under normal conditions of storage

Store in a dry, cool and well ventilated place. Keep the container closed and away from direct sunlight.

- Store in places prevented from the access of children, birds, pets and farm animals.

- Shelf life: 24 months.

### 6. Other information

Because of their delayed mode of action, anticoagulant rodenticides may take from 4 to 10 days to be effective after effective consumption of the bait.

- Rodents can be disease carriers. Do not touch dead rodents with bare hands, use gloves or use tools such as tongs when disposing them.

This product contains a bittering agent and a dye.

**BRODIBLEU BLOCK**

Esca Rodenticida pronta all'uso  
In forma di blocco paraffinato  
**USO PROFESSIONALE**

**CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI FORMATI**

**AREA DI UTILIZZO: INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI**

**Composizione:**

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) g 0,005

Denatonio Benzoato (N° CAS 3734-33-6) g 0,001

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100



**PERICOLO**

**INDICAZIONI DI PERICOLO**

Può nuocere al feto. Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente nei rifiuti speciali secondo le normative nazionali.

**PRODOTTO BIOCIDA (PT14)**

Autorizzazione del Ministero della Salute n.

IT/2014/00253/AUT

**Titolare dell'autorizzazione:**

BLEU LINE S.r.l. - Via Virgilio, 28 - Z.l. Villanova - 47122 Forlì (FC) Tel 0543 754430

**Officina di produzione:**

FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - C/da Ripoli - 64023 Mosciano S. Angelo (TE)

G.M.B. Internacional S.A. - Avenida Mas del Olivo - 46940 Manises, Valencia (Spagna)

BIOSOL ITALIA SRLS - Via Nettunense Km 23, 400 - 04011 Aprilia (LT)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia 25 - 35020 Arre (PD)

UNICHEM d.o.o. - Sinja Gorica, 2, SI-1360 Vrhnika (Slovenia)

**Officina di confezionamento secondario:**

SELECTA S.r.l. - Via Tacito 9 - 20094 Corsico (MI)

**Confezione: 1,5-3-5-10-20-25 kg** (contenente esche in forma di blocchi paraffinati pronti all'uso da 20g ciascuno)

**Validità: 2 anni**

**Lotto n. del**

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

BRODIBLEU BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), Ratto nero (*Rattus rattus*) anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le

specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

BRODIBLEU BLOCK contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

BRODIBLEU BLOCK può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

**ORGANISMI TARGET**

Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti, Ratto nero (*Rattus rattus*), sia giovani che adulti.

**MODALITÀ APPLICATIVE**

BRODIBLEU BLOCK è un'esca pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, da utilizzare in contenitori per esche a prova di manomissione o in punti esca coperti e protetti dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

**INDICAZIONI PER L'USO E AVVERTENZE**

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.

Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.

Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tut-

**BLEU LINE SRL**

Legale Rappresentante  
Savio Giovanni

te le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di reinfestazione.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.

I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.

Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.

Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.

La frequenza delle visite all'area trattata è a discrezione dell'operatore, alla luce del sopralluogo condotto all'inizio del trattamento. La frequenza deve essere conforme alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.

Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determinare la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.

Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveleni.

Pericoloso per la fauna selvatica.

#### DOSI E MODI IMPIEGO

**Uso all'interno di edifici** Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*):

in caso di alta infestazione: posizionare 100 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 5 esche in blocchi paraffinati pronte all'uso da 20 g ciascuno. In caso di bassa infestazione: posizionare 60 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 3 esche in blocchi paraffinati pronte all'uso da 20 g ciascuno.

Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 40 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronte all'uso da 20 g ciascuno.

Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento.

Seguire ogni ulteriore istruzione previste dalle buone pratiche pertinenti.

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di reinfestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).

Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori.

Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

**Uso all'esterno, intorno agli edifici** Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*). Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*):

in caso di alta infestazione: posizionare 100 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 5 esche in blocchi paraffinati all'uso da 20 g ciascuno.

in caso di bassa infestazione: posizionare 60 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 3 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno.

Topolino Domestico (*Mus musculus*): posizionare 40 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronte all'uso da 20 g ciascuno.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche. Posizionare i punti esca in zone non soggette ad allagamenti. Sostituire le esche nei punti esca se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia. Rimuovere il prodotto residuo alla fine del trattamento.

Per l'applicazione in punti esca coperti e protetti: per uso esterno, i punti esca devono essere coperti e posizionati in luoghi strategici al fine di minimizzare l'esposizione nei confronti delle specie non bersaglio.

Non utilizzare questo prodotto direttamente nelle tane.

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti (ad esempio coloro che frequentano l'area trattata ed i dintorni) della campagna di derattizzazione in corso. Considerare misure preventive di controllo al fine di favorire l'assunzione del prodotto e ridurre la probabilità di reinfestazione (ad esempio ostruire possibili aperture, rimuovere potenziali fonti di cibo e acqua quanto più possibile).

Al fine di ridurre il rischio di avvelenamento secondario, durante il trattamento e ad intervalli frequenti, ricercare e



raccogliere i roditori morti, conformemente alle raccomandazioni previste dalle buone pratiche pertinenti.

In caso di posizionamento di punti esca in prossimità di acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali d'acqua, dighe, canali di irrigazione) o di sistemi di drenaggio delle acque, prevenire che l'esca entri in contatto con l'acqua.

Non usare il prodotto come esca permanente per la prevenzione d'infestazioni da roditori o per il monitoraggio dell'attività dei roditori. Non usare il prodotto in trattamenti dove viene usata la tecnica di 'pulsed baiting'.

#### MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili abitanti della campagna di derattizzazione in corso.

Non impiegare in aree dove vi è il sospetto di resistenza alla sostanza attiva.

Non usare i prodotti oltre 35 giorni senza una valutazione del livello dell'infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Per un'appropriata gestione delle resistenze, non alternare l'uso di anticoagulanti differenti ma con efficacia paragonabile o inferiore. Considerare l'uso di rodenticidi non-anticoagulanti, se disponibili, oppure di un anticoagulante più efficace.

Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche o gli utensili usati in punti esca coperti e protetti.

Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente.

Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diretta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

#### ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.

I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.

Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.

APPROVA  
MACISTA  
PERRONE

BLEU LINE SRL  
Legale Rappresentante  
Bazzocchi Giovanni

**BRODIBLEU BLOCK**

Esca Rodenticida pronta all'uso  
in forma di blocco paraffinato

**USO PROFESSIONALE****CATEGORIA DI UTILIZZATORI: PROFESSIONISTI****AREA DI UTILIZZO: INTERNO ed INTORNO AGLI EDIFICI****Composizione:**

100 g di prodotto contengono:

Brodifacoum (N° CAS 56073-10-0) g 0,005

Denatonio Benzoato (N° CAS 3734-33-6) g 0,001

Coformulanti e sostanze appetibili q.b. a g 100

**PERICOLO****INDICAZIONI DI PERICOLO**

Può nuocere al feto. Può provocare danni agli organi (sangue) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.

**CONSIGLI DI PRUDENZA**

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze. Indossare guanti. IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico. Smaltire il prodotto/recipiente nei rifiuti speciali secondo le normative nazionali.

**PRODOTTO BIOCIDA (PT14)****Autorizzazione del Ministero della Salute n.****IT/2014/00253/AUT****Titolare dell'autorizzazione:**

BLEU LINE S.r.l. - Via Virgilio, 28 - Z.I. Villanova  
47122 Forlì (FC) Tel 0543 754430

**Officina di produzione:**

FERBI S.r.l. - Viale 1° Maggio - C/da Ripoli - 64023 Mosciano  
S. Angelo (TE)

G.M.B. Internacional S.A. - Avenida Mas del Oli 144 -  
46940 Manises, Valencia (Spagna)

BIOSOL ITALIA SRLS - Via Nettunense Km 23, 400 -  
04011 Aprilia (LT)

INDUSTRIALCHIMICA S.r.l. - Via Sorgaglia 25 -  
35020 Arre (PD)

UNICHEM d.o.o. - Sinja Gorica, 2, SI-1360 Vrhnika  
(Slovenia)

**Officina di confezionamento secondario:**

SELECTA S.r.l. - Via Tacito 9 - 20094 Corsico (MI)

**Confezione: 1,5-3-5-10-20-25 kg** (contenente esche in  
forma di blocchi paraffinati pronti all'uso da 20g ciascuno)

**Validità: 2 anni**

**Lotto n.** \_\_\_\_\_ **del** \_\_\_\_\_

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

Questo prodotto contiene una sostanza anticoagulante. Se ingerito, i sintomi, che possono essere ritardati, possono includere sanguinamento dal naso o dalle gengive. In casi gravi, possono manifestarsi ematomi e presenza di sangue nelle feci ed urine.

Antidoto: Vitamina K1 somministrabile solo da personale medico/veterinario.

In caso di:

Esposizione cutanea, lavare la pelle con acqua e poi con acqua e sapone.

Esposizione oculare, risciacquare gli occhi con acqua o con liquido per lavaggio oculare, tenere le palpebre aperte per almeno 10 minuti.

Esposizione orale, sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Non somministrare nulla per bocca ad una persona priva di sensi. Non provocare il vomito.

In caso d'ingestione, contattare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta del prodotto. Contattare un medico veterinario in caso d'ingestione da parte di un animale domestico.

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

BRODIBLEU BLOCK è un'esca rodenticida pronta all'uso a base di una sostanza attiva anticoagulante, denominata Brodifacoum, efficace contro Topolino domestico (*Mus musculus*), Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rat-*

*tus rattus*), anche dopo una singola ingestione. La formulazione consiste in un blocco paraffinato appetibile per le specie di roditori indicate. Il prodotto non allerta e non ingenera sospetti agli altri componenti della popolazione di roditori.

BRODIBLEU BLOCK contiene una sostanza amaricante atta a prevenire l'ingestione accidentale da parte dei bambini.

BRODIBLEU BLOCK può essere usato all'interno e intorno a edifici industriali (inclusi magazzini, depositi, stive delle navi), rurali, civili, abitazioni, cantine, garage, ripostigli, giardini ed aree esterne di pertinenza.

**ORGANISMI TARGET**

Topolino domestico (*Mus musculus*), sia giovani che adulti, Ratto grigio (*Rattus norvegicus*), sia giovani che adulti e Ratto nero (*Rattus rattus*) sia giovani che adulti.

**MODALITÀ APPLICATIVE**

BRODIBLEU BLOCK è un'esca pronta all'uso in forma di blocco paraffinato, da utilizzare esclusivamente in contenitori per esche a prova di manomissione, debitamente marcati, protette dagli agenti atmosferici, dall'ingestione di specie non bersaglio e da dispersione nell'ambiente.

**INDICAZIONI PER L'USO E AVVERTENZE**

Prima dell'uso leggere e seguire le istruzioni riportate sull'imballo del prodotto così come le informazioni in accompagnamento al prodotto o fornite presso il punto vendita.

Prima del posizionamento delle esche, procedere ad un sopralluogo dell'area infestata e ad una valutazione in loco al fine d'identificare la specie di roditori, i luoghi d'attività e determinare la probabile causa e l'entità dell'infestazione.

Rimuovere le fonti di cibo facilmente raggiungibili da parte dei roditori (ad esempio granaglie fuoriuscite o scarti di cibo). Inoltre, non ripulire l'area infestata appena prima del trattamento, dato che ciò disturba solamente la popolazione di roditori e rende più difficile ottenere l'accettazione dell'esca.

Il prodotto deve essere usato unicamente all'interno del sistema di gestione integrata delle infestazioni (IPM), che include, fra l'altro, anche misure d'igiene e, dove possibile, metodi fisici di controllo.

**BLEU LINE SRL**  
Legale Rappresentante  
Barzocchi Giovanni

Considerare misure preventive di controllo (ad esempio: chiusura dei buchi, rimozione, per quanto possibile, di tutte le fonti di cibo e acqua) in modo da verificare la quantità di prodotto consumata e ridurre la possibilità di reinfestazione.

I contenitori con l'esca devono essere posizionati nelle immediate vicinanze di luoghi in cui l'attività dei roditori è stata verificata in precedenza (ad esempio camminamenti, nidi, recinti d'entrata di bestiame, aperture, tane, ecc.).

Ove possibile, fissare i contenitori per esca al suolo o ad altre strutture.

I contenitori per esche devono essere chiaramente etichettati segnalando che contengono rodenticidi e che non devono essere rimossi o aperti.

Quando il prodotto è utilizzato in aree pubbliche, le zone trattate devono essere segnalate durante il periodo di trattamento. Accanto alle esche, deve essere reso disponibile un avviso indicante il rischio di avvelenamento primario e secondario da anticoagulante e le misure di primo soccorso da seguire in caso di avvelenamento.

L'esca deve essere fissata in modo da non essere trascinata fuori dal contenitore per esche.

Posizionare il prodotto fuori dalla portata di bambini, uccelli, animali domestici, animali da fattoria e altri animali non bersaglio.

Posizionare il prodotto lontano da cibi, bevande e alimenti per animali, nonché da utensili o superfici che possono entrare in contatto con il prodotto.

Durante la fase di manipolazione del prodotto, indossare guanti di protezione resistenti alle sostanze chimiche.

Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso del prodotto. Lavare le mani e la pelle direttamente esposta dopo l'utilizzo del prodotto.

Se il consumo dell'esca è basso rispetto alla dimensione evidente dell'infestazione, valutare il riposizionamento dei punti esca in altri luoghi e la possibilità di cambiare tipo formulazione d'esca.

Se, trascorso un periodo di trattamento di 35 giorni, le esche vengono ancora consumate e non si osserva una diminuzione nell'attività dei roditori, è necessario determi-

narne la causa più probabile. Qualora altri elementi siano stati già esclusi, è probabile che vi siano roditori resistenti: considerare, quindi, ove disponibile, l'uso di un rodenticida non-anticoagulante o di un rodenticida anticoagulante più efficace. Considerare, inoltre, l'uso di trappole quale misura alternativa di controllo.

Al termine del periodo di trattamento rimuovere le esche rimaste o i contenitori con le esche.

I contenitori d'esche devono essere etichettati con le seguenti informazioni "non spostare o aprire"; "contiene un rodenticida"; "nome del prodotto o numero di autorizzazione"; "sostanza/e attiva/e" e "in caso d'incidente, consultare un Centro Antiveneni.

Pericoloso per la fauna selvatica.

#### DOSI E MODI IMPIEGO

**Uso all'interno di edifici** Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*).

Posizionare 40 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il consumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca. Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

**Uso all'interno di edifici** Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Posizionare 60-100 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

I contenitori dovrebbero essere ispezionati ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e poi almeno settimanalmente. Ciò al fine di verificare l'integrità dei contenitori, il con-

sumo dell'esca, ed eventualmente per rimuovere le carcasse dei roditori. Quando necessario reintegrare l'esca.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

**Uso all'esterno, intorno agli edifici** Per il controllo del Topolino Domestico (*Mus musculus*).

Posizionare 40 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 2 esche in blocchi paraffinati a pronti all'uso da 20 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 2-3 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

Non applicare direttamente nelle tane.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

**Uso all'esterno, intorno agli edifici** Per il controllo del Ratto grigio (*Rattus norvegicus*) e Ratto nero (*Rattus rattus*).

Posizionare 60-100 g di BRODIBLEU BLOCK per contenitore, pari a 3-5 esche in blocchi paraffinati pronti all'uso da 20 g ciascuno.

Laddove dovessero essere necessari più contenitori posizionarli ad una distanza di circa 5-10 metri l'uno dall'altro e comunque ad una distanza non inferiore ai 5 metri.

Proteggere l'esca dalle condizioni atmosferiche (ad es. pioggia, neve, ecc). Posizionare i contenitori con l'esca in zone non soggette ad allagamenti.

I contenitori con le esche dovrebbero essere controllati almeno ogni 5-7 giorni all'inizio del trattamento e almeno settimanalmente in seguito, al fine di controllare se l'esca è accettata, i contenitori sono integri e per rimuovere i

corpi dei roditori. Riempire nuovamente il contenitore quando necessario.

Non applicare direttamente nelle tane.

Sostituire le esche nei contenitori se danneggiate dall'acqua o contaminate dalla sporcizia.

Seguire ogni ulteriore istruzione prevista dalle buone pratiche pertinenti.

#### MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Ove possibile, prima del trattamento, informare i possibili astanti della campagna di derattizzazione in corso.

Per ridurre il rischio di avvelenamento secondario, ricercare e rimuovere a intervalli frequenti i roditori morti durante il trattamento (ad esempio almeno due volte la settimana).

Il prodotto non deve essere usato per oltre 35 giorni senza una valutazione dello stato di infestazione e dell'efficacia del trattamento.

Non utilizzare le esche contenenti sostanze attive anticoagulanti come esche permanenti per scopi preventivi o di monitoraggio delle attività dei roditori.

Quando si collocano punti esca vicino alle acque superficiali (ad esempio fiumi, stagni, canali, dighe, fossi di irrigazione) o sistemi di drenaggio dell'acqua, assicurarsi che l'esca non venga a contatto con acqua.

Fra un'applicazione e la successiva, non lavare con acqua i contenitori per esche.

L'utilizzo di questo prodotto dovrebbe eliminare i roditori entro 35 giorni. Le informazioni relative al prodotto (ad esempio etichetta e/o fogli illustrativi) devono chiaramente suggerire che in caso di sospetta inefficacia al termine del trattamento (ad esempio si osserva ancora attività di roditori), l'utilizzatore dovrebbe chiedere suggerimenti al fornitore di prodotto o chiamare un Servizio di disinfezione.

Smaltire i roditori morti secondo la normativa vigente.

Alla fine del trattamento, smaltire l'esca non consumata e la confezione secondo la normativa vigente.

Conservare in un luogo asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare il contenitore chiuso e al riparo dalla luce diret-

ta del sole. Conservare in un luogo inaccessibile per bambini, uccelli, animali domestici e da fattoria.

#### ALTRE INFORMAZIONI

A causa della loro modalità d'azione ritardata, i rodenticidi anticoagulanti possono richiedere dai 4 ai 10 giorni dopo l'assunzione dell'esca per essere efficaci.

I roditori possono essere portatori di malattie. Non toccare i roditori morti con le mani nude: per il loro smaltimento, utilizzare guanti o strumenti quali pinze.

Questo prodotto contiene un agente amaricante ed un colorante.

ISTO SI APPREGIA  
IL FARMACISTA NON  
RISPONDE PER  
L'UTILIZZO

BLEU LINE SRL  
Legale Rappresentante  
Sarzocchi Giovanni