

EL

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΒΙΟΚΤΟΝΟ

ACTIPASTA-BROD

Τύπος(οι) προϊόντος

PT14: Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: ΤΠ14-0229

Αριθμός κανονιστικού πόρου R4BP: GR-0032487-0000

1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	3
1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος	3
1.2. Κάτοχος άδειας	3
1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος	3
1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)	3
2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	4
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος	4
2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης	4
3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ	5
4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ	6
4.1. Περιγραφή χρήσης	6
4.2. Περιγραφή χρήσης	7
4.3. Περιγραφή χρήσης	8
4.4. Περιγραφή χρήσης	9
4.5. Περιγραφή χρήσης	10
4.6. Περιγραφή χρήσης	12
5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ	14
5.1. Οδηγίες χρήσης	14
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	15
5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος	16
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του	16
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	16
6. ΆΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ	17

Κεφάλαιο 1. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

1.1. Εμπορική(ές) ονομασία(ες) του προϊόντος

Εμπορική ονομασία	AGRORAT BRODI-3 PASTA WARIN'S MAX 3.0 CEBO FRESCO MAXIRAT PLUS BD3 PASTA KENORAT CEBO 30 HAMELIN PLUS PASTA CLEAM RAT PASTA PETRORAT PASTA NEW
-------------------	--

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του κατόχου άδειας	Όνομασία Διεύθυνση	Laboratorios Agrochem S.L. C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera Ισπανία
Αριθμός άδειας		ΤΠ14-0229
Αριθ. αναφ. στοιχείου στο μητρώο βιοκτόνων R4BP		GR-0032487-0000
Ημερομηνία έκδοσης της άδειας		17/04/2024
Ημερομηνία λήξης της άδειας		01/07/2024

1.3. Παρασκευαστής(ές) του προϊόντος

Επωνυμία παρασκευαστή	LABORATORIOS AGROCHEM S.L
Διεύθυνση παρασκευαστή	C/Tres Rieres, 10 - Pol. Ind. Sud 08292 Esparreguera - Barcelona Ισπανία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	LABORATORIOS AGROCHEM S.L site 1 C/Tres Rieres, 10 08292 Esparreguera - Barcelona Ισπανία

1.4. Παρασκευαστής(-ές) της(των) δραστικής(ών) ουσίας(ών)

Δραστική ουσία	Brodifacum
Επωνυμία παρασκευαστή	Activa S.r.l
Διεύθυνση παρασκευαστή	via Feltre, 32 20132 Milán Ιταλία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Activa S.r.l site 1 Tezza S.r.l, via Tre Ponti 22 37050 S. Maria di Zevio (VR) Ιταλία

Κεφάλαιο 2. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του προϊόντος

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro -1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	δραστική ουσία	56073-10-0	259-980-5	0,0025

2.2. Τύπο(οι) τυποποίησης

XX Άλλο: Ετοιμόχρηστο δόλωμα σε μορφή πάστας

Κεφάλαιο 3. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ

Δηλώσεις επικινδυνότητας	H373: Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα (αίμα) ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση ..
Δηλώσεις προφύλαξης	P102: Μακριά από παιδιά. P308+P313: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε Συμβουλευθείτε. P501: Διάθεση του contents σε καθώς και νεκρά τρωκτικά, μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικινδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.. P501: Διάθεση του container σε καθώς και νεκρά τρωκτικά, μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικινδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς..

Κεφάλαιο 4. ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

4.1. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 1. Χρήση #1 – Οικιακό ποντικό – Ευρύ κοινό – Εσωτερικό χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο -
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 5 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος δοχείου: Έως 50 g Αριθμός δολωματικών σταθμών ή/και ανταλλακτικών ανά δοχείο: Έως 50 g. Γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό και/ή αναπλήρωση: 10-20 g δολώματος σε σάκους. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας

4.1.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ελέγχονται τουλάχιστον κάθε 2 – 3 ημέρες στην αρχή της περιόδου εφαρμογής και τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα στη συνέχεια για να ελέγχεται αν το δόλωμα είναι αποδεκτό, για άθικτους δολωματικούς σταθμούς και για απομάκρυνση νεαρών τρωκτικών. Επαναγεμίστε τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.1.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 2. Χρήση #2 – Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο -
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 5 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος δοχείου: Έως 150 g Αριθμός δολωματικών σταθμών ή/και ανταλλακτικών ανά δοχείο: Έως 150 g. Γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό και/ή αναπλήρωση: 10-20 g δολώματος σε σάκους. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.2.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ελέγχονται κάθε 5 – 7 ημέρες κατά την έναρξη της περιόδου εφαρμογής και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα είναι αποδεκτό, για άθικτους δολωματικούς σταθμούς και για απομάκρυνση νεκρών τρωκτικών.

Επαναγεμίστε τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.2.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 3. Χρήση #3 – Αρουραίοι – Ευρύ κοινό – Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: -
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων Γύρω από κτίρια
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Δόση εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό. Εάν χρειάζεται να χρησιμοποιηθούν περισσότεροι του ενός δολωματικοί σταθμοί, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους θα είναι 5 μέτρα. Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: -
Κατηγορία(ες) χρηστών	ευρύ κοινό (μη επαγγελματίες)
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Μέγιστο μέγεθος δοχείου: Έως 150 g Αριθμός δολωματικών σταθμών ή/και ανταλλακτικών ανά δοχείο: Έως 150 g. Γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό και/ή αναπλήρωση: 10-20 g δολώματος σε σάκους. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.3.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Τοποθετήστε τον δολωματικό σταθμό σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε τα δολώματα που έχουν υποστεί ζημιά από το νερό ή έχουν μολυνθεί από βρωμιά.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να ελέγχονται 5 - 7 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και στη συνέχεια τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα ώστε να ελέγχεται αν το δόλωμα είναι αποδεκτό,

για άθικτους δολωματικούς σταθμούς και για απομάκρυνση νεκρών τρωκτικών. Επαναγεμίστε τον δολωματικό σταθμό όταν χρειάζεται.

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.3.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 4. Χρήση #7 – Ποντίκια – Εξειδικευμένο επαγγελματικό προσωπικό – Εσωτερικό.

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός πτοντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά θήκη δολώματος.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος συσκευασίας 1.5 kg. Αριθμός μεμονωμένων σακουλών ανά δοχείο: Έως 25 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά σάκκο: 10-20 g δόλωμα σε σάκους. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.4.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Συμβουλευτείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης.

4.4.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όταν είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία ή του περιβάλλοντός της) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείσιμο τρυπών, αφαίρεση τροφίμων και ποτών όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολωμάτος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Συμβουλευτείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Συμβουλευτείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.4.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Συμβουλευτείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 5. Χρήση # 5 – Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εσωτερικοί χώροι.

Tύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα.

Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εσωτερικό χώρο
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό.
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος δοχείου 1.5 kg. Αριθμός μεμονωμένων σακουλών ανά δοχείο: Έως 25 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά σάκκο: 10-20 g δόλωμα σε σάκους. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.5.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Αφαιρέστε τυχόν περίσσεια προϊόντος στο τέλος της θεραπείας.

Ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία ή του περιβάλλοντός της) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείσιμο οπών, αφαίρεση τροφίμων και ποτών όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της θεραπείας, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού, βεβαιωθείτε ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6. Περιγραφή χρήσης

Πίνακας 6. Χρήση # 6 – Οικιακοί ποντικοί και/ή Αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων

Τύπος προϊόντος	PT14: Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη σχετικό για τρωκτικοκτόνα
Στοχευόμενος(οι) οργανισμός(οί) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	Επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: άλλο: Καφέ Αρουραίος Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά άτομα Επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: άλλο: Οικιακός ποντικός Στάδιο ανάπτυξης: άλλο: Ενήλικα και νεαρά άτομα
Πεδίο(α) χρήσης	χρήση σε εξωτερικό χώρο άλλο: Otro Εξωτερικοί χώροι, περιμετρικά των κτιρίων
Μέθοδος(οι) εφαρμογής	Μέθοδος: Σε δολωματικούς σταθμούς Λεπτομερής περιγραφή: Ετοιμόχρηστο δόλωμα για χρήση σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.
Ποσοστό(ά) και συχνότητα εφαρμογής	Αραίωση (%): - Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ποντίκια: 20-40 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό Αρουραίοι: 100-200 γραμμάρια δολώματος ανά δολωματικό σταθμό
Κατηγορία(ες) χρηστών	καταρτισμένοι επαγγελματίες
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	Ελάχιστο μέγεθος δοχείου 1.5 kg. Αριθμός μεμονωμένων σακουλών ανά δοχείο: Έως 25 κιλά. Γραμμάρια/κιλό δολώματος ανά σάκκο: 10-20 g δόλωμα σε σάκους. Υλικό συσκευασίας: PE/Αλουμίνιο/Πολυεστέρας.

4.6.1. Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Προστατέψτε τα δολώματα από αιτιοσφαιρικές συνθήκες (π.χ. βροχή, χιόνι κ.λπ.). Τοποθετήστε τον δολωματικό σταθμό σε περιοχές που δεν υπόκεινται σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε τα δολώματα που έχουν καταστραφεί από το νερό ή έχουν μολυνθεί από βρωμιά.
Αφαιρέστε το υπολειπόμενο προϊόν στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.
Ακολουθήστε τις πρόσθετες οδηγίες που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.
Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από την εφαρμογή, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους (π.χ. χρήστες της περιοχής που υποβάλλεται σε θεραπεία ή του περιβάλλοντός της) σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών.

Εφαρμόστε προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. κλείσιμο οπών, αφαίρεση τροφίμων και πτοτών όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Για να μειώσετε τον κίνδυνο δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά σε συχνά διαστήματα κατά τη διάρκεια της πριόδου εφαρμογής, σύμφωνα με τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την ανίχνευση δραστηριότητας τρωκτικών.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν σε επαναλαμβανόμενες θεραπείες.

Μην εφαρμόζετε το προϊόν απευθείας σε λαγούμια.

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν οι δολωματικοί σταθμοί τοποθετούνται κοντά σε επιφανειακά ύδατα (π.χ. ποτάμια, λίμνες, κανάλια νερού, φράγματα, αρδευτικό κανάλι/τάφρος) ή συστήματα αποστράγγισης νερού, να διασφαλίζεται ότι το δόλωμα δεν έρχεται σε επαφή με το νερό.

Δείτε επίσης τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

4.6.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

Δείτε τις γενικές οδηγίες χρήσης

Κεφάλαιο 5. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ¹

5.1. Οδηγίες χρήσης

Ευρύ κοινό

Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες προϊόντος καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

Πριν από τη χρήση τρωκτικοτόνων, συνιστάται η χρήση μη χημικών μεθόδων (π.χ. παγίδες).

Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι άμεσα διαθέσιμα στα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την περιοχή που πρόκειται να περιποιηθείτε λίγο πριν τη θεραπεία, αυτό θα ενοχλήσει μόνο τα τρωκτικά και η αποδοχή του δολώματος θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε μέρη όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια...)

Όπου είναι δυνατόν, ο δολωματικός σταθμός πρέπει να στερεώνεται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Μην ανοίγετε τη σακούλα που περιέχει το δόλωμα.

Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους όπου τρόφιμα/ζωοτροφές, πιοτά, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων μπορεί να έρθουν σε επαφή ή να μολυνθούν από το προϊόν.

Μην τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποστράγγισης νερού όπου το δόλωμα μπορεί να έρθει σε επαφή με το νερό.

Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος μετά τη χρήση του προϊόντος.

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο δόλωμα και τον δολωματικό σταθμό στο τέλος της περιόδου εφαρμογής.

Επαγγελματίες χρήστες

Διαβάστε και ακολουθήστε τις πληροφορίες του προϊόντος καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες που συνοδεύουν το προϊόν ή παρέχονται στο σημείο πώλησης πριν το χρησιμοποιήσετε.

Διεξάγετε μια έρευνα πριν από την εφαρμογή στη μολυσμένη περιοχή και επιτόπια αξιολόγηση για τον εντοπισμό των ειδών τρωκτικών, τις περιοχές δραστηριότητάς τους και τον προσδιορισμό της αιτίας και της έκτασης της προσβολής.

Αφαιρέστε τα τρόφιμα που είναι άμεσα διαθέσιμα στα τρωκτικά (π.χ. χυμένα δημητριακά ή υπολείμματα τροφών). Εκτός από αυτό, μην καθαρίζετε την περιοχή που πρόκειται να περιποιηθείτε λίγο πριν την εφαρμογή, αυτό θα ενοχλήσει μόνο τα τρωκτικά και η αποδοχή του δολώματος θα είναι πιο δύσκολο να επιτευχθεί.

Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης τρωκτικών, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μέτρων υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, μεθόδων φυσικού ελέγχου.

Εφαρμόστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. κλείσιμο οπών, αφαιρέστε τρόφιμα και πιοτά όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά σε μέρη όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια κλπ).

Όπου είναι δυνατόν, ο δολωματικός σταθμός πρέπει να στερεώνεται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν σαφή ετικέτα που να υποδεικνύει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνο προϊόν και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (Βλ. ενότητα 5.3. για πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στην ετικέτα).

Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές που έχουν υποβληθεί σε κατεργασία πρέπει να επισημαίνονται κατά τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής και ένα επεξηγηματικό σημάδι πρέπει να ενημερώνει για τον κίνδυνο πρωτογενούς και δευτερογενούς δηλητηρίασης από αντιπηκτικά καθώς και μέτρα πρώτων βοηθειών.

Τα δολώματα πρέπει να ασφαλίζονται για να μην σύρονται έξω από τον δολωματικό σταθμό.

¹Οι οδηγίες χρήσης, τα μέτρα περιορισμού των κινδύνων και άλλες οδηγίες χρήσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ενότητα ισχύουν για οποιεσδήποτε εγκεκριμένες χρήσεις.

Τοποθετήστε τους δολωματικούς σταθμούς μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια, ζώα φάρμας και άλλα ζώα για τα οποία δεν προορίζεται το προϊόν.

Δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε χώρους όπου τρόφιμα/ζωτροφές, ποτά, μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες επεξεργασίας τροφίμων μπορεί να έρθουν σε επαφή ή να μοιλυνθούν από το προϊόν.

Φοράτε προστατευτικά γάντια ανθεκτικά στις χημικές ουσίες κατά τη φάση χειρισμού (το υλικό γαντιών πρέπει να παρέχεται από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης στις πληροφορίες του προϊόντος).

Κατά τη χρήση του προϊόντος μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε. Πλύνετε τα χέρια και τις εκτεθειμένες περιοχές του δέρματος μετά τη χρήση του προϊόντος.

Η συχνότητα των επισκέψεων στις υπό θεραπεία περιοχές θα πρέπει να είναι στη διακριτική ευχέρεια του εφαρμογέα, δυνάμει των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην αρχή της θεραπείας. Αυτή η συχνότητα πρέπει να είναι συνεπής με τις συστάσεις που παρέχονται από τον Κώδικα Ορθής Πρακτικής.

Εάν η ποσότητα του δολώματος που καταναλώνεται είναι χαμηλή σε σχέση με το προφανές μέγεθος της προσβολής, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη η τοποθέτηση περισσότερων δολωματικών σταθμών και η πιθανότητα μετάβασης σε άλλη σύνθεση δολώματος.

Εάν μετά από περίοδο θεραπείας 35 ημερών παρατηρηθεί ότι τα δολώματα συνεχίζουν να καταναλώνονται και η δραστηριότητα των τρωκτικών δεν μειώνεται, πρέπει να προσδιοριστεί η αιτία. Όπου έχουν αποκλειστεί άλλα στοιχεία, η χρήση ενός μη αντιπηκτικού τρωκτικούτονου ή ενός πιο ισχυρού αντιπηκτικού τρωκτικούνου μπορεί να χρειαστεί να εξεταστεί για πιο ανθεκτικά τρωκτικά. Η χρήση παγίδων θα πρέπει επίσης να θεωρείται ως εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

Αφαιρέστε το υπολειπόμενο δόλωμα και τον δολωματικό σταθμό στο τέλος της περιόδου εφαρμογής. Ειδικές οδηγίες ανάλογα με τον τύπο του δολώματος:

- Δόλωμα σε σακούλα: Μην ανοίγετε τη σακούλα που περιέχει το δόλωμα

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Ευρύ κοινό

Εφαρμόστε μέτρα προληπτικού ελέγχου (π.χ. κλείσιμο οπών, αφαιρέστε φαγητό και ποτό όπου είναι δυνατόν) για να βελτιώσετε την πρόσληψη δολώματος και να μειώσετε την πιθανότητα εκ νέου εισβολής.

Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα για την πρόληψη της μόλυνσης από τρωκτικά ή για την ανίχνευση δραστηριότητας τρωκτικών.

Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο) πρέπει να αναφέρουν σαφώς:

- Το προϊόν θα χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση (π.χ. "χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς σε παραβίαση").
- Οι χρήστες πρέπει να επισημαίνουν επαρκώς τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα 5.3. του SPC (π.χ., "επισήμανση τους δολωματικούς σταθμούς σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος").

Η χρήση αυτού του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα και/ή φυλλάδιο) θα πρέπει να συνιστούν ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας στο τέλος της περιόδου εφαρμογής (π.χ. παρατηρείται ακόμη δραστηριότητα τρωκτικών) ο χρήστης πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει ένα αδειδοτμένο συνεργείο απεντομώσεων - μυοκτονιών.

Αναζητήστε και αφαιρέστε τα νεκρά τρωκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας, τουλάχιστον κάθε φορά που ελέγχονται οι δολωματικοί σταθμοί.

Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με τις δημοτικές διατάξεις.

Επαγγελματίες χρήστες

Όποτε είναι δυνατόν, ενημερώστε τους παρευρισκόμενους σχετικά με την εκστρατεία καταπολέμησης τρωκτικών πριν από τη θεραπεία (σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει).

Οι πληροφορίες προϊόντος (π.χ. ετικέτα ή/και φυλλάδιο) θα υποδεικνύουν σαφώς ότι το προϊόν θα παρέχεται μόνο σε επαγγελματίες χρήστες.

Να μη χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου υπάρχει υποψία ανθεκτικότητας στη δραστική ουσία.

Τα προϊόντα δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για περισσότερες από 35 ημέρες χωρίς αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της θεραπείας (εκτός εάν επιτρέπεται μόνιμη δόλωση).

Μην εναλλάσσετε τη χρήση διαφορετικών αντιπηκτικών δραστικών ουσιών με συγκρίσιμες ή χαμηλότερες ιδιότητες για τον σκοπό της διαχείρισης της ανθεκτικότητας. Εάν εναλλάσσονται, εξετάστε το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσετε μη αντιπηκτικά τρωκτικούτονα, εάν υπάρχουν, ή ένα πιο ισχυρό αντιπηκτικό τρωκτικούτονο.

Μην πλένετε τον δολωματικό σταθμό ή άλλα σκεύη που χρησιμοποιούνται σε καλυμμένα ή προστατευμένα σημεία δολώματος με νερό μεταξύ των εφαρμογών.
Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς. Η αποτέφρωση συνιστάται ως μέθοδος θεραπείας.

5.3. Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βιοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος

Αυτό το προϊόν περιέχει μια αντιπηκτική ουσία. Σε περίπτωση κατάποσης, τα συμπτώματα μπορεί να γίνουν εμφανή μέσα σε 72 ώρες. Οι κλινικές εκδηλώσεις μπορεί να περιλαμβάνουν αιμορραγία από τη μύτη και τα ούλα. Σε σοβαρές περιπτώσεις, μπορεί να υπάρχουν μώλωπες και αίμα στα κόπρανα ή στα ούρα.

Αντίδοτο: Η βιταμίνη K1 χορηγείται μόνο από ιατρικό/κτηνιατρικό προσωπικό.

Σε περίπτωση:

- Δερματικής έκθεσης, πλύνετε το δέρμα με νερό και στη συνέχεια με σαπούνι και νερό.
- Οφθαλμικής έκθεσης, ελέγχετε πάντα αν υπάρχουν φακοί επαφής και αφαιρείτε τους, ξεπλύνετε τα μάτια με υγρό πλύσης ματιών ή νερό, κρατάτε τα μάτια ανοιχτά για τουλάχιστον 10 λεπτά.
- Στοματικής έκθεσης, ξεπλύνετε το στόμα προσεκτικά με νερό. Μην χορηγείτε τίποτα από το στόμα σε αναίσθητο άτομο. Μην προκαλείτε εμετό. Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε ιατρική συμβουλή, κρατήστε την ετικέτα ή το δοχείο κοντά σας. Επικοινωνήστε με έναν κτηνιάτρο εάν καταποθεί από κατοικίδιο.

Οι δολωματικοί σταθμοί πρέπει να φέρουν την σήμανση με τις ακόλουθες πληροφορίες:
«μην μετακινείτε και μην ανοίγετε». «περιέχει τρωκτικοκτόνο»· «όνομα προϊόντος ή αριθμός εξουσιοδότησης»· «δραστική ουσία(έξ)»· «Σε περίπτωση ατυχήματος, τηλεφωνήστε στο ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ (Τηλ. κέντρου δηλητηρίασεων 2107793777).

Επικίνδυνο για την άγρια ζωή.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του

Για το ευρύ κοινό συνιστάται η χρήση γαντιών.

Ευρύ κοινό

- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, απορρίψτε το μη καταναλωμένο δόλωμα και τη συσκευασία ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις δημοτικές διατάξεις.

Τα ακόλουθα θα αναγράφονται στην ετικέτα του δολωματικού σταθμού:

- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, ως επικίνδυνα απόβλητα σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις δημοτικές διατάξεις.

Επαγγελματίες χρήστες

- Στο τέλος της περιόδου εφαρμογής, πετάξτε το μη καταναλωμένο δόλωμα και τη συσκευασία μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

- Η αποτέφρωση συνιστάται ως θεραπευτική μέθοδος.

Τα ακόλουθα θα αναγράφονται στην ετικέτα του δολωματικού σταθμού:

- Απορρίψτε τους δολωματικούς σταθμούς, στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους, μέσω εξουσιοδοτημένου διαχειριστή επικίνδυνων αποβλήτων, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

Φυλάσσεται σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το φως.

Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά, πουλιά, κατοικίδια και ζώα φάρμας.

Το προϊόν είναι σταθερό για 2 χρόνια

Κεφάλαιο 6. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Λόγω του καθυστερημένου τρόπου δράσης, τα αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα μπορεί να χρειαστούν από 4 έως 10 ημέρες για να είναι αποτελεσματικά μετά την κατανάλωση του δολώματος.

Τα τρωκτικά είναι φορείς μετάδοσης ασθενειών. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με χέρια χωρίς γάντι, χρησιμοποιήστε γάντια ή σκεύη όπως τσιμπιδάκια για αφαίρεση.

Αυτό το προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μία χρωστική.

Δεδομένα που απαιτούνται μετά την άδεια:

Ο κάτοχος της άδειας πρέπει να ενημερώσει τις Αρμόδιες Αρχές πριν από την επόμενη ανανέωση του προϊόντος για οποιοδήποτε περιστατικό που υποπτεύεται ότι έχει συμβεί σε άγρια ζώα, κατοικίδια ζώα που μπορεί να έχει προκληθεί από τη χρήση του προϊόντος. Τα δεδομένα μπορεί να συλλέγονται από κτηνιατρικές κλινικές, ΜΚΟ προστασίας των ζώων ή καταγγελίες πολιτών.