

SK

PRÍLOHA

ZHRNUTIE CHARAKTERISTÍK BIOCÍDNEHO VÝROBKU

STORM Secure

Typ(y) výrobku

PT14: Rodenticídy

Číslo autorizácie: SK14-MRS-015

Číslo položky v R4BP: SK-0006802-0000

Kapitola 1. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE

1.1. Obchodný(-é) názov(-y) výrobku

Obchodný(-é) názov(-y)	STORM Secure
------------------------	--------------

1.2. Držiteľ autorizácie

Názov a adresa držiteľa autorizácie	Názov	BASF Slovensko s r.o.
	Adresa	BASF Slovensko spol.s r.o. Einsteinova 23 851 01 Bratislava Slovensko
Číslo autorizácie		SK14-MRS-015
Číslo položky v R4BP		SK-0006802-0000
Dátum autorizácie		05/07/2013
Dátum skončenia platnosti autorizácie		31/12/2026

1.3. Výrobca(-ovia) výrobku

Názov výrobcu	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adresa výrobcu	Huobstrasse 3, 8088 Pfäffikon SZ Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 1 St Michael's Industrial Estate WA8 8TJ, Widnes, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

1.4. Výrobca(-ovia) účinnej(-ých) látky(-ok)

Účinná látka	Flokumafén
Názov výrobcu	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch
Adresa výrobcu	Huobstrasse 3, 8088 Pfäffikon SZ Švajčiarsko
Miesto výrobných priestorov	BASF Agro B.V., Arnhem (NL) – Freienbach Branch site 1 Lower House Road, Halebank WA8 8NS, Widnes Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska

Kapitola 2. ZLOŽENIE A ÚPRAVA VÝROBKU

2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne informácie o zložení výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	Číslo CAS	Číslo EC	Obsah (%)
Flokumafén	4-hydroxy-3- [(1RS,3RS;1RS,3RS)- 1,2,3,4- tetrahydro-3- [4-(4- trifluoromethylbenzyloxy) phenyl]-1- naphthyl]coumarin	účinná látka	90035-08-8	421-960-0	0,005
Citric Acid	2- hydroxypropane-1, tricarboxylic acid	Iná ako účinná látka	77-92-9	201-069-1	0,5

2.2. Typ(y) úpravy

RB Návnada (pripravená na použitie)

Kapitola 3. VÝSTRAŽNÉ A BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Výstražné upozornenia	<p>H360D: Môže spôsobiť poškodenie nenarodeného dieťaťa.</p> <p>H373: Môže spôsobiť poškodenie orgánov uveďte všetky zasiahnuté orgány, ak sú známe(krvi) H350 Môže spôsobiť rakovinu uveďte spôsob expozície, ak sa presvedčivo preukáže, že iné spôsoby expozície nevyvolávajú nebezpečenstvo;{ 1:: }.</p>
Bezpečnostné upozornenia	<p>P101: Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.</p> <p>P102: Uchovávajte mimo dosahu detí.</p> <p>P201: Pred použitím sa oboznámte s osobitnými pokynmi.</p> <p>P280: Noste ochranné rukavice</p> <p>P308 + P311: PO expozícii alebo podozrení z nej:: V prípade zdravotných problémov volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekara</p> <p>P501: Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi požiadavkami..</p> <p>P501: Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi požiadavkami..</p>

Kapitola 4. AUTORIZOVANÉ POUŽITIE(-IA)

4.1. Opis použitia

Tabuľka 1. Use # 1 – Myš domová a potkany - vyškolení profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: <i>Mus musculus</i> Bežný názov: iné: myš domová Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých Vedecký názov: <i>Rattus norvegicus</i> Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých Vedecký názov: <i>Rattus rattus</i> Bežný názov: iné: potkan tmavý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou (pokiaľ poskytujú rovnakú úroveň ochrany pre necieľové druhy a ľudí ako staničky s návnadou odolné proti manipulácii).
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 1 blok (20g návnady) na návnadové miesto. Potkany: 2 - 3 bloky (40 - 60g návnady) na návnadové miesto. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Technológia pulzných návnad: Skonzumovanú návnadu nahradte až po 3 dňoch a potom v maximálne 7-dňových intervaloch. Presuňte každú nedotknutú návnadu do aktívnych oblastí. Pri každej návšteve vymeňte skonzumovanú návnadu. Vložte návnadu do zamorenej oblasti, do staničiek na návnady odolných proti manipulácii alebo na kryté a chránené miesta s návnadou. Ak sa nepodarí získať kontrolu, zopakujte obhliadku miesta, aby ste zistili príčiny a zvážte premiestnenie alebo zvýšenie počtu návnadových miest.

Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Voľné bloky návnad (po 20g) alebo laminované vrecká PE/PP/PET/HDP s obsahom 60g návnady, ďalej zabalené do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastových nádob: 3 kg - 10 kg, PP alebo HDPE alebo PET; uzáver: veko PP alebo PE - znovu uzatvárateľných vreciek: 3 kg - 10 kg, papierový laminát, flexibilné vrecká na opätovné uzatváranie - znovu uzatvárateľných kartónových škatúl: 3 kg - 10 kg, znovu uzatvárateľné kartóny s LDPE vložkou

4.1.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Návnady musia byť bezpečne uložené takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko konzumácie zvieratami alebo deťmi. Tam, kde je to možné, zabezpečte návnadu tak, aby nemohla byť odtiahnutá.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok.

Dodržujte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Skonzumovanú návnadu nahradte až po 3 dňoch a potom v maximálne 7-dňových intervaloch. Zozbierajte všetku rozliatu návnadu a mŕtve hlodavce.

Postupujte podľa konkrétnych pokynov, ktoré obsahuje príslušný kódex osvedčených postupov na vnútroštátnej úrovni.

Frekvencia návštev ošetrovanej oblasti závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe prieskumu uskutočneného na začiatku aplikácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.1.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.1.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Neumývajte návnadové miesta alebo pomôcky používané na zakrytých alebo chránených návnadových miestach vodou medzi aplikáciami.

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

V informácii o výrobku (t.j. štítok a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať výhradne vyškoleným profesionálnym užívateľom, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o zhode s príslušnými požiadavkami na odbornú prípravu (napr. „Len pre vyškolených odborníkov“).

Nepoužívajte v miestach, kde existuje podozrenie na odolnosť voči účinnej látke.

Nestriedajte používanie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou účinnosťou na účely regulácie rezistencie. Pre striedavé používanie zvážte použitie neantikoagulačného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

Návnady musia byť bezpečne uložené takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko konzumácie zvieratami alebo deťmi. Tam, kde je to možné, zabezpečte návnadu tak, aby nemohla byť odtiahnutá.

4.1.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.1.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.1.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.2. Opis použitia

Tabuľka 2. Use # 2 – Myš domová a potkany - vyškolení profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: Potkan hnedý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých
Oblasť(-i) použitia	vonkajšie použitie

	Vonku okolo budov
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: iné: Aplikácia návnady: Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii. Zakryté a chránené miesta s návnadou (pokiaľ poskytujú rovnakú úroveň ochrany pre cieľové druhy a ľudí ako staničky s návnadou odolné proti manipulácii). Priama aplikácia návnady pripravenej na použitie do brlohu.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: Myši: 1 blok (20g návnady) na návnadové miesto. Potkany: 2 - 3 bloky (40 - 60g návnady) na návnadové miesto. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: -
Katégoria(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky návnad (po 20g) alebo laminované vrecká PE/PP/PET/HDP s obsahom 60g návnady, ďalej zabalené do: - plastových nádob: 3 kg - 10 kg, PP alebo HDPE alebo PET; uzáver: veko PP alebo PE - znovu uzatvárateľných vreciek: 3 kg - 10 kg, papierový laminát, flexibilné vrecká na opätovné uzatváranie - znovu uzatvárateľných kartónových škatúl: 3 kg - 10 kg, znovu uzatvárateľné kartóny s LDPE vložkou

4.2.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chrňte návnadu pred poveternostnými podmienkami. Umiestnite návnadu v oblastiach, kde nehrozí zaplavenie.

Vymeňte návnadu na miestach s návnadou, kde bola návnada poškodená vodou alebo kontaminované nečistotou.

Na konci obdobia deratizácie odstráňte zvyšný výrobok

Dodržiujte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Pri vonkajšom použití musia byť návnadové miesta zakryté a umiestnené na strategických bodoch s cieľom minimalizovať expozíciu iných ako cieľových druhov

Návnady musia byť umiestnené tak, aby sa minimalizovala expozícia iných ako cieľových druhov a detí.

Zakryte alebo zablokujte vstupy do nôr s návnadami, aby ste obmedzili riziko vypudenia alebo vyplavenia návnady.

Frekvencia návštev ošetrovanej oblasti závisí od rozhodnutia prevádzkovateľa na základe prieskumu uskutočneného na začiatku aplikácie. Táto frekvencia by mala byť v súlade s odporúčaniami stanovenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Skonzumovanú návnadu nahradte až po 3 dňoch a potom v maximálne 7-dňových intervaloch. Zozbierajte všetku rozliatu návnadu a mŕtve hlodavce.

4.2.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.2.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (upchatie dier, čo najrozsiahlejšie odstránenie prípadných potravín a nápojov) na zlepšenie príjmu výrobku a zníženie pravdepodobnosti opätovnej invázie.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie v častých intervaloch hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v súlade s odporúčaniami uvedenými v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Nepoužívajte výrobok ako trvalé návnady na zamedzenie zamoreniu hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Neumývajte návnadové miesta alebo pomôcky používané na zakrytých alebo chránených návnadových miestach vodou medzi aplikáciami.

V informácii o výrobku (t.j. štítok a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že výrobok sa môže dodávať výhradne vyškoleným profesionálnym užívateľom, ktorí sú držiteľmi osvedčenia o zhode s príslušnými požiadavkami na odbornú prípravu (napr. „Len pre vyškolených odborníkov“).

Nepoužívajte v miestach, kde existuje podozrenie na odolnosť voči účinnej látke.

Nestriedajte používanie rôznych antikoagulantov s porovnateľnou alebo slabšou účinnosťou na účely regulácie rezistencie. Pre striedavé používanie zvážte použitie neantikoagulačného rodenticídu, ak je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulantu.

4.2.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete návnady blízko povrchových vôd (napr. rieky, rybníky, vodné kanály, hrádze, zavlažovacie kanály) alebo kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.2.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.2.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.3. Opis použitia

Tabuľka 3. Use # 3 – Potkan hnedý - vyškolení profesionáli – kanalizácie

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy

Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých
Oblasť(-i) použitia	iné: Iné Kanalizácie
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie, ktorá sa má upevniť alebo použiť v deratizačných staničkách, aby sa na zabránilo kontaktu návnady s odpadovou vodou. Zakryté a chránené miesta s návnadou.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 100-200 g návnadových blokov na jedno návnadové miesto (šachta) v závislosti od zamorenia danej oblasti. Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: -
Kategória(-ie) používateľov	vyškolený odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky návnad (po 20g) alebo laminované vrecká PE/PP/PET/HDP s obsahom 60g návnady, ďalej zabalené do: - plastových nádob: 3 kg - 10 kg, PP alebo HDPE alebo PET; uzáver: veko PP alebo PE - znovu uzatvárateľných kartónových škatúl: 3 kg - 10 kg, znovu uzatvárateľné kartóny s LDPE vložkou

4.3.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Vytvorte návnadové miesta v kanalizácii, napríklad v kanalizačných šachtách. Zabezpečte bloky návnady, napr. pomocou drôtu, kvôli ochrane pred oddelením alebo posunom. Pravidelne kontrolujte spotrebu návnady a v prípade potreby ju vymeňte.

Návnady sa musia umiestňovať tak, aby neprišli do kontaktu s vodou a neboli odplavené.

Dodržiňte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

4.3.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.3.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nepoužívajte výrobok v pulzných procesoch ukladania návnad.

Umiestnite návnady len do stokových systémov, ktoré sú pripojené na čistiareň odpadových vôd.

4.3.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie

4.3.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.3.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.4. Opis použitia

Tabuľka 4. Use # 4 – Myš domová - profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie Vnútorné priestory
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 1 blok (20 g) na každé návnadové miesto Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie:

	Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 1-2 m.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky návnad (po 20g) alebo laminované vrecká PE/PP/PET/HDP s obsahom 60g návnady, ďalej zabalené do: - plastových nádob: 3 kg - 10 kg, PP alebo HDPE alebo PET; uzáver: veko PP alebo PE - znovu uzatvárateľných vreciek: 3 kg - 10 kg, papierový laminát, flexibilné vrecká na opätovné uzatváranie - znovu uzatvárateľných kartónových škatúl: 3 kg - 10 kg, znovu uzatvárateľné kartóny s LDPE vložkou

4.4.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné staničky by sa mali kontrolovať najmenej každé 2 až 3 dni na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné staničky neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Dodržiňte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (zásuvné otvory, odstráňte prípadné jedlo a pitie), aby ste zlepšili príjem výrobku a znížili pravdepodobnosť opätovného zamorenia.

Po skončení aplikácie odstráňte zvyšky návnady a návnadové miesta.

4.4.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.4.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.4.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné staničky blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.4.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.4.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.5. Opis použitia

Tabuľka 5. Use # 5 – Potkan hnedý - profesionáli – vnútorné priestory

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých
Oblasť(-i) použitia	vnútorné použitie vonkajšie použitie Vnútorné priestory / profesionáli
Spôsob(y) aplikácie	Spôsob: aplikácia návnady Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	Aplikačná dávka: 2-3 bloky (40 g - 60 g) návnady na každú deratizačnú staničku Riedenie (%): - Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak sa vyžaduje viac než jedno návnadové miesto, vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 5-10 metrov.
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	Voľné bloky návnad (po 20g) alebo laminované vrecká PE/PP/PET/HDP s obsahom 60g návnady, ďalej zabalené do: - plastových nádob: 3 kg - 10 kg, PP alebo HDPE alebo PET; uzáver: veko PP alebo PE

- znovu uzatvárateľných vreciek: 3 kg - 10 kg, papierový laminát, flexibilné vrecká na opätovné uzatváranie - znovu uzatvárateľných kartónových škatúl: 3 kg - 10 kg, znovu uzatvárateľné kartóny s LDPE vložkou

4.5.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Deratizačné stanice by sa mali kontrolovať najmenej každých 5 až 7 dní na začiatku procesu, a potom najmenej raz týždenne, či bola návnada prijatá, či sú deratizačné stanice neporušené, a kvôli odstráneniu tiel hlodavcov. V prípade potreby doplňte návnadu.

Dodržiajte prípadné ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (zásuvné otvory, odstráňte prípadné jedlo a pitie), aby ste zlepšili príjem výrobku a znížili pravdepodobnosť opätovného zamorenia.

Po skončení aplikácie odstráňte zvyšky návnady a návnadové miesta.

4.5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.5.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.5.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Keď umiestňujete deratizačné stanice blízko kanalizačných systémov, zabezpečte, aby nedochádzalo ku kontaktu návnady s vodou.

4.5.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.5.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.6. Opis použitia

Tabuľka 6. Use # 6 – Myš domová a potkany - profesionáli – vonku okolo budov

Typ výrobku	PT14: Rodenticídy
-------------	-------------------

V prípade potreby presný opis autorizovaného použitia	Neuplatňuje sa na rodenticídy
Cieľový(-é) organizmus(-y) (vrátane vývojových štádií)	<p>Vedecký názov: Mus musculus Bežný názov: iné: Myš domová Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých</p> <p>Vedecký názov: Rattus norvegicus Bežný názov: iné: potkan hnedý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých</p> <p>Vedecký názov: Rattus rattus Bežný názov: iné: Potkan tmavý Vedecký názov: iné: Od mladých jedincov po dospelých</p>
Oblasť(-i) použitia	<p>vonkajšie použitie</p> <p>Vonku okolo budov / profesionáli</p>
Spôsob(y) aplikácie	<p>Spôsob: aplikácia návnady</p> <p>Detailný opis: Návnada na okamžité použitie v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii.</p>
Aplikačné(-é) dávka(-y) a frekvencia	<p>Aplikačná dávka: Pre myši: 1 blok (20 g) na každé návnadové miesto; Pre potkany: 2-3 bloky (40 g - 60 g) na každé návnadové miesto</p> <p>Riedenie (%): -</p> <p>Počet a časový rozvrh aplikácie: Ak je potrebná viac ako jedna deratizačná stanička, minimálna vzdialenosť medzi deratizačnými stanicami by mala byť 1-2m pre myši a 5-10m pre potkany.</p>
Kategória(-ie) používateľov	odborník
Veľkosti balenia a obalový materiál	<p>Voľné bloky návnad (po 20g) alebo laminované vrecká PE/PP/PET/HDP s obsahom 60g návnady, ďalej zabalené do:</p> <ul style="list-style-type: none"> - plastových nádob: 3 kg - 10 kg, PP alebo HDPE alebo PET; uzáver: veko PP alebo PE - znovu uzatvárateľných vreciek: 3 kg - 10 kg, papierový laminát, flexibilné vrecká na opätovné uzatváranie - znovu uzatvárateľných kartónových škatúl: 3 kg - 10 kg, znovu uzatvárateľné kartóny s LDPE vložkou

4.6.1. Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Chráňte návnadu pred poveternostnými podmienkami (napr. dážď, sneh, atď.). Umiestnite deratizačné staničky do oblastí, ktoré nie sú vystavené záplavám.

V úvodnej fáze aplikácie navštívte návnadové miesta každé 2 až 3 dni v prípade myší a každých 5 až 7 dní v prípade potkanov a neskôr minimálne raz týždenne, pričom zakaždým skontrolujte, či návnada bola prijatá, či sú návnadové miesta neporušené, a **odstráňte** telá hlodavcov. V prípade potreby **doplňte** návnadu.

Vymeňte všetky návnady na návnadových miestach, kde došlo k poškodeniu návnady vplyvom vody alebo nečistôt.

Dodržiujte všetky ďalšie pokyny uvedené v príslušnom kódexe osvedčených postupov.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (zásuvné otvory, **odstráňte** prípadné jedlo a pitie), aby ste zlepšili príjem výrobku a znížili pravdepodobnosť opätovného zamorenia.

Po skončení aplikácie **odstráňte** zvyšky návnady a návnadové miesta.

4.6.2. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

4.6.3. Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Nekladte návnady priamo do brlohov.

Neumývajte návnadové miesta vodou medzi dvomi aplikáciami.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy vyhľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce počas aplikácie v častých intervaloch (napr. najmenej dvakrát do týždňa).

Pri používaní tohto výrobku by malo dôjsť k vyhubeniu hlodavcov do 35 dní. V informácii o výrobku (t.j. štítok a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že v prípade podozrenia na nedostatočnú účinnosť na konci aplikácie (napr. pretrvávajúca aktivita hlodavcov) je používateľ povinný poradiť sa s výrobcom alebo zavolať na deratizačnú službu.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulujúcich aktívnych látok ako stále návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na sledovanie činnosti hlodavcov.

V informácii o výrobku (t.j. na štítku alebo v letáku) musia byť jasne uvedené tieto informácie:

- Výrobok nesmie byť dodávaný verejnosti (t.j. „len pre profesionálov“).
- Výrobok smie byť použitý len vo vhodných deratizačných staničkách, ktoré sú odolné voči manipulácii (t.j. „používajte len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“).
- Používatelia sú povinní riadne označiť návnadové miesta informáciami uvedenými v časti 5.3 SPC (napr. označiť návnadové miesta v súlade s odporúčaniami pre výrobok“)

Návnady musia byť bezpečne umiestnené, aby sa minimalizovalo riziko skonzumovania inými živočíchmi alebo deťmi. Tam, kde je to možné, zabezpečte návnady tak, aby sa nedali premiestniť.

4.6.4. Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

V prípade umiestnenia návnadových miest blízko vodných tokov zabezpečte, aby sa zabránilo kontaktu návnady s vodou.

4.6.5. Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

4.6.6. Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Prečítajte si všeobecné pokyny na použitie.

Kapitola 5. VŠEOBECNÉ POKYNY PRE POUŽITIE¹

5.1. Návod na použitie

Pred použitím si prečítajte a dodržiavajte informácie o výrobku, ako aj všetky sprievodné informácie o výrobku a informácie poskytnuté v mieste predaja.

Pred kladením návnad vykonajte obhliadku a posúdenie zamorenej oblasti s cieľom identifikovať druhy hlodavcov, miesta ich aktivít a stanovte pravdepodobnú príčinu a rozsah zamorenia.

Odstráňte potraviny, ktoré sú ľahko dostupné pre hlodavce (napríklad rozsypané zrno alebo potravinový odpad). Odhliadnuc od toho nevyčistite zamorenú oblasť tesne pred aplikáciou, pretože tým by ste iba narušili populáciu hlodavcov a skomplikovali prijatie návnady.

Používajte výrobok len v rámci systému integrovaného boja proti zamoreniu hlodavcami (IPM), ktorý okrem iného zahŕňa opatrenia v oblasti hygieny a - tam, kde je to možné - fyzické kontrolné metódy.

Zvážte preventívne kontrolné opatrenia (zásuvné otvory, odstráňte prípadné jedlo a pitie), aby ste zlepšili príjem výrobku a znížili pravdepodobnosť opätovného zamorenia.

Výrobok by mal byť umiestnený v bezprostrednej blízkosti miest, kde bola predtým pozorovaná aktivita hlodavcov (napríklad cesty, miesta hniezdenia, výbežky, otvory, nory atď.).

Tam, kde je to možné, návnady musia byť pevne spojené so zemou alebo s inými konštrukciami.

Návnady musia byť jasne označené tak, aby preukázali, že obsahujú rodenticídy a že sa nesmú posúvať ani otvárať (informácie nájdete na štítku v časti 5.3).

[Ak si to vnútroštátne stratégie alebo legislatíva vyžaduje] Ak sa výrobok používa vo verejných priestoroch, ošetrované plochy by mali byť počas aplikácie označené, a oznam vysvetľujúci riziko primárnej alebo sekundárnej otravy antikoagulantmi, ako aj prvé opatrenia, ktoré sa majú vykonať v prípade otravy, musia byť prístupné spolu s návnadami.

Návnada by mala byť zaistená tak, aby nemohla byť premiestnená z návnadového miesta.

Uchovávajte výrobok mimo potravín, nápojov a krmív pre zvieratá, ako aj mimo náradia alebo povrchov, ktoré sú v kontakte s nimi.

Umiestnite výrobok mimo dosahu detí, vtákov, domácich zvierat, hospodárskych zvierat a ostatných necieľových zvierat.

Počas manipulácie s výrobkom používajte ochranné rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikovaný držiteľom povolenia v rámci informácií o produkte)

Pri používaní výrobku nejedzte, nepite ani nefajčite. Po použití výrobku si umyte ruky a priamo vystavenú pokožku.

Ak je príjem návnad nízky vzhľadom na zjavný rozsah zamorenia, zvážte presunutie návnadových miest na iné miesta a možnosť zmeny na iný typ návnady.

Ak po 35-dňovej aplikácii hlodavce pokračujú v konzumácii návnad a nie je možné pozorovať pokles aktivity hlodavcov, je potrebné určiť pravdepodobnú príčinu. Po vylúčení iných faktorov je pravdepodobné, že existujú rezistentné hlodavce, takže zvážte použitie neantikoagulačného rodenticídu, pokiaľ je k dispozícii, alebo silnejšieho antikoagulačného rodenticídu. Zvážte aj používanie pascí ako alternatívneho spôsobu hubenia hlodavcov.

5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Keď to je možné, informujte pred deratizáciou prípadné nezúčastnené osoby (napr. používateľov ošetrovanej oblasti a ich okolia) o deratizácii hlodavcov.

Na zníženie rizika sekundárnej otravy počas deratizácie hľadajte a odstraňujte mŕtve hlodavce v častých intervaloch.

Výrobky sa nesmú používať dlhšie ako 35 dní bez zhodnotenia stavu zamorenia a účinnosti deratizácie.

Nepoužívajte návnady s obsahom antikoagulantných účinných látok ako trvalé návnady na prevenciu zamorenia hlodavcami alebo na monitorovanie činnosti hlodavcov.

Mŕtve hlodavce likvidujte v súlade s miestnymi požiadavkami.

Návnady musia byť bezpečne uložené takým spôsobom, aby sa minimalizovalo riziko konzumácie zvieratami alebo deťmi. Tam, kde je to možné, zabezpečte návnadu tak, aby nemohla byť odtiahnutá.

V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) musí byť jasne uvedené, že: výrobok sa nesmie dodávať širokej verejnosti (napr. „len pre profesionálov“).

¹Pokyny na používanie, opatrenia na zmiernenie rizika a iné návody na použitie v tomto oddiele sú platné pre všetky autorizované použitia.

Výrobok sa má používať v primeraných deratizačných staničkách odolných voči manipulácii (napr. „použitie len v deratizačných staničkách odolných voči manipulácii“), používatelia musia náležite označiť deratizačné staničky s informáciami uvedenými v oddiele 5.3 SPC (napr. „označte deratizačné staničky podľa odporúčaní o výrobku“).

Používaním tohto výrobku by sa hlodavce mali zlikvidovať do 35 dní. V informáciách o výrobku (t. j. etiketa a/alebo leták) sa musí jasne odporúčať, že v prípade domnej nedostatočnej účinnosti na konci procesu deratizácie (t. j. stále je možné pozorovať činnosť hlodavcov) by používateľ mal vyhľadať poradenstvo dodávateľa výrobku alebo zavolať deratizačnú službu.

Medzi použitiami neumývajte deratizačné staničky s vodou.

5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Tento výrobok obsahuje antikoagulantnú látku. Pri prehltnutí symptómy, ktoré môžu nastať s oneskoreným účinkom, zahŕňajú krvácanie z nosa a krvácajúce dŕasná. V závažných prípadoch sa môžu vyskytnúť modriny a krv v stolici alebo moči.

Protilátka: vitamín K1 podaný výlučne zdravotníckym/veterinárnym personálom.

V prípade:

- dermálnej expozície umyte pokožku vodou, a potom vodou a mydlom
 - zasiahnutia očí vypláchnite oči tekutinou na výplach očí alebo vodou, nechajte si oči otvorené najmenej 10 minút
 - orálnej expozície dôkladne vypláchnite ústa vodou, nikdy nepodávajte nič cez ústa osobe v bezvedomí
- Nevyvolávajte zvracanie. Pri prehltnutí okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte obal alebo etiketu výrobku. Ak výrobok prehltnie domáce zviera, spojte sa s veterinárnym lekárom.

Deratizačné staničky musia byť označené týmito informáciami: „nehýbte ani neotvárajte“ „obsahuje rodenticíd“; „názov výrobku alebo číslo autorizácie“; „účinné látky“ a „v prípade nehody zavolajte do toxikologického centra [telefón: 00421 2 54 77 41 66]“.

Nebezpečné pre voľne žijúce zvieratá.

5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Na konci deratizácie zlikvidujte neskonsumovaný návnadu a obalový materiál v súlade s miestnymi požiadavkami

Nepoužite obaly na žiaden iný účel.

5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Uchovávajte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Nádobu držte zatvorenú a mimo priameho slnečného žiarenia.

Uchovávajte na miestach chránených pred prístupom detí, vtákov, domácich zvierat a hospodárskych zvierat.

Doba použiteľnosti : Trvanlivosť výrobku je 3 roky. Neskladujte výrobok pri teplotách nad 30 °C.

Kapitola 6. ĎALŠIE INFORMÁCIE

Z dôvodu oneskoreného mechanizmu pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití návnady.

Hlodavce môžu prenášať choroby.

Nedotýkajte sa mŕtvych hlodavcov holými rukami, pri ich likvidácii používajte rukavice alebo používajte nástroje, ako napríklad kliešte.