

Περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος για βιοκτόνο

Όνομασία προϊόντος: Selontra

Τύπος(οι) προϊόντος: PT14 - Τρωκτικοκτόνα

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Αριθμός άδειας: KY-0190

**Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3:** CY-0023566-0000

Πίνακας περιεχομένων

Διοικητικές πληροφορίες	1
1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος	1
1.2. Κάτοχος άδειας	1
1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων	1
1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών	1
2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος	2
2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου	2
2.2. Είδος τυποποίησης	2
3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης	2
4. Εγκεκριμένες χρήσεις	2
5. Γενικές οδηγίες χρήσης	8
5.1. Οδηγίες χρήσης	8
5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου	9
5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών	11
5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του	11
5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης	11
6. Άλλες πληροφορίες	11

Διοικητικές πληροφορίες

1.1. Εμπορική ονομασία του προϊόντος

Selontra,
Relpexa

1.2. Κάτοχος άδειας

Επωνυμία και διεύθυνση του
κατόχου άδειας

Επωνυμία	BASF HELLAS Single Member Industrial and Commercial S.A.
Διεύθυνση	2 Paradissou Str. & Kifissias Ave. 15125 Marousi, Ελλάδα

Αριθμός άδειας

KY-0190

Αριθ. αναφ. στοιχείου στο
μητρώο βιοκτόνων R4BP 3

CY-0023566-0000

Ημερομηνία έκδοσης της
άδειας

10/03/2021

Ημερομηνία λήξης της
άδειας

27/04/2025

1.3. Παρασκευαστής(ές) βιοκτόνων

Όνομα του παρασκευαστή

BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch

Διεύθυνση του παρασκευαστή

Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Ελβετία

Τοποθεσία των εγκαταστάσεων
παραγωγής

BASF plc, St. Michaels Industrial Estate WA8 8TJ Widnes, Cheshire Ηνωμένο Βασίλειο

1.4. Παρασκευαστής/-ές της δραστικής ουσίας/-ών

Δραστικής ουσίας	1443 - Cholecalciferol
Όνομα του παρασκευαστή	BASF Agro B.V. Arnhem (NL) - Freienbach Branch
Διεύθυνση του παρασκευαστή	Huobstrasse 3 8808 Pfäffikon SZ Ελβετία
Τοποθεσία των εγκαταστάσεων παραγωγής	Fermenta Biotech Limited, Village Takoli, P.O. Nagwain Distt. Mandi - 175 121 Himachal Pradesh Ινδία
	Fermenta Biotech Limited, Z-109 B & C, SEZ II, Dahej, Taluka Vagara District Bharuch 392 130 Gujarat Ινδία

2. Σύνθεση και τυποποίηση προϊόντος

2.1. Ποιοτικές και ποσοτικές πληροφορίες για τη σύνθεση του βιοκτόνου

Κοινή ονομασία	Ονομασία κατά IUPAC	Λειτουργία	Αριθμός CAS	Αριθμός ΕΚ	Περιεκτικότητα (%)
Cholecalciferol		Δραστική Ουσία	67-97-0	200-673-2	0,077
2 - φαινυλοφαινόλη	2 - φαινυλοφαινόλη	Μη δραστική ουσία	90-43-7	201-993-5	0,0496

2.2. Είδος τυποποίησης

RB - Δόλωμα (έτοιμο για χρήση)

3. Δηλώσεις επικινδυνότητας και προφύλαξης

Δηλώσεις επικινδυνότητας	
Δηλώσεις προφύλαξης	

4. Εγκεκριμένες χρήσεις

4.1 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 1 - Χρήση #1 – Οικιακοί ποντικοί και ποντικοί των αγρών, αρουραίοι των αγρών και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες – εσωτερικοί χώροι

Τύπος προϊόντος	PT14 - Τρωκτικοκτόνα
Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται	Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.
Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)	<p>επιστημονική ονομασία: Mus musculus Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός, συμπεριλαμβανομένων φυλών ανθεκτικών σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Apodemus sylvaticus Κοινή ονομασία: Ποντικός των δασών/αγρών στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Microtus arvalis Κοινή ονομασία: Αρουραίος των αγρών στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Rattus rattus Κοινή ονομασία: Αρουραίος της στέγης στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα</p> <p>επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος, συμπεριλαμβανομένων φυλών ανθεκτικών σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα</p>
Πεδίο χρήσης	Εσωτερικοί Χώροι
Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Μέθοδος: Εφαρμογή δολώματος Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.</p> <p>Τοποθέτηση δολωμάτων σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Δόση εφαρμογής: Οικιακός ποντικός: 20-40 g (1 ή 2 μονάδες), ποντικός των αγρών και αρουραίος των αγρών: 40 g (2 μονάδες) δολώματος κάθε 1-2 μέτρα. Αρουραίοι: 100-140 g (5-7 μονάδες) δολώματος κάθε 5-10 μέτρα. Η ίδια ποσότητα δολώματος ανά δολωματικό σταθμό χρησιμοποιείται για μόνιμα εγκατεστημένα δολώματα. Ωστόσο, οι μόνιμοι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σε προτιμώμενα σημεία εισόδου των τρωκτικών και σημεία κατασκευής φωλιάς, εντός ή σε άμεση γειτνίαση κτιρίων.</p> <p>Αραίωση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονos εφαρμογής: Ο αριθμός των σημείων δόλωσης που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την πίεση των βλαβερών ζώων στην τοποθεσία όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες

Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας

3-10 κιλά σε κουβάδες με καπάκια PP ή HDPE ή PET ή PE ή LDPE και δοχεία που μπορούν να κλείσουν ξανά.
3-10 kg σε δοχείο με επένδυση που μπορεί να κλείσει ξανά τύπου PP ή HDPE ή PET ή PE ή LDPE, όπως μεταλλικά δοχεία ή χαρτονένια κουτιά, αλλά και επικασσιτερωμένα μεταλλικά δοχεία.
Τα προγεμισμένα κουτιά δόλωσης PP ή PE ή LDPE σε υπερσυσκευασία ανά 3-10 kg σε δοχείο PP, PET ή PE που μπορεί να κλείσει ξανά ή χαρτονένιο κουτί που μπορεί να κλείσει ξανά.
Κάθε μονάδα δολώματος ζυγίζει 20 g και είναι επενδυμένη με διάτρητη μεμβράνη πολυολεφίνης.

4.1.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το δόλωμα ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες για να επιτευχθεί ο έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της προσβολής την 1η ημέρα της εφαρμογής. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1-2 ημέρες μετά την πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί. Εάν το δόλωμα σε έναν σταθμό έχει καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα δολώματος στον συγκεκριμένο δολωματικό σταθμό. Αυτό θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο έλεγχο στον συντομότερο χρόνο. Επιθεωρήστε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία), ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και προκειμένου να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Σημειώστε ότι, εάν χρησιμοποιηθεί ανεπαρκής ποσότητα δολώματος οποιαδήποτε στιγμή της εφαρμογής, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτητα αποτελέσματα.

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Μόνιμα δολώματα: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επίσκεψη της περιοχής εφαρμογής το αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Για τους αρουραίους των αγρών, η χρήση περιορίζεται σε μη γεωργικές περιοχές, σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων ΜΟΝΟ σε περίπτωση εισβολών κοντά σε κτίρια (για αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών). Να μην χρησιμοποιείτε σε ανοιχτούς χώρους.

4.1.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη χρήση ενημερώστε τυχόν παριστάμενους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και στα περίχωρά της) σχετικά με την εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε όσο είναι δυνατόν πιθανές πηγές τροφής και νερού) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστων πρακτικών.

Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επανεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.

Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής.

4.1.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.1.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.1.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2 Περιγραφή χρήσης

Χρήση 2 - Χρήση # 2 – Οικιακοί ποντικοί και ποντικοί των αγρών, αρουραίοι των αγρών και αρουραίοι – Επαγγελματίες χρήστες- εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων

Τύπος προϊόντος

PT14 - Τρωκτικοκτόνα

Ακριβής περιγραφή της εγκεκριμένης χρήσης, εάν απαιτείται

Μη εφαρμόσιμο για τρωκτικοκτόνα.

Οργανισμός(οί)-στόχος(οι) (συμπεριλαμβανομένου του σταδίου ανάπτυξης)

επιστημονική ονομασία: Mus musculus
Κοινή ονομασία: Οικιακός ποντικός, συμπεριλαμβανομένων φυλών ανθεκτικών σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα και νεαρά άτομα
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα

επιστημονική ονομασία: Apodemus sylvaticus
Κοινή ονομασία: Ποντικός των δασών/αγρών
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

επιστημονική ονομασία: Microtus arvalis
Κοινή ονομασία: Αρουραίος των αγρών
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

επιστημονική ονομασία: Rattus rattus
Κοινή ονομασία: Αρουραίος της στέγης
στάδιο ανάπτυξης: Ενήλικα και νεαρά άτομα

επιστημονική ονομασία: Rattus norvegicus
Κοινή ονομασία: Καφέ αρουραίος, συμπεριλαμβανομένων φυλών ανθεκτικών σε αντιπηκτικά τρωκτικοκτόνα και νεαρά άτομα

Πεδίο χρήσης

Μέθοδος/-οι εφαρμογής	<p>Εξωτερικοί Χώροι</p> <p>εξωτερικοί χώροι περιμετρικά κτιρίων</p>
	<p>Μέθοδος: Εφαρμογή δολώματος Λεπτομερής περιγραφή: Δόλωμα έτοιμο προς χρήση που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση.</p> <p>Τοποθέτηση δολωμάτων σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία δόλωσης.</p>
Δόση και συχνότητα εφαρμογής	<p>Δόση εφαρμογής: Οικιακός ποντικός: 20-40 g (1 ή 2 μονάδες), ποντικός των αγρών και αρουραίος των αγρών: 40 g (2 μονάδες) δολώματος κάθε 1-2 μέτρα. Αρουραίοι: 100-140 g (5-7 μονάδες) δολώματος κάθε 5-10 μέτρα. Η ίδια ποσότητα δολώματος ανά δολωματικό σταθμό χρησιμοποιείται για μόνιμα εγκατεστημένα δολώματα. Ωστόσο, οι μόνιμοι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να εγκαθίστανται μόνο σε προτιμώμενα σημεία εισόδου των τρωκτικών και σημεία κατασκευής φωλιάς, εντός ή σε άμεση γειτνίαση κτιρίων.</p> <p>Αραιώση (%): -</p> <p>Αριθμός εφαρμογών και χρονος εφαρμογής: Ο αριθμός των σημείων δόλωσης που χρησιμοποιείται εξαρτάται από την πίεση των βλαβερών ζώων στην τοποθεσία όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το προϊόν.</p>
Κατηγορία/-ες χρηστών	<p>Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες</p>
Μεγέθη συσκευασίας και υλικό συσκευασίας	<p>3-10 κιλά σε κουβάδες με καπάκια PP ή HDPE ή PET ή PE ή LDPE και δοχεία που μπορούν να κλείσουν ξανά.</p> <p>3-10 kg σε δοχείο με επένδυση που μπορεί να κλείσει ξανά τύπου PP ή HDPE ή PET ή PE ή LDPE, όπως μεταλλικά δοχεία ή χαρτονένια κουτιά, αλλά και επικασσιτερωμένα μεταλλικά δοχεία.</p> <p>Τα προγεμισμένα κουτιά δόλωσης PP ή PE ή LDPE σε υπερσυσκευασία ανά 3-10 kg σε δοχείο PP, PET ή PE που μπορεί να κλείσει ξανά ή χαρτονένιο κουτί που μπορεί να κλείσει ξανά.</p> <p>Κάθε μονάδα δολώματος ζυγίζει 20 g και είναι επενδυμένη με διάτρητη μεμβράνη πολυολεφίνης.</p>

4.2.1 Οδηγίες χρήσης ανά χρήση

Το δόλωμα ενδέχεται να πρέπει να τοποθετηθεί μόνο για 7 ημέρες για να επιτευχθεί ο έλεγχος, υπό την προϋπόθεση ότι τοποθετείται επαρκές δόλωμα για το μέγεθος της προσβολής την 1η ημέρα της εφαρμογής. Επιθεωρήστε τα δολώματα 1 - 2 ημέρες μετά την πρώτη τοποθέτηση και αντικαταστήστε το δόλωμα που έχει καταναλωθεί. Εάν το δόλωμα σε έναν σταθμό έχει καταναλωθεί πλήρως, αντικαταστήστε το με τη μέγιστη ποσότητα δολώματος στον συγκεκριμένο δολωματικό σταθμό. Αυτό θα εξασφαλίσει τον βέλτιστο έλεγχο στον συντομότερο χρόνο. Επιθεωρήστε τα δολώματα τακτικά (τουλάχιστον εβδομαδιαία), ώστε να ελέγχεται εάν το δόλωμα έχει καταναλωθεί, οι δολωματικοί σταθμοί παραμένουν άθικτοι, καθώς και προκειμένου να απομακρύνονται τα νεκρά τρωκτικά. Συνεχίστε να τοποθετείτε δόλωμα κάθε 7 ημέρες μέχρι να σταματήσει η κατανάλωση. Σημειώστε ότι, εάν χρησιμοποιηθεί ανεπαρκής ποσότητα δολώματος οποιαδήποτε στιγμή της εφαρμογής, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη βέλτιστα αποτελέσματα.

Προστατέψτε το δόλωμα από τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Τοποθετήστε τα σημεία δόλωσης σε περιοχές που δεν είναι επιρρεπείς

σε πλημμύρες.

Αντικαταστήστε το δόλωμα σε σημεία δόλωσης όπου το δόλωμα έχει υποστεί ζημιά από νερό ή έχει μολυνθεί από βρωμιά.

Για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, τα σημεία δόλωσης θα πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε στρατηγικές τοποθεσίες προκειμένου να ελαχιστοποιείται η έκθεση σε είδη που δεν αποτελούν στόχο

Απομακρύνετε το υπολειπόμενο προϊόν με τη λήξη της περιόδου αντιμετώπισης.

Μόνιμα δολώματα: όπου είναι δυνατόν, συνιστάται η επίσκεψη της περιοχής εφαρμογής το αργότερο κάθε 4 εβδομάδες, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε επιλογή ανθεκτικού πληθυσμού.

Ακολουθήστε οποιοσδήποτε συμπληρωματικές οδηγίες που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστης πρακτικής.

Για τους αρουραίους των αγρών, η χρήση περιορίζεται σε μη γεωργικές περιοχές, σε εσωτερικούς χώρους ή σε εξωτερικούς χώρους περιμετρικά των κτιρίων ΜΟΝΟ σε περίπτωση εισβολών κοντά σε κτίρια (για αποφυγή εξάπλωσης ασθενειών). Να μην χρησιμοποιείτε σε ανοιχτούς χώρους.

4.2.2 Μέτρα μετριασμού κινδύνου ανά χρήση

Όπου είναι δυνατόν, πριν από τη χρήση ενημερώστε τυχόν παριστάμενους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή και στα περίχωρά της) σχετικά με την εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει].

Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης προληπτικών μέτρων (καλύψτε τις οπές, απομακρύνετε όσο είναι δυνατόν πιθανές πηγές τροφής και νερού) ώστε να βελτιώσετε την πρόσληψη των δολωμάτων και να μειώσετε την πιθανότητα νέας εισβολής τρωκτικών.

Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης, σύμφωνα με τις συστάσεις που παρέχονται στον σχετικό κώδικα βέλτιστων πρακτικών.

Μην εφαρμόζετε αυτό το προϊόν απευθείας στα λαγούμια.

Η στρατηγική της μόνιμης δόλωσης επιλέγεται αυστηρά σε χώρους με μεγάλη πιθανότητα επανεισβολών, όταν άλλες μέθοδοι καταπολέμησης έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές.

Η στρατηγική μόνιμης τοποθέτησης δολώματος πρέπει να επανεξετάζεται περιοδικά στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των τρωκτικών και της εκτίμησης του κινδύνου νέας εισβολής.

4.2.3 Στοιχεία των πιθανών άμεσων ή έμμεσων επιπτώσεων, οδηγίες πρώτων βοηθειών και επείγοντα μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος που σχετίζονται με τη χρήση

Όταν τοποθετείτε δολωματικούς σταθμούς κοντά σε συστήματα αποχέτευσης νερού, βεβαιωθείτε ότι τα δολώματα δεν έρχονται σε επαφή με το νερό.

4.2.4 Οδηγίες για την ασφαλή τελική διάθεση του προϊόντος και της συσκευασίας του που σχετίζονται με τη χρήση

-

4.2.5 Συνθήκες αποθήκευσης και τη διάρκεια ζωής του προϊόντος υπό κανονικές συνθήκες αποθήκευσης που σχετίζονται με τη χρήση

-

5. Γενικές οδηγίες χρήσης

5.1. Οδηγίες χρήσης

Επαγγελματίες και εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες

- Πριν το χρησιμοποιήσετε, διαβάστε και ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία συνοδεύει το προϊόν ή παρέχεται από το σημείο πώλησης.
- Μην αφαιρείτε ή ανοίγετε τη μεμβράνη που περιέχει το δόλωμα.
- Πριν την έναρξη της εφαρμογής, διενεργήστε επιτόπιο έλεγχο στην προσβεβλημένη περιοχή ώστε να προσδιορίσετε τα είδη των τρωκτικών, τους χώρους δραστηριότητάς τους, καθώς και την πιθανή αιτία και έκταση της προσβολής.
- Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη πυκνότητα δολωματικών σταθμών σε ελαφριές προσβολές από τρωκτικά.
- Χρησιμοποιήστε την υψηλότερη πυκνότητα δολωματικού σταθμού και τον μέγιστο αριθμό μονάδων δολώματος, όπου έχουν εμφανιστεί αρουραίοι ή ποντίκια. Να είστε προσεκτικοί ως προς τον ανεπαρκή δολωματισμό - ακολουθήστε τις συστάσεις της ετικέτας για την ποσότητα του δολώματος ανά σημείο δολώματος και τη συχνότητα των δολωματικών σταθμών.
- Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα φράγμα δολωματικών σταθμών σε ελαφριές προσβολές από τρωκτικά.
- Καθαρίστε το χώρο από πιθανές τροφές στις οποίες έχουν πρόσβαση τα τρωκτικά (π.χ. χυμένοι σπόροι ή απορρίμματα τροφίμων). Ωστόσο, μην καθαρίσετε τον μολυσμένο από τρωκτικά χώρο ακριβώς πριν την έναρξη της διαδικασίας αντιμετώπισης, καθώς κάτι τέτοιο διαταράσσει τον πληθυσμό των τρωκτικών και δυσκολεύει την αποδοχή του δολώματος από τα τρωκτικά.
- Προσπαθήστε να δημιουργήσετε ένα φράγμα δολωματικών σταθμών μεταξύ των περιοχών διαβίωσης και διατροφής.
- Το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο ως μέρος ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης επιβλαβών οργανισμών (IPM), το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, μέτρα υγιεινής και, όπου είναι δυνατόν, φυσικές μεθόδους περιορισμού.
- Όπου είναι δυνατό, οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να στερεώνονται στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές.
- Οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να φέρουν σαφή σήμανση που να δηλώνει ότι περιέχουν τρωκτικοκτόνα και ότι δεν πρέπει να μετακινούνται ή να ανοίγονται (βλέπε παράγραφο 5.3 για τις πληροφορίες που πρέπει να αναγράφονται στην ετικέτα).
- Όταν το προϊόν χρησιμοποιείται σε δημόσιους χώρους, οι περιοχές στις οποίες έχει γίνει εφαρμογή με τρωκτικοκτόνα αλλά και οι δολωματικοί σταθμοί θα πρέπει να επισημαίνονται καθ' όλη τη διάρκεια εφαρμογής ώστε να υπάρχει ειδοποίηση που να επεξηγεί τον κίνδυνο πρωτογενούς ή δευτερογενούς δηλητηρίασης από το τρωκτικοκτόνο, καθώς και τα μέτρα α' βοηθειών που πρέπει να ληφθούν σε περίπτωση δηλητηρίασης.
- Τα δολώματα θα πρέπει να ασφαλιζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην είναι δυνατό να συρθούν εκτός του δολωματικού σταθμού.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από σημεία στα οποία έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα, παραγωγικά ζώα και άλλα ζώα μη στόχους.
- Τοποθετείτε τα δολώματα μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές, καθώς και μακριά από μαγειρικά σκεύη ή επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με αυτά.
- Μην τρώτε, μην πίνετε και μην καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν. Πλύνετε τα χέρια σας και τις περιοχές του σώματος σας που έχουν έρθει σε άμεση επαφή με το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση του.
- Εάν η πρόσληψη του δολώματος από τα τρωκτικά είναι χαμηλή σε σύγκριση με το μέγεθος της προσβολής, εξετάστε το ενδεχόμενο να μετακινήσετε τους δολωματικούς σταθμούς σε άλλα σημεία και να χρησιμοποιήσετε δολώματα με διαφορετική σύνθεση.
- Εάν μετά από 35 ημέρες από την έναρξη της εφαρμογής, συνεχίζεται η κατανάλωση δολωμάτων και δεν παρατηρείται καμία μείωση στη δραστηριότητα των τρωκτικών, τότε θα πρέπει να προσδιοριστεί η πιθανή αιτία που το προκαλεί. Όταν έχουν αποκλειστεί άλλα στοιχεία, εξετάστε τη χρήση τρωκτικοκτόνου με διαφορετικό τρόπο δράσης. Επίσης, εξετάστε το ενδεχόμενο χρήσης παγίδων, ως ένα εναλλακτικό μέτρο ελέγχου.

Επαγγελματίες χρήστες μόνο

- Λάβετε υπόψη προληπτικά μέτρα ελέγχου (π.χ. στεγανοποίηση οπών, αφαίρεση πιθανών τροφών και ποτών στο μέτρο του δυνατού) για να βελτιώσετε την πρόσληψη του προϊόντος και να μειώσετε την πιθανότητα επανεισβολής.
- Τα δολώματα θα πρέπει να τοποθετούνται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).
- Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί καθώς και τους δολωματικούς σταθμούς.

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες μόνο

- Χρησιμοποιήστε τη χαμηλότερη πυκνότητα δολωματικών σταθμών σε ελαφριές προσβολές από τρωκτικά ή σε μόνιμο δόλωμα από εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες.
- Το προϊόν θα πρέπει να τοποθετείται κοντά στα σημεία όπου έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα τρωκτικών (π.χ. προσδιορισμένες διαδρομές, σημεία κατασκευής φωλιάς, σημεία τροφής, τρύπες, λαγούμια, κ.λπ.).

5.2. Μέτρα μετριασμού κινδύνου

Επαγγελματίες και εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες

- Όπου είναι δυνατό, πριν την εφαρμογή ενημερώστε τυχόν παριστάμενους (π.χ. άτομα που διαμένουν ή εργάζονται στην περιοχή όπου θα γίνει εφαρμογή) για το ότι θα λάβει χώρα εφαρμογή για την καταπολέμηση τρωκτικών [σύμφωνα με τον ισχύοντα κώδικα ορθής πρακτικής, εάν υπάρχει]
- Απορρίψτε τα νεκρά τρωκτικά σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος].
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν στα πλαίσια εφαρμογής με τη διαδικασία της περιοδικής δόλωσης.

Επαγγελματίες χρήστες μόνο

- Για να μειωθεί ο κίνδυνος δευτερογενούς δηλητηρίασης, αναζητήστε και απομακρύνετε τα νεκρά τρωκτικά ανά τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αντιμετώπισης (π.χ. τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα). [Όπου χρειάζεται, διευκρινίστε εάν απαιτείται συχνότερη ή καθημερινή επιθεώρηση].
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής.
- Οι πληροφορίες προϊόντος (δηλ. ετικέτα ή / και φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι:
 - το προϊόν δεν θα πρέπει να διατίθεται στο ευρύ κοινό (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").
 - το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση (π.χ. χρήση μόνο σε δολωματικούς σταθμούς ανθεκτικούς στην παραβίαση).
 - οι χρήστες θα πρέπει να σημαίνουν κατάλληλα τους δολωματικούς σταθμούς με τις πληροφορίες που αναγράφονται στην παράγραφο 5.3 της εθνικής Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος (π.χ. σήμανση δολωματικών σταθμών σύμφωνα με τις συστάσεις του προϊόντος).
- Η χρήση του προϊόντος θα πρέπει να εξαλείψει τα τρωκτικά εντός 35 ημερών. Οι πληροφορίες του προϊόντος (δηλαδή η ετικέτα ή/και το φυλλάδιο) θα πρέπει να καθιστούν σαφές ότι σε περίπτωση υποψίας έλλειψης αποτελεσματικότητας μέχρι το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης (δηλαδή σε περίπτωση που εξακολουθεί να παρατηρείται δραστηριότητα τρωκτικών), ο χρήστης θα πρέπει να συμβουλευθεί τον προμηθευτή του προϊόντος ή να καλέσει έναν επαγγελματία μυοκτονιών.
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς.
- Μην χρησιμοποιείται το προϊόν ως μόνιμο δόλωμα ή για την πρόληψη προσβολής από τρωκτικά ή την παρακολούθηση της δραστηριότητας των τρωκτικών.

Εκπαιδευμένοι επαγγελματίες χρήστες μόνο

- Οι πληροφορίες προϊόντος (δηλ. ετικέτα ή / και φυλλάδιο) πρέπει να δείχνουν σαφώς ότι το προϊόν πρέπει να παρέχεται μόνο σε εκπαιδευμένους επαγγελματίες χρήστες που διαθέτουν πιστοποίηση που αποδεικνύει τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπαίδευσης (π.χ. "μόνο για εκπαιδευμένους επαγγελματίες").
- Τα δολώματα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για διάστημα άνω των 35 ημερών χωρίς να έχει προηγηθεί αξιολόγηση της κατάστασης της προσβολής και της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής [Εκτός εάν το προϊόν έχει λάβει έγκριση κυκλοφορίας και για χρήση ως μόνιμο δόλωμα].
- Μεταξύ των εφαρμογών, μην πλένετε με νερό τους δολωματικούς σταθμούς ή τα σύνεργα που χρησιμοποιείτε σε καλυμμένα και προστατευμένα σημεία τοποθέτησης δολωμάτων.

5.3. Ειδικές πιθανές άμεσες ή έμμεσες επιδράσεις και οδηγίες α' βοήθειών

• Η χοληκαλσιφερόλη προκαλεί υπερασβεστιαμία σε τοξικές δόσεις. Αντιμετωπίστε ανάλογα με τα συμπτώματα. Η χρήση θα περιλαμβάνει διαίτα με χαμηλή περιεκτικότητα σε ασβέστιο, υψηλή πρόσληψη αλατιού και υγρών και αποφυγή έκθεσης στο ηλιακό φως. Η παρακολούθηση των επιπέδων ασβεστίου στον ορό μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία. Η κορτιζόνη έχει χρησιμοποιηθεί επιτυχώς σε ορισμένες περιπτώσεις.

• Πρώτες βοήθειες

ο Εάν απαιτείται ιατρική συμβουλή, έχετε στη διάθεσή σας το δοχείο συσκευασίας ή την ετικέτα του προϊόντος.

ο ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΠΣΝΟΗΣ: Λάβετε ιατρική συμβουλή / φροντίδα, εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.

ο ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Λάβετε ιατρική συμβουλή / φροντίδα, εάν αισθάνεστε αδιαθεσία.

ο ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Εάν εμφανιστούν συμπτώματα, ξεπλύνετε με νερό. Αφαιρέστε τους φακούς επαφής, εάν υπάρχουν και είναι εύκολο να το κάνετε. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / ιατρό.

ο ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Ξεπλύνετε το στόμα. Λάβετε άμεση ιατρική συμβουλή / φροντίδα. Επικοινωνήστε με κτηνίατρο, σε περίπτωση κατάποσης από κατοικίδιο.

• Οι σταθμοί δολώματος πρέπει να φέρουν ετικέτα με την ακόλουθη πληροφορία: «μην μετακινείτε ούτε ανοίγετε», «περιέχει τρωκτικοκτόνο», «όνομα προϊόντος ή αριθμός έγκρισης χρήσης», «δραστική ουσία (- ες)» και «σε περίπτωση συμβάντος, καλέστε το κέντρο δηλητηριάσεων [εισαγάγετε τον εθνικό αριθμό τηλεφώνου]»

• Επικίνδυνο για τα άγρια ζώα.

5.4. Οδηγίες για την ασφαλή διάθεση του προϊόντος και του περιέκτη του

• Κατά το τέλος της περιόδου αντιμετώπισης, απορρίψτε τυχόν δόλωμα που δεν έχει καταναλωθεί και τη συσκευασία του προϊόντος σύμφωνα με τις τοπικές απαιτήσεις [Η μέθοδος θα πρέπει να περιγράφεται στην εθνική Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος και να αναγράφεται επίσης και επί της ετικέτας του προϊόντος

5.5. Συνθήκες αποθήκευσης και διάρκειας ζωής του προϊόντος σε κανονικές συνθήκες αποθήκευσης

• Αποθηκεύστε σε στεγνό, δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείτε το δοχείο κλειστό και μακριά από το ηλιακό φως.

• Αποθηκεύστε μακριά από τρόφιμα και ζωοτροφές και προϊόντα που ενδέχεται να έχουν μυρωδιά.

• Αποθηκεύστε σε χώρους στους οποίους δεν έχουν πρόσβαση παιδιά, πτηνά, κατοικίδια ζώα και παραγωγικά ζώα.

• Διάρκεια ζωής προϊόντος: 5 χρόνια.

6. Άλλες πληροφορίες

- Ο θάνατος των τρωκτικών θα επέλθει 2 - 5 ημέρες μετά την κατάποση θανατηφόρου δόσης του δολώματος.
 - Τα τρωκτικά μπορεί να είναι φορείς νόσων. Μην αγγίζετε νεκρά τρωκτικά με γυμνά χέρια, χρησιμοποιείτε γάντια ή εργαλεία, όπως λαβίδες, κατά την απόρριψή τους.
 - Το παρόν προϊόν περιέχει έναν πικραντικό παράγοντα και μια χρωστική ουσία.
- Περιεκτικότητα δραστικής ουσίας: 0,077% (επί τοις εκατό κατά βάρος) (τεχνικό), 0,075% (επί τοις εκατό κατά βάρος) (καθαρό).