

# Résumé des caractéristiques du produit pour un produit biocide

**Nom du produit:** JADE BLOC

**Type(s) de produit:** TP14 - Rodenticides

TP14 - Rodenticides

TP14 - Rodenticides

TP14 - Rodenticides

**Numéro de l'autorisation:** FR-2014-0137

**Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3:** FR-0005827-0000

## Table des matières

Informations administratives	1
1.1. Noms commerciaux du produit	1
1.2. Titulaire de l'autorisation	1
1.3. Fabricant(s) des produits biocides	1
1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)	2
2. Composition et formulation du produit	2
2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide	2
2.2. Type de formulation	2
3. Mentions de danger et conseils de prudence	2
4. Utilisation(s) autorisée(s)	3
4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques	4
4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	4
4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les	4
4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son	5
4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans	5
4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques	6
4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	6
4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les	6
4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son	7
4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans	7
4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques	8
4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	8
4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les	8
4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son	8
4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans	8
4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques	10
4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques	10
4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les	10

4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son	10
4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans	10
5. Conditions générales d'utilisation	10
5.1. Consignes d'utilisation	10
5.2. Mesures de gestion des risques	11
5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers	11
5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage	12
5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales	12
6. Autres informations	12

## Informations administratives

### 1.1. Noms commerciaux du produit

JADE BLOC
RACAN BLOC BROMA
VULCANO BLOC BROMA
BLOC BROMA

### 1.2. Titulaire de l'autorisation

<b>Nom et adresse du titulaire de l'autorisation</b>	Nom	LODI S.A.S.
	Adresse	Parc d'Activités des Quatre Routes 35390 Grand Fougeray France
<b>Numéro de l'autorisation</b>	FR-2014-0137	
<b>Numéro de référence de l'autorisation R4BP 3</b>	FR-0005827-0000	
<b>Date de l'autorisation</b>	30/09/2012	
<b>Date d'expiration de l'autorisation</b>	26/04/2023	

### 1.3. Fabricant(s) des produits biocides

<b>Nom du fabricant</b>	LODI S.A.S.
<b>Adresse du fabricant</b>	Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray France
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Parc d'activités des quatre routes 35390 Grand Fougeray France
	Parc d'activités du Pays du Grand Fougeray Espace Nord 24 et 26 rue des Pionniers 35390 Grand Fougeray France

#### 1.4. Fabricant(s) de(s) la substance(s) active(s)

<b>Substance active</b>	12 - Bromadiolone
<b>Nom du fabricant</b>	PelGar International Ltd.
<b>Adresse du fabricant</b>	Unit 13 Newman Lane GU34 2QR Alton Royaume-Uni
<b>Emplacement des sites de fabrication</b>	Via Tre Ponti 37050 S. Maria di Zevio Italie

## 2. Composition et formulation du produit

### 2.1. Informations qualitatives et quantitatives sur la composition du produit biocide

Nom commun	Nom IUPAC	Fonction	Numéro CAS	Numéro CE	Teneur (%)
Bromadiolone	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Substance active	28772-56-7	249-205-9	0.005

### 2.2. Type de formulation

Appât prêt à l'emploi sous forme de bloc

## 3. Mentions de danger et conseils de prudence

<b>Mention de danger</b>	Risque avéré d'effets graves pour les organes (sang) à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée .  Peut nuire au fœtus.
<b>Conseils de prudence</b>	Se procurer les instructions avant utilisation.  Ne pas manipuler avant d' avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.  Ne pas respirer les .  Se laver soigneusement après manipulation.

Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

Porter .

EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: Consulter un médecin.

Consulter un médecin en cas de malaise.

Garder sous clef.

Éliminer le dans

## 4. Utilisation(s) autorisée(s)

### 4.1 Description de l'utilisation

#### Utilisation 1 - Souris et rats – Professionnels – Intérieur

<b>Type de produit</b>	TP14 - Rodenticides
<b>Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée</b>	Ne s'applique pas aux rodenticides Intérieur
<b>Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)</b>	Mus musculus-souris domestique-Juvéniles et adultes Rattus norvegicus-rat brun-Juvéniles et adultes Rattus rattus-rat noir-Juvéniles et adultes
<b>Domaine d'utilisation</b>	Intérieur  Intérieur
<b>Méthode(s) d'application</b>	Application des appâts - Formulations de l'appât: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés.
<b>Taux et fréquences d'application</b>	Rats : - Forte infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. Souris : - Forte infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. - 0 - Appât: <u>Rats :</u> - Forte infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. <u>Souris :</u> - Forte infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres.

## Catégorie(s) d'utilisateurs

Professionnel

## Dimensions et matériaux d'emballage

Conditionnement minimum de 5 kg.

Bloc de 20g, 30g (individuellement emballé dans un sachet PE ou PP) ou en vrac puis conditionnés dans:

- Seau (PE ou PP) :

20g: 5 kg (250\*20), 5.5 kg (275\*20), 6 kg (300\*20), 6.5 kg (325\*20) , 7 kg (350\*20), 7.5 kg (375\*20), 8 kg (400\*20), 8.5 kg (425\*20), 9 kg (450\*20), 9.5 kg (475\*20), 10 kg (500\*20)

30g: 5 kg (167\*30), 5.5 kg (184\*30), 6 k g(200\*30), 6.5 kg (217\*30), 7 kg (234\*30), 7.5 kg (250\*30), 8 kg (267\*30), 8.5 kg (284\*30), 9 kg (300\*30), 9.5 kg (347\*30), 10 kg (334\*30)

- Carton (+ une sachet intérieure en PE si le bloc est nu) :

20g: 5 kg (250\*20), 5.5 kg (275\*20), 6 kg (300\*20), 6.5 kg (325\*20) , 7 kg (350\*20), 7.5 kg (375\*20), 8 kg (400\*20), 8.5 kg (425\*20), 9 kg (450\*20), 9.5 kg (475\*20), 10 kg (500\*20)

30g: 5 kg (167\*30), 5.5 kg (184\*30), 6 k g(200\*30), 6.5 kg (217\*30), 7 kg (234\*30), 7.5 kg (250\*30), 8 kg (267\*30), 8.5 kg (284\*30), 9 kg (300\*30), 9.5 kg (347\*30), 10 kg (334\*30)

- Boîte d'appât pré appâtée (PP, PVC,PS) contenant un bloc de 20g ou de 30g, dans un carton de:  
5 kg (250\*20g) or (167\*30g)

### 4.1.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement.

### 4.1.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

### 4.1.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.1.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-
---

#### 4.1.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-
---

### 4.2 Description de l'utilisation

#### Utilisation 2 - Souris et rats – Professionnels – Extérieur autour des bâtiments

Type de produit	TP14 - Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides Intérieur
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Mus musculus-souris domestique-Juvéniles et adultes Rattus norvegicus-rat brun-Juvéniles et adultes Rattus rattus-rat noir-Juvéniles et adultes
Domaine d'utilisation	Extérieur Extérieur autour des bâtiments
Méthode(s) d'application	Application des appâts - Formulations de l'appât: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés.
Taux et fréquences d'application	Rats : - Forte infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. Souris : - Forte infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. - 0 - Appât: <u>Rats :</u> - Forte infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. <u>Souris :</u> - Forte infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 20 g à 30 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	

## Dimensions et matériaux d'emballage

Professionnel

Conditionnement minimum de 5 kg.

Bloc de 20g, 30g (individuellement emballé dans un sachet PE ou PP) ou en vrac puis conditionnés dans:

- Seau (PE ou PP) :

20g: 5 kg (250\*20), 5.5 kg (275\*20), 6 kg (300\*20), 6.5 kg (325\*20), 7 kg (350\*20), 7.5 kg (375\*20), 8 kg (400\*20), 8.5 kg (425\*20), 9 kg (450\*20), 9.5 kg (475\*20), 10 kg (500\*20)

30g: 5 kg (167\*30), 5.5 kg (184\*30), 6 k g(200\*30), 6.5 kg (217\*30), 7 kg (234\*30), 7.5 kg (250\*30), 8 kg (267\*30), 8.5 kg (284\*30), 9 kg (300\*30), 9.5 kg (347\*30), 10 kg (334\*30)

- Carton (+ une sachet intérieure en PE si le bloc est nu) :

20g: 5 kg (250 \*20), 5.5 kg (275\*20), 6 kg (300\*20), 6.5 kg (325\*20) , 7 kg (350\*20), 7.5 kg (375\*20), 8 kg (400\*20), 8.5 kg (425\*20), 9 kg (450\*20), 9.5 kg (475\*20), 10 kg (500\*20)

30g: 5 kg (167\*30), 5.5 kg (184\*30), 6 k g(200\*30), 6.5 kg (217\*30), 7 kg (234\*30), 7.5 kg (250\*30), 8 kg (267\*30), 8.5 kg (284\*30), 9 kg (300\*30), 9.5 kg (347\*30), 10 kg (334\*30)

- Boîte d'appât pré appâtée (PP, PVC,PS) contenant un bloc de 20g ou de 30g, dans un carton de:  
5 kg (250\*20g) or (167\*30g)

### 4.2.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement
- Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

### 4.2.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Envisager l'adoption de mesures de lutte préventives (combler les trous, retirer autant que possible les aliments et boissons éventuels, etc.) pour améliorer l'ingestion du produit et réduire le risque de nouvelle infestation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- Ne pas utiliser le produit en guise d'appât permanent pour éviter l'invasion de rongeurs ou surveiller les activités des rongeurs.
- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.
- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

### 4.2.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.2.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-
---

#### 4.2.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-
---

### 4.3 Description de l'utilisation

#### Utilisation 3 - Rats – Professionnels – Zones ouvertes extérieures, décharges extérieures et déchetteries

Type de produit	TP14 - Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides Intérieur
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Rattus norvegicus-rat brun-Juvéniles et adultes Rattus rattus-rat noir-Juvéniles et adultes
Domaine d'utilisation	Intérieur Intérieur
Méthode(s) d'application	Application des appâts - Formulations de l'appât: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés.
Taux et fréquences d'application	Forte infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres. - 0 - Appât: - Forte infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 5 mètres. - Faible infestation: 60 g à 100 g d'appât par point d'appât espacés de 10 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement minimum de 5 kg. Bloc de 20g, 30g (individuellement emballé dans un sachet PE ou PP) ou en vrac puis conditionnés dans: - Seau (PE ou PP) : 20g: 5 kg (250 *20), 5.5 kg (275*20), 6 kg (300*20), 6.5 kg (325*20) , 7 kg (350*20), 7.5 kg (375*20), 8 kg (400*20), 8.5 kg (425*20), 9 kg (450*20), 9.5 kg (475*20), 10 kg

(500\*20)

30g: 5 kg (167\*30), 5.5 kg (184\*30), 6 k g(200\*30), 6.5 kg (217\*30), 7 kg (234\*30), 7.5 kg (250\*30), 8 kg (267\*30), 8.5 kg (284\*30), 9 kg (300\*30), 9.5 kg (347\*30), 10 kg (334\*30)

- Carton (+ une sachet intérieure en PE si le bloc est nu) :

20g: 5 kg (250 \*20), 5.5 kg (275\*20), 6 kg (300\*20), 6.5 kg (325\*20) , 7 kg (350\*20), 7.5 kg (375\*20), 8 kg (400\*20), 8.5 kg (425\*20), 9 kg (450\*20), 9.5 kg (475\*20), 10 kg (500\*20)

30g: 5 kg (167\*30), 5.5 kg (184\*30), 6 k g(200\*30), 6.5 kg (217\*30), 7 kg (234\*30), 7.5 kg (250\*30), 8 kg (267\*30), 8.5 kg (284\*30), 9 kg (300\*30), 9.5 kg (347\*30), 10 kg (334\*30)

- Boîte d'appât pré appâtée (PP, PVC, PS) contenant un bloc de 20g ou de 30g, dans un carton de:

5 kg (250\*20g) or (167\*30g)

#### 4.3.1 Consignes d'utilisation spécifiques

- Protéger l'appât des conditions atmosphériques. Placer les points d'appât dans des endroits qui ne risquent pas d'être inondés.
- Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Retirer tout produit restant au terme de la période de traitement Pour l'utilisation à l'extérieur, les points d'appâtage doivent être couverts et placés dans des sites permettant de minimiser l'exposition des espèces non cibles.

#### 4.3.2 Mesures de gestion des risques spécifiques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels (par exemple, les usagers de la zone traitée et ses environs) de la campagne de dératisation.
- Pour réduire le risque d'empoisonnement secondaire, chercher et retirer régulièrement les cadavres de rongeurs pendant la période de traitement.
- Ne pas placer directement ce produit dans les terriers.

#### 4.3.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Lorsque des points d'appât sont placés à proximité de systèmes d'évacuation des eaux, s'assurer que l'appât n'entre pas en contact avec l'eau.

#### 4.3.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage

-

#### 4.3.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

-

#### 4.4 Description de l'utilisation

##### Utilisation 4 - Rats – Professionnels – Egouts

Type de produit	TP14 - Rodenticides
Le cas échéant, description exacte de l'utilisation autorisée	Ne s'applique pas aux rodenticides Egouts
Organisme(s) cible(s) (y compris stade de développement)	Rattus norvegicus-rat brun-Juvéniles et adultes
Domaine d'utilisation	Autre Egouts
Méthode(s) d'application	Application des appâts - Formulations de l'appât: - Appât prêt à l'emploi à utiliser dans des postes d'appâtage sécurisés. - Points d'appâts couverts et protégés.
Taux et fréquences d'application	Forte infestation: 200 g à 300 g d'appât par bouche d'égout espacés de 30 mètres. - Faible infestation: 200 g à 300 g d'appât par bouche d'égout espacés de 50 mètres. - 0 - Appât: <u>Rats</u> : - Forte infestation: 200 g à 300 g d'appât par bouche d'égout espacés de 30 mètres. - Faible infestation: 200 g à 300 g d'appât par bouche d'égout espacés de 50 mètres.
Catégorie(s) d'utilisateurs	Professionnel
Dimensions et matériaux d'emballage	Conditionnement minimum de 5 kg.  Bloc en vrac de 100g avec crochet (individuellement emballé dans un sachet PE ou PP) puis conditionnés dans:  Seau (PE ou PP) :  5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg (100*100)  Carton (+ une sache intérieure en PE si le bloc est nu)  5 kg (50*100), 5.5 kg (55*100), 6 kg (60*100), 6.5 kg (65*100), 7 kg (70*100), 7.5 kg (75*100), 8 kg (80*100), 8.5 kg (85*100), 9 kg (90*100), 9.5 kg (95*100), 10 kg

(100\*100)

#### **4.4.1 Consignes d'utilisation spécifiques**

- Les appâts doivent être appliqués de façon à ne pas entrer en contact avec l'eau et à ne pas pouvoir être déplacés.

#### **4.4.2 Mesures de gestion des risques spécifiques**

- Ne pas utiliser le produit dans le cadre de traitements par appâtage pulsé.

#### **4.4.3 Le cas échéant, les indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement**

-

#### **4.4.4 Le cas échéant, les instructions pour l'élimination en toute sécurité du produit et son emballage**

-

#### **4.4.5 Le cas échéant, les conditions de stockage et la durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage**

-

### **5. Conditions générales d'utilisation**

#### **5.1. Consignes d'utilisation**

- Lire et respecter les informations sur le produit ainsi que toutes les informations qui accompagnent le produit ou celles fournies sur le point de vente avant de l'utiliser.
- Avant de placer un appât, faire un diagnostic préalable et une évaluation sur site de la zone infestée pour identifier les espèces de rongeurs, leurs lieux d'activité et déterminer la cause probable ainsi que l'ampleur de l'infestation.
- Retirer toute nourriture facilement accessible pour les rongeurs (par exemple, des céréales éparpillées ou des déchets alimentaires). Par ailleurs, ne pas nettoyer la zone infestée juste avant le traitement car cela perturbe la population des rongeurs et rend l'acceptation de l'appât plus difficile.
- Le produit ne doit être utilisé que dans le cadre d'un système de lutte intégrée incluant notamment des mesures d'hygiène et, si possible, des méthodes physiques de contrôle.
- Le produit doit être placé à proximité immédiate des endroits où une activité de rongeurs a été observée (par exemple, parcours, sites de nidification, parcs d'engraissement, trous, terriers, etc.)
- Les postes d'appâtage doivent, si possible, être fixés au sol ou à d'autres structures.
- Les postes d'appâtage doivent être clairement étiquetés pour indiquer qu'ils contiennent des rodenticides et qu'ils ne doivent être ni déplacés ni ouverts (se reporter à la section 5.3 pour connaître les informations devant figurer sur l'étiquette).
- Lorsque le produit est utilisé dans des lieux publics, les zones traitées doivent être signalées pendant la période de traitement et une note expliquant le risque d'empoisonnement primaire ou secondaire par l'anticoagulant ainsi que les premières mesures à adopter en cas d'empoisonnement doit être apposée à proximité des appâts.
- L'appât doit être sécurisé de façon à ce qu'il ne puisse pas être déplacé à l'extérieur du poste d'appâtage.
- Placer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques, animaux d'élevage et autres animaux non cibles.
- Placer le produit à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux, ainsi que des ustensiles ou des surfaces entrant en contact avec ces derniers.
- Porter des gants de protection résistants aux produits chimiques pendant la phase de manipulation du produit (le matériau des gants devra être précisé par le titulaire de l'autorisation dans les informations sur le produit).
- Ne pas manger, boire, ni fumer lors de l'utilisation du produit. Se laver les mains et toute zone de la peau directement exposée après avoir utilisé le produit.
- Les postes d'appâtage doivent être inspectés tous les 2 à 3 jours (pour le traitement contre les souris) ou 5 à 7 jours (pour le traitement contre les rats) après le début du traitement, puis au moins une fois par semaine par la suite, dans le but de vérifier si l'appât est accepté et si les postes d'appâtage sont intacts et de retirer les cadavres de rongeurs. Rechargez le poste d'appâtage au besoin. Remplacer tout appât qui a été altéré par l'eau ou contaminé par des saletés.
- Si la consommation de l'appât est faible par rapport à l'étendue apparente de l'infestation, envisager de placer des postes d'appâtage à d'autres endroits et d'opter pour une autre formulation d'appât.
- Si, après une période de traitement de 35 jours, les appâts continuent d'être consommés et qu'aucune réduction de l'activité des rongeurs n'est observée, il convient d'en déterminer la cause probable. Si d'autres éléments ont été exclus, il est probable que vous ayez affaire à des rongeurs résistants: dans ce cas, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, le cas échéant, ou d'un rodenticide anticoagulant plus puissant. Envisager également l'utilisation de pièges à titre de mesure de contrôle alternative.
- Ne pas ouvrir les sachets contenant l'appât.

## 5.2. Mesures de gestion des risques

- Si possible, avant tout traitement, informer les passants éventuels de la campagne de dératisation.
- Les informations sur le produit (c'est-à-dire, l'étiquette et/ou la brochure) doivent indiquer clairement que le produit ne doit être délivré qu'à des utilisateurs professionnels formés, disposant d'une certification attestant qu'ils respectent les exigences applicables en matière de formation (par exemple «à l'usage des professionnels formés uniquement»).
- Ne pas utiliser dans des zones où l'on peut suspecter une résistance à la substance active.
- Les produits ne doivent pas être utilisés au-delà de 35 jours sans évaluation du statut de l'infestation et de l'efficacité du traitement.
- Ne pas alterner l'utilisation de différents anticoagulants d'efficacité comparable ou inférieure aux fins de la gestion de la résistance. Pour une utilisation alternée, envisager l'utilisation d'un rodenticide non anticoagulant, si disponible, ou d'un anticoagulant plus puissant.
- Ne pas laver à l'eau les postes d'appâtage entre les applications ou les ustensiles utilisés dans les postes d'appâtage.
- Éliminer les cadavres des rongeurs dans un circuit de collecte approprié.

## 5.3. Indications spécifiques relatives aux effets directs ou indirects, les instructions de premiers secours et les mesures d'urgence pour protéger l'environnement

- Ce produit contient une substance anticoagulante. En cas d'ingestion, parmi les symptômes pouvant apparaître, parfois avec un certain retard, figurent des saignements de nez et des saignements gingivaux. Dans certains cas graves, des contusions et la présence de sang dans les selles ou les urines peuvent être observées.
- Antidote: Administration de vitamine K1 par du personnel médical/vétérinaire uniquement.
- En cas:
  - d'exposition cutanée, nettoyer la peau à l'eau puis à l'eau savonneuse;
  - d'exposition oculaire, rincer les yeux avec une solution de rinçage oculaire ou de l'eau en gardant les paupières ouvertes au moins 10 minutes;
  - d'exposition orale, rincer soigneusement la bouche avec de l'eau.
- Ne jamais rien administrer par voie orale à une personne inconsciente.
- Ne pas provoquer de vomissement.
- En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin et présentez-lui le contenant du produit ou l'étiquette [insérer les informations nationales spécifiques]. Contacter un vétérinaire en cas d'ingestion par un animal domestique.
- Chaque poste d'appâtage doit être muni d'une étiquette mentionnant les informations suivantes: «ne pas déplacer ni ouvrir»; «contient un rodenticide»; «nom du produit ou numéro d'autorisation»; «substance(s) active(s)» et «en cas d'incident, contacter un centre antipoison [...]».
- Dangereux pour la faune.

#### 5.4. Consignes pour une élimination sûre du produit et de son emballage

- Une fois le traitement terminé, éliminer l'appât qui n'a pas été mangé ainsi que l'emballage, dans un circuit de collecte approprié.

#### 5.5. Conditions de stockage et durée de conservation du produit dans des conditions normales de stockage

- Conserver le produit dans un endroit sec, frais et bien ventilé. Maintenir le contenant bien fermé et à l'abri de toute exposition directe au soleil.
- Entreposer le produit hors de la portée des enfants, oiseaux, animaux domestiques et animaux d'élevage.
- Durée de conservation : 24 mois

#### 6. Autres informations

- Il conviendra de mettre en place un programme de suivi de la résistance des populations de rongeurs à la substance active bromadiolone et de fournir les résultats de ce suivi au renouvellement du produit.
- En raison de leur mode d'action retardé, les rodenticides anticoagulants agissent entre 4 et 10 jours après consommation de l'appât.
- Les rongeurs peuvent être porteurs de maladies. Ne pas toucher les cadavres de rongeurs à mains nues; porter des gants ou utiliser des instruments tels que des pinces pour les éliminer.
- Ce produit contient un agent amérisant et un colorant.