

# Zhrnutie charakteristík biocídneho výrobku

**Názov výrobkov:** Dip es silver

**Typ(y) výrobku:** Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

**Číslo autorizácie:** EU-0018724-0000

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3:** EU-0018724-0005

## Obsah

Administratívne informácie	1
1.1. Obchodné názvy výrobku	1
1.2. Držiteľ autorizácie	1
1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov	1
1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)	1
2. Zloženie a úprava výrobku	3
2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku	3
2.2. Typ úpravy	3
3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia	3
4. Autorizované použite(ia)	3
5. Všeobecné pokyny pre použitie	12
5.1. Pokyny na používanie	12
5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika	12
5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia	12
5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu	12
5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok	13
6. Ďalšie informácie	13

## Administratívne informácie

### 1.1. Obchodné názvy výrobku

Dip es silver
---------------

### 1.2. Držiteľ autorizácie

**Názov a adresa držiteľa autorizácie**

Názov/Meno	CVAS Development GmbH
Adresa	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Nemecko

**Číslo autorizácie**

EU-0018724-0000 1-4
---------------------

**Referenčné číslo záznamu v R4BP 3**

EU-0018724-0005
-----------------

**Dátum autorizácie**

18/12/2018
------------

**Dátum skončenia platnosti autorizácie**

30/11/2028
------------

### 1.3. Výrobca/výrobcovia biocídnych výrobkov

**Meno/Názov výrobcu**

Arthur Schopf Hygiene GmbH & Co. KG
-------------------------------------

**Adresa výrobcu**

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Nemecko
--

**Miesto výrobných priestorov**

Pfaffensteinstr. 1 83115 Neubeuern Nemecko
--

### 1.4. Výrobca(ovia) účinnej(ých) látky(látok)

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Cosayach Nitratos S.A.
<b>Adresa výrobcu</b>	Amunategui 178 nedefinované Santiago Čile
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	S.C.M. Cosayach Cala Cala nedefinované Pozo Almonte Čile

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	ACF Minera S.A.
<b>Adresa výrobcu</b>	San Martin No 499 nedefinované Iquique Čile
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Lagunas mine nedefinované Pozo Almonte Čile

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	SQM S.A.
<b>Adresa výrobcu</b>	Los Militares 4290, Piso 4 nedefinované Las Condes Čile
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Nueva Victoria plant nedefinované Pedro de Valdivia plant Čile

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
<b>Adresa výrobcu</b>	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonsko
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonsko

<b>Účinná látka</b>	1319 - Jód
<b>Meno/Názov výrobcu</b>	Norkem Limited (výrobca PVP-iodine)
<b>Adresa výrobcu</b>	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Spojené kráľovstvo
<b>Miesto výrobných priestorov</b>	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Spojené kráľovstvo

## 2. Zloženie a úprava výrobku

### 2.1. Kvalitatívne a kvantitatívne údaje o zložení biocídneho výrobku

Bežný názov	Názov IUPAC	Funkcia	CAS	EC	Obsah (%)
Jód		Účinná látka	7553-56-2	231-442-4	0,3
kyselina octová	Acetic acid		64-19-7	200-580-7	0

### 2.2. Typ úpravy

AL - Iné tekutiny

## 3. Výstražné a bezpečnostné upozornenia

### Výstražné upozornenia

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

### Bezpečnostné upozornenia

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia.

Zneškodnite obsah v súlade s miestnymi /regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

Zneškodnite nádobu v súlade s miestnymi /regionálnymi/ vnútroštátnymi/ medzinárodnými predpismi.

## 4. Autorizované použite(ia)

### 4.1 Opis použitia

**Použitie 1 - Použitie č. 4.1 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov ručným namáčaním po dojení**

### Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Nie je relevantné
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	<p>Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: vegetatívne bunky</p> <p>Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: vegetatívne bunky</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnúťorné</p> <p>Dezinfekcia strukov dojnych zvierat (dojnic) na použitie po dojení</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Ručné namáčanie pomocou namáčačej nádoby -</p> <p>Pozri návod na použitie</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Kravy: 5 ml na ošetrovanie - 0% -</p> <p>Aplikácia po dojení: 2 – 3x/deň (po každom dojení)</p>
<b>Kategória(ie) používateľ'ov</b>	Profesionálne
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Kanister (HDPE): 5 – 60 kg barel (HDPE): 60 – 200 kg IBC nádrž (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

#### 4.1.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.  
Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.  
Naplníte zásobník prípravkom RTU pri predpokladanej dávke 5 ml prípravku na kravu a namáčačiu nádobku naskrutkujte navrch.  
Zabráňte odtekaní nadbytočnej tekutiny.  
Bezprostredne pred dojením struky starostlivo očistite utieraním jednou papierovou utierkou/handričkou.  
Po dojení stlačte zásobník a na každý struk zospodu nasuňte namáčačiu nádobku. Do dezinfekčného prostriedku sa musí ponoriť aspoň 3 cm časť struku.  
V prípade potreby stlačte zásobník a doplňte nádobku namáčačej jednotky. V prípade potreby doplňte zásobník čerstvým dezinfekčným prostriedkom.  
Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenja. Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň 5 minút.  
Po dezinfekcii vyprázdnite zásobník. Vyčistite zásobník a namáčačiu nádobku opláchnutím vodou.

#### 4.1.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

V prípade, že je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po ňom, musí sa na dezinfekciu pred dojením zväžiť použitie iného prípravku, ktorý neobsahuje jód.

#### 4.1.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.1.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

See general directions for use.

#### 4.2 Opis použitia

##### Použitie 2 - Použitie č. 4.2 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov ručným postrekom mechanickým postrekovačom po dojení

<b>Typ výrobku</b>	Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena
<b>Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia</b>	Nie je relevantné
<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	Vedecký názov: Baktérie Bežný názov: Baktérie Vývojové štádium: vegetatívne bunky  Vedecký názov: Kvasinky Bežný názov: Kvasinky Vývojové štádium: vegetatívne bunky
<b>Oblasti použitia</b>	Vnútorne  Dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc) na použitie po dojení
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	Ručný postrek pomocou mechanického postrekovača -  Pozri návod na použitie

**Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie**

Kravy: 5 ml na ošetrovanie - 0% -  
Aplikácia po dojení: 2 – 3x/deň (po každom dojení)

**Kategória(ie) používateľ'ov**

Profesionálne

**Veľkosti balenia a obalový materiál**

Kanister (HDPE): 5 – 60 kg  
barel (HDPE): 60 – 200 kg  
IBC nádrž (HDPE): 600 - 1000 kg

**4.2.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie**

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.  
Na naplnenie prípravku do aplikačného zariadenia sa odporúča použiť dávkovaciu pumpu.  
Naplníte zásobník prípravkom RTU pri predpokladanej dávke 5 ml prípravku na kravu a naskrutkujte naňho hornú časť mechanického postrekovača. Zabráňte odtokaniu nadbytočnej tekutiny.  
Bezprostredne pred dojením struky starostlivo očistite utieraním jednou papierovou utierkou/handričkou.  
Po dojení nastriekajte dezinfekčný prostriedok na struky mechanickým postrekovačom. Dezinfekčným prostriedkom sa musí pokryť asi 3 cm časť struku okolo kanálka struku.  
V prípade potreby doplňte zásobník mechanického postrekovača čerstvým dezinfekčným prostriedkom.  
Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenia. Po ošetrovaní nechajte zvieratá stáť aspoň 5 minút.  
Po dezinfekcii vyprázdňte zásobník. Vyčistite zásobník a mechanický postrekovač opláchnutím vodou.

**4.2.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie**

Počas dezinfekcie strukov ručným postrekom pomocou mechanického postrekovača po dojení používajte rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o registrácii v informáciách o produkte). Vyhnite sa práci v postrekovej hmle.  
V prípade, že je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po ňom, musí sa na dezinfekciu pred dojením zväžiť použitie iného prípravku, ktorý neobsahuje jód.

**4.2.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia**

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

**4.2.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu**

Pozri všeobecné pokyny na použitie.



#### 4.2.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.3 Opis použitia

##### Použitie 3 - Použitie č. 4.3 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov ručným postrekom elektronickým postrekovačom po dojení

###### Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

###### Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Nie je relevantné

###### Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie  
Bežný názov: Baktérie  
Vývojové štádium: vegetatívne bunky

Vedecký názov: Kvasinky  
Bežný názov: Kvasinky  
Vývojové štádium: vegetatívne bunky

###### Oblasti použitia

Vnútorne

Dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc) na použitie po dojení

###### Spôsob(y) aplikácie

Ručný postrek pomocou elektronického postrekovača -

Pozri návod na použitie

###### Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie

Kravy: 5 ml na ošetrovanie - 0% -  
Aplikácia po dojení: 2 – 3x/deň (po každom dojení)

###### Kategória(ie) používateľov

Profesionálne

###### Veľkosti balenia a obalový materiál

Kanister (HDPE): 5 – 60 kg  
barel (HDPE): 60 – 200 kg  
IBC nádrž (HDPE): 600 - 1000 kg

### 4.3.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.  
Otvorte nádobu obsahujúcu prípravok RTU pri predpokladanej dávke 5 ml prípravku na kravu a vložte dlhú nasávaciu rukoväť elektronického postrekovača. Zabráňte odtokaniu nadbytočnej tekutiny.  
Bezprostredne pred dojením struky starostlivo očistite utieraním jednou papierovou utierkou/handričkou.  
Po dojení nastriekajte dezinfekčný prostriedok na struky elektronickým postrekovačom. Dezinfekčným prostriedkom sa musí pokryť asi 3 cm časť struku okolo kanálíka struku.  
V prípade potreby vymeňte prázdnu nádobu za novú nádobu obsahujúcu prípravok RTU.  
Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenia. Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň 5 minút.  
Po dezinfekcii vložte systém dlhej nasávacej rukoväti do vedra s vodou a pumpovaním vody opláchnite rozprašovač.

### 4.3.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

Počas dezinfekcie strukov ručným postrekom pomocou elektronického postrekovača po dojení používajte rukavice odolné proti chemikáliám (materiál rukavíc špecifikuje držiteľ rozhodnutia o registrácii v informáciách o produkte). Vyhnite sa práci v postrekovej hmle.  
V prípade potreby vymeňte prázdnu nádobu za novú nádobu obsahujúcu prípravok RTU.  
V prípade potreby vymeňte prázdnu nádobu za novú nádobu obsahujúcu prípravok RTU.  
Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenia. Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň 5 minút.  
Po dezinfekcii vložte systém dlhej nasávacej rukoväti do vedra s vodou a pumpovaním vody opláchnite rozprašovač.

### 4.3.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

### 4.3.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

### 4.3.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

## 4.4 Opis použitia

### Použitie 4 - Použitie č. 4.4 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov automatickým namáčaním po dojení

Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Nie je relevantné

<b>Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)</b>	<p>Vedecký názov: Baktérie  Bežný názov: Baktérie  Vývojové štádium: vegetatívne bunky</p> <p>Vedecký názov: Kvasinky  Bežný názov: Kvasinky  Vývojové štádium: vegetatívne bunky</p>
<b>Oblasti použitia</b>	<p>Vnútorne</p> <p>Dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojníc) na použitie po dojení</p>
<b>Spôsob(y) aplikácie</b>	<p>Automatické namáčanie -</p> <p>Pozri návod na použitie</p>
<b>Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie</b>	<p>Kravy: 5 ml na ošetrovanie - 0% -  Aplikácia po dojení: 2 – 3x/deň (po každom dojení)</p>
<b>Kategória(ie) používateľ'ov</b>	<p>Profesionálne</p>
<b>Veľkosti balenia a obalový materiál</b>	<p>Kanister (HDPE): 5 – 60 kg  barel (HDPE): 60 – 200 kg  IBC nádrž (HDPE): 600 - 1000 kg</p>

#### 4.4.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.  
Otvorte nádobu obsahujúcu prípravok RTU a vložte nasávaciu rúrku automatického namáčacieho systému. Zabráňte odtekaniu nadbytočnej tekutiny.  
Po dojení sa podtlak vypne a dezinfekčný prostriedok na struky sa vstrekuje do potrubia rozdeľovača dojacieho stroja. Po odobratí nádobiek na struky pomocou zariadenia na automatické odobratie dojacej súpravy (ďalej len „ACR“) sa struky pokryjú cca 5 ml namáčacieho prípravku. Po odstránení ACR sa každá vložka automatického namáčacieho systému dôkladne opláchne vodou a prefúkne sa stlačeným vzduchom.  
V záverečnom kroku čistenia po každom dojení stáda sa vložky dezinfikujú (napr. prípravkom na báze chlóru) a znovu sa prefúknu stlačeným vzduchom.  
Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenia. Po ošetrení nechajte zvieratá stáť aspoň 5 minút.  
Potom je dojací systém pripravený na ďalšie dojenie.  
Celý proces je automatizovaný.

#### 4.4.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

V prípade, že je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po ňom, musí sa na dezinfekciu pred dojením zväžiť použitie iného prípravku, ktorý neobsahuje jód.

#### 4.4.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.4.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.4.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5 Opis použitia

##### Použitie 5 - Použitie č. 4.5 – Dezinfekcia strukov dojných zvierat: Dezinfekcia strukov automatickým postrekom robotom po dojení

##### Typ výrobku

Výrobky typu 03 - Veterinárna hygiena

##### Kde je to relevantné, presný opis autorizovaného použitia

Nie je relevantné

##### Cieľové organizmy (vrátane vývojových štádií)

Vedecký názov: Baktérie  
Bežný názov: Baktérie  
Vývojové štádium: vegetatívne bunky

Vedecký názov: Kvasinky  
Bežný názov: Kvasinky  
Vývojové štádium: vegetatívne bunky

##### Oblasti použitia

Vnútročné

Dezinfekcia strukov dojných zvierat (dojnic) na použitie po dojení

##### Spôsob(y) aplikácie

Automatický postrek robotom -

Pozri návod na použitie

**Aplikačná(é) dávka(y) a aplikačné frekvencie**

Kravy: 5 ml na ošetrovanie - 0% -  
Aplikácia po dojení: 2 – 3x/deň (po každom dojení)

**Kategória(ie) používateľov**

Profesionálne

**Veľkosti balenia a obalový materiál**

Kanister (HDPE): 5 – 60 kg  
barel (HDPE): 60 – 200 kg IBC nádrž (HDPE): 600 - 1000 kg

#### 4.5.1 Pokyny na používanie špecifické pre dané použitie

Prípravok sa musí pred použitím zahriať na teplotu vyššiu ako 20 °C.  
Otvorte nádobu obsahujúcu prípravok RTU a vložte nasávaciu rúrku robotického dojacieho zariadenia. Zabráňte odtokaniu nadbytočnej tekutiny.  
Struky čistí robot automatickými kefkami.  
Po robotickom dojení sa dezinfekčný prostriedok automaticky nastrieka na struky zo skupinového ramena.  
Prípravok ponechajte na strukoch do ďalšieho dojenja. Po ošetrovaní nechajte zvieratá stáť aspoň 5 minút.  
Oplachovanie postrekovača sa vykonáva automaticky.

#### 4.5.2 Opatrenia na zmiernenie rizika špecifické pre dané použitie

V prípade, že je potrebná kombinácia dezinfekcie pred dojením a po ňom, musí sa na dezinfekciu pred dojením zväžiť použitie iného prípravku, ktorý neobsahuje jód.

#### 4.5.3 Kde je to špecifické pre použitie, údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5.4 Kde je to špecifické pre použitie, návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

#### 4.5.5 Kde je to špecifické pre použitie, podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Pozri všeobecné pokyny na použitie.

### 5. Všeobecné pokyny pre použitie

#### 5.1. Pokyny na používanie

Pozri konkrétny návod na použitie.

#### 5.2. Opatrenia na zmiernenie rizika

Pozri konkrétne opatrenia na zmiernenie rizika.

#### 5.3. Údaje o pravdepodobných priamych alebo nepriamych nepriaznivých účinkoch, návod na poskytnutie prvej pomoci a núdzové opatrenia na ochranu životného prostredia

Uvedené v KBÚ

Opis opatrení prvej pomoci

Po vdýchnutí: Zabezpečte prívod čerstvého vzduchu; v prípade príznakov sa poraďte s lekárom.

Po kontakte s pokožkou: Okamžite umyte vodou a mydlom a dôkladne opláchnite.

Po kontakte s očami: Otvorené oko niekoľko minút vyplachujte pod tečúcou vodou (aspoň 15 minút).

Po požití: Vypláchnite ústa a potom vypite veľké množstvo vody. Okamžite zavolajte lekára.

Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku.

Stabilita a reaktivita

Reaktivita: Nie sú známe nebezpečné reakcie.

Chemická stabilita: Za normálnych okolitých podmienok (teplota okolia) je prípravok chemicky stabilný.

Možnosť nebezpečných reakcií: Pri určenom použití sa nepredpokladajú žiadne nebezpečné reakcie.

Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť: neurčené.

Nekompatibilné materiály: neurčené.

Nebezpečné produkty rozkladu: Nie sú známe nebezpečné produkty rozkladu.

Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy:

Noste ochranné oblečenie.

Zabezpečte dostatočné vetranie.

Uchovávajte mimo zdrojov zapálenia – Nefajčite.

Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie: Zabráňte preniknutiu do kanalizácie, povrchových alebo podzemných vôd.

Metódy a materiály na zabránenie šírenia a čistenie: Absorbujte materiálom, ktorý viaže tekutiny (piesok, diatomit, kyslé spojivá, univerzálne spojivá, piliny). Zneškodnite zozbieraný materiál v súlade s predpismi.

#### 5.4. Návod na bezpečné zneškodnenie výrobku a jeho obalu

Uvedené v KBU

Metódy spracovania odpadu: nebezpečný odpad (AVV). Nesmie sa zneškodňovať spolu s domovým odpadom. Zabráňte preniknutiu prípravku do kanalizácie. Je potrebné osobitné ošetrovanie pri dodržiavaní úradných predpisov.

Na konci ošetrovania nepoužitý prípravok a obal zneškodnite v súlade s miestnymi požiadavkami. Použitý prípravok sa môže spláchnuť do komunálnej kanalizácie alebo zneškodniť na hnojisko v závislosti od miestnych požiadaviek. Zabráňte uvoľneniu do samostatnej čističky odpadových vôd.

Odporúčaný čistiaci prostriedok: voda, v prípade potreby čistiaci prostriedok.

## 5.5. Podmienky skladovania a trvanlivosť výrobku za bežných skladovacích podmienok

Čas použiteľnosti: 18 mesiacov

Prípravky je potrebné chrániť pred mrazom, skladovať pri teplotách nižších ako 30 °C a mimo dosahu priameho slnečného žiarenia.

## 6. Ďalšie informácie

Nie je relevantné