

Charakterystyka produktu biobójczego

Nazwa produktu: AlgoSol forte

Grupa produktowa: Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

Numer pozwolenia: PL/2019/0433/MR/BPF

Numer referencyjny w R4BP 3: PL-0012807-0006

Spis treści

Informacje administracyjne	1
1.1. Nazwa handlowa produktu	1
1.2. Posiadacz pozwolenia	1
1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych	1
1.4. Producent (-ci) substancji czynnych	1
2. Skład i postać użytkowa produktu	2
2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego	2
2.2. Rodzaj postaci użytkowej	2
3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności	2
4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem	2
5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania	10
5.1. Instrukcje stosowania	10
5.2. Środki zmniejszające ryzyko	10
5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach	11
5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania	11
5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania	11
6. Inne informacje	11

Informacje administracyjne

1.1. Nazwa handlowa produktu

AlgoSol forte

1.2. Posiadacz pozwolenia

Nazwa i adres posiadacza
pozwolenia

Nazwa

Soell GmbH

Adres

Fuhrmannstraße 6 95030 Hof Niemcy

Numer pozwolenia

PL/2019/0433/MR/BPF 1-1

Numer referencyjny w R4BP 3

PL-0012807-0006

Data udzielenia pozwolenia

04/11/2019

Data ważności
pozwolenia

29/06/2028

1.3. Producent (-ci) produktów biobójczych

Nazwa producenta substancji
czynnej

Soell GmbH

Adres producenta substancji
czynnej

Fuhrmannstraße 6 95030 Hof Niemcy

Lokalizacja zakładów produkcyjnych

Fuhrmannstraße 6 95030 Hof Niemcy

1.4. Producent (-ci) substancji czynnych

Substancja czynna	1276 - Pentahydrat siarczanu miedzi
Nazwa producenta substancji czynnej	Manica S.P.A
Adres producenta substancji czynnej	Via all'Adige 4 IT-38068 Rovereto (Trento) Włochy
Lokalizacja zakładów produkcyjnych	Via all'Adige 4 IT-38068 Rovereto (Trento) Włochy

2. Skład i postać użytkowa produktu

2.1. Informacje jakościowe i ilościowe o składzie produktu biobójczego

Nazwa zwyczajowa	Nazwa IUPAC	Funkcja	Numer CAS	Numer WE	Zawartość (%)
Pentahydrat siarczanu miedzi		Substancja czynna	7758-99-8	231-847-6	0,95

2.2. Rodzaj postaci użytkowej

koncentrat do rozcieńczania w wodzie

3. Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i środki ostrożności

Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia	Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.
Zwroty wskazujące środki ostrożności	Unikać uwolnienia do środowiska. Usuwać zawartość do zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami. Usuwać pojemnik do zgodnie z lokalnymi/regionalnymi przepisami.

4. Zastosowanie (zastosowania) objęte zezwoleniem

4.1 Opis użycia

Zastosowanie 1 - Zastosowanie 1: Zahamowanie wzrostu glonów w sztucznych stawach, użytkownik powszechny

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Sztuczne stawy to stworzone przez człowieka zbiorniki wodne o średniej głębokości, w których nie tworzą się stabilne i wyraźnie oddzielone warstwy wody o różnej temperaturze. Podłoże takich zbiorników na ogół uszczelnia się za pomocą folii, a czasami przy zastosowaniu konstrukcji z betonu lub włókna szklanego.

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: Cyanobacteria
Nazwa zwyczajowa: sinice
Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa:
Nazwa zwyczajowa: jednokomórkowe zielenice
Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Na zewnątrz

Produkt do zwalczania sinic i jednokomórkowych zielenic w sztucznych stawach.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Aplikacja ręczna

Szczegółowy opis:

Produkt w postaci koncentratu rozcieńczać przez wlewanie do wody w sztucznym stawie.

Zwalczanie jednokomórkowych zielenic:

Minimalna dawka: 50 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,005 %).

Maksymalna dawka: 60 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,006 %).

Jednorazowa aplikacja. W razie konieczności, aplikację można powtórzyć po 2-3 tygodniach.

Zwalczanie sinic:

Minimalna dawka: 3,9 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,00039 %).

Maksymalna dawka: 25 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,0025 %).

Stosować jeden raz dziennie przez 5 kolejnych dni.

W razie konieczności, aplikację można powtórzyć po 2-3 tygodniach.

Dawka (-i) i częstość nanoszenia

Stosowana dawka: -
Rozcieńczenie (%): -

	Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria (-e) użytkowników	Powszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	• butelka (HDPE, PET) z nakrętką (PP) o pojemności 250 ml, 500 ml lub 1 L w zestawie z dozownikiem • kanister (HDPE, PE) z nakrętką (PP) o pojemności 2,5 L, 3 L, 5 L lub 10 L w zestawie z dozownikiem

4.1.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować wyłącznie, gdy ocena zakwitu glonów i parametrów stawu wskazuje, że wszystkie niechemiczne środki kontroli glonów, np. (częściowa) wymiana wody, mechaniczne usuwanie glonów i regularne czyszczenie filtra nie są wystarczające, aby zapewnić skuteczną kontrolę rozwoju glonów.
- Produkt musi być równomiernie rozprowadzony po całym stawie (np. poprzez wcześniejsze rozcieńczenie produktu w konewce wykorzystując wodę ze stawu).
- W celu kontroli wzrostu glonów należy zastosować jednorazową dawkę 50-60 ml produktu na 1000 L wody w stawie. W celu kontroli wzrostu jednokomórkowych zielenic należy zastosować jednorazową dawkę 50-60 ml produktu na 1000 L wody w stawie. W celu kontroli wzrostu sinic należy zastosować dawkę 3,9-25 ml produktu na 1000 L wody w stawie przez pięć kolejnych dni. W razie konieczności aplikację można powtórzyć po 2-3 tygodniach, zarówno w przypadku zwalczania jednokomórkowych zielenic jak i sinic.

4.1.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Chronić przed dziećmi.
- Nie spożywać zwierząt pochodzących ze stawu, w którym zastosowano produkt.
- Produkt może być toksyczny dla niektórych gatunków ryb i bezkręgowców.
- Nie stosować produktu w celach profilaktycznych.
- Wody ze stawu, w którym zastosowano produkt nie należy uwalniać do wód powierzchniowych.

4.1.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.1.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.1.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

4.2 Opis użycia

Zastosowanie 2 - Zastosowanie 2: Zahamowanie wzrostu glonów w sztucznych stawach, użytkownik profesjonalny

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem

Sztuczne stawy to stworzone przez człowieka zbiorniki wodne o średniej głębokości, w których nie tworzą się stabilne i wyraźnie oddzielone warstwy wody o różnej temperaturze. Podłoże takich zbiorników na ogół uszczelnia się za pomocą folii, a czasami przy zastosowaniu konstrukcji z betonu lub włókna szklanego.

Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)

Nazwa naukowa: Cyanobacteria
Nazwa zwyczajowa: sinice
Etap rozwoju: Brak danych

Nazwa naukowa:
Nazwa zwyczajowa: jednokomórkowe zielenice
Etap rozwoju: Brak danych

Obszar zastosowania

Na zewnątrz

Produkt do zwalczania sinic i jednokomórkowych zielenic w sztucznych stawach.

Sposób (-oby) nanoszenia

metoda: Aplikacja ręczna
Szczegółowy opis:
Produkt w postaci koncentratu rozcieńczać przez wlewanie do wody w sztucznym stawie.

Zwalczanie jednokomórkowych zielenic:
50 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,005 %).
Jednorazowa aplikacja. W razie konieczności, aplikację można powtórzyć po 2 tygodniach.

Zwalczanie sinic:
Minimalna dawka: 3,9 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,00039 %).
Maksymalna dawka: 10 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,001 %).
Stosować jeden raz dziennie przez 5 kolejnych dni.
W razie konieczności, aplikację można powtórzyć po 2 tygodniach.

Dawka (-i) i częstość nanoszenia

Stosowana dawka: -
Rozcieńczenie (%): -
Liczba i harmonogram aplikacji:
-

Kategoria (-e) użytkowników

Profesjonalny

- butelka (HDPE, PET) z nakrętką (PP) o pojemności 1 L w zestawie z dozownikiem

Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe

- kanister (HDPE, PE) z nakrętką (PP) o pojemności 5 L lub 10 L w zestawie z dozownikiem
- beczka (HDPE) z pokrywą (PE) o pojemności 50 L lub 100 L w zestawie z dozownikiem

4.2.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Stosować wyłącznie, gdy ocena zakwitu glonów i parametrów stawu wskazuje, że wszystkie niechemiczne środki kontroli glonów, np. (częściowa) wymiana wody, mechaniczne usuwanie glonów i regularne czyszczenie filtra, nie są wystarczające, aby zapewnić skuteczną kontrolę rozwoju glonów.
- Produkt musi być równomiernie rozprowadzony po całym stawie (np. poprzez wcześniejsze rozcieńczenie produktu w konewce wykorzystując wodę ze stawu).
- W celu kontroli wzrostu jednokomórkowych zielenic należy zastosować jednorazową dawkę 50 ml produktu na 1000 L wody w stawie. W celu kontroli wzrostu sinic należy zastosować dawkę 3,9-10 ml produktu na 1000 L wody w stawie przez pięć kolejnych dni. W razie konieczności aplikację można powtórzyć po 2 tygodniach, zarówno w przypadku zwalczania jednokomórkowych zielenic jak i sinic.

4.2.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Nie spożywać zwierząt pochodzących ze stawu, w którym zastosowano produkt.
- Produkt może być toksyczny dla niektórych gatunków ryb i bezkręgowców.
- Nie stosować produktu w celach profilaktycznych.
- Wody ze stawu, w którym zastosowano produkt nie należy uwalniać do wód powierzchniowych.

4.2.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.2.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.2.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.3 Opis użycia

Zastosowanie 3 - Zastosowanie 3: Zahamowanie wzrostu glonów w fontannach, użytkownik powszechny

Grupa produktowa	Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt
W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem	-
Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	Nazwa naukowa: Cyanobacteria Nazwa zwyczajowa: sinice Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: jednokomórkowe zielenice Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Wewnątrz Na zewnątrz Wewnątrz i na zewnątrz. Produkt do zwalczania sinic i jednokomórkowych zielenic w fontannach wewnątrz pomieszczeń i na zewnątrz.
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: Aplikacja ręczna Szczegółowy opis: Produkt w postaci koncentratu rozcieńczać przez wlewanie do wody w fontannie. Zwalczanie jednokomórkowych zielenic: Minimalna dawka: 82 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,0082 %). Maksymalna dawka: 400 ml produktu na 100 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,4 %). Jednorazowa aplikacja. W razie konieczności, aplikację można powtórzyć po 1-2 tygodniach. Zwalczanie sinic: Minimalna dawka: 39 ml produktu na 1000 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,0039 %). Maksymalna dawka: 400 ml produktu na 100 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,4 %). Jednorazowa aplikacja. W razie konieczności, aplikację można powtórzyć po 1-2 tygodniach.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria (-e) użytkowników	Powszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	butelka (HDPE) z nakrętką (PP) o pojemności 500 ml lub 1 L w zestawie z dozownikiem

- kanister (PE) z nakrętką (PP) o pojemności 2,5 L lub 5 L w zestawie z dozownikiem

4.3.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- W celu kontroli wzrostu glonów należy zastosować dawkę 8,2-400 ml produktu na 100 L wody w fontannie. W celu kontroli wzrostu sinic należy zastosować dawkę 3,9-400 ml produktu na 100 L wody w fontannie.

4.3.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Chronić przed dziećmi.
- Nie należy spożywać wody z fontann, w których zastosowano produkt.
- Wody z fontann umieszczonych na zewnątrz, w których zastosowano produkt nie należy uwalniać do wód powierzchniowych.

4.3.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.3.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.3.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

4.4 Opis użycia

Zastosowanie 4 - Zastosowanie 4: Zahamowanie wzrostu glonów w basenach, użytkownik powszechny

Grupa produktowa

Gr. 02 - Środki dezynfekcyjne lub glonobójcze nieprzeznaczone do bezpośredniego stosowania wobec ludzi ani zwierząt

W stosownych przypadkach, dokładny opis zastosowania objętego pozwoleniem Zwalczany(-e) organizm(-y) (w tym etap rozwoju)	- Nazwa naukowa: Cyanobacteria Nazwa zwyczajowa: sinice Etap rozwoju: Brak danych Nazwa naukowa: Nazwa zwyczajowa: jednokomórkowe zielenice Etap rozwoju: Brak danych
Obszar zastosowania	Na zewnątrz Produkt do zwalczania sinic i jednokomórkowych zielenic w basenach na zewnątrz.
Sposób (-oby) nanoszenia	metoda: Aplikacja ręczna Szczegółowy opis: Produkt w postaci koncentratu rozcieńczać przez wlewanie do wody w basenie. Zwalczanie jednokomórkowych zielenic: Minimalna dawka: 8,2 ml produktu na 100 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,0082 %). Maksymalna dawka: 10 ml produktu na 100 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,01 %). Jednorazowa aplikacja. Aplikację można powtarzać co 2 tygodnie lub w razie konieczności. Zwalczanie sinic: Minimalna dawka: 3,9 ml produktu na 100 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,0039 %). Maksymalna dawka: 10 ml produktu na 100 L wody (w celu uzyskania stężenia końcowego 0,01 %). Jednorazowa aplikacja. Aplikację można powtarzać co 2 tygodnie lub w razie konieczności.
Dawka (-i) i częstość nanoszenia	Stosowana dawka: - Rozcieńczenie (%): - Liczba i harmonogram aplikacji: -
Kategoria (-e) użytkowników	Powszechny
Wielkości opakowań i materiały opakowaniowe	• butelka (HDPE) z nakrętką (PP) o pojemności 1 L w zestawie z dozownikiem • kanister (PE) z nakrętką (PP) o pojemności 2,5 L, 5 L lub 10 L w zestawie z dozownikiem

4.4.1 Instrukcja użytkowania dla danego zastosowania

- Nie stosować w basenach z systemami flokulacji.
- W celu kontroli wzrostu glonów należy zastosować dawkę 8,2-10 ml produktu na 100 L wody w basenie. W celu kontroli wzrostu jednokomórkowych zielenic należy zastosować dawkę 8,2-10 ml produktu na 100 L wody w basenie. W celu kontroli wzrostu sinic należy zastosować dawkę 3,9-10 ml produktu na 100 L wody w basenie. Aplikację można powtarzać co 2 tygodnie lub w razie

konieczności, zarówno w przypadku zwalczania jednokomórkowych zielenic jak i sinic, postępując tak samo jak za pierwszym razem.

4.4.2 Środki ograniczające ryzyko dla danego zastosowania

- Chronić przed dziećmi.
- Wody z basenów, w których zastosowano produkt nie należy uwalniać do wód powierzchniowych.

4.4.3 Gdy dotyczy danego zastosowania, szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

patrz sekcja 5.3

4.4.4 Gdy dotyczy danego zastosowania, instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

patrz sekcja 5.4

4.4.5 Gdy dotyczy danego zastosowania, warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

patrz sekcja 5.5

5. Ogólne wskazówki dotyczące stosowania

5.1. Instrukcje stosowania

- Produkt nie jest przeznaczony do wspólnego użycia/ mieszania z innymi produktami, w tym produktami biobójczymi.
- Nie stosować, jeśli pH wody jest niższe niż 7.
- Zaleca się stosowanie najniższych dawek, które zazwyczaj są wystarczające do zapewnienia pożądanego efektu. W przypadku większego zagęszczenia glonów lub w zależności od jakości wody (np. woda o wysokim stopniu zabrudzenia) może być wymagane zastosowanie większej dawki produktu.
- Stosować wyłącznie w sztucznych zbiornikach z nieprzepuszczalnym dnem.
- Nie stosować produktu nad lub w bezpośredniej bliskości wód powierzchniowych.

5.2. Środki zmniejszające ryzyko

patrz sekcje 4.1.2, 4.2.2, 4.3.2, 4.4.2

5.3. Szczegóły dotyczące prawdopodobnych, bezpośrednich lub pośrednich działań niepożądanych, instrukcje w zakresie pierwszej pomocy oraz środki ochrony środowiska w nagłych wypadkach

Skutki uboczne/działania niepożądane:

Brak innych niż wynikających z klasyfikacji.

Pierwsza pomoc: W razie potrzeby zabrać poszkodowanego do ośrodka zdrowia i pokazać opakowanie produktu lub etykietę.

W przypadku:

- Wdychania oparów: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze. Jeśli wystąpi niewydolność oddechowa bądź płytki oddech i utrzymuje się, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Kontakt z oczami: Wyjąć soczewki kontaktowe jeśli są. Przeemyć oczy dużą ilością wody utrzymując powieki otwarte przez co najmniej 15 minut. Jeśli podrażnienie oczu będzie się utrzymywać, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Kontakt ze skórą: Spłukać skórę dużą ilością wody, nie szorować. Jeśli podrażnienie skóry będzie się utrzymywać, należy zasięgnąć porady lekarza.
- Kontakt z jamą ustną: Przeplukać usta dużą ilością wody. Jeśli wystąpią bóle brzucha lub złe samopoczucie, należy zasięgnąć porady lekarza.

NIGDY NIE POZOSTAWIAĆ OSOBY POSZKODOWANEJ BEZ OPIEKI.

Wskazówki dla lekarza i personelu medycznego: Należy zastosować leczenie objawowe i wspomagające.

W PRZYPADKU UZYSKIWANIA PORADY LEKARSKIEJ NALEŻY MIEĆ PRZY SOBIE OPAKOWANIE PRODUKTU LUB ETYKIETĘ. W razie wypadku skontaktować się z ośrodkiem kontroli zatruć (należy podać numery telefonów do ośrodków toksykologicznych odpowiedzialnych za kontrolę zatruć produktami biobójczymi).

Środki ochrony środowiska:

- Unikać uwolnienia produktu i przedostania się opakowań po produkcie do wód powierzchniowych i kanalizacji.
- Chronić produkt przed rozlaniem. W przypadku niezamierzonego rozlania produktu, należy go zebrać przy pomocy jednorazowych, suchych chusteczek lub papierowych ręczników, które następnie należy utylizować jako odpad stały.

5.4. Instrukcje w zakresie bezpiecznego usuwania produktu i jego opakowania

- Opakowania po produkcie, wszelkie materiały zanieczyszczone produktem (łącznie z materiałami użytymi do zebrania rozlanego produktu), pozostałości produktu po zastosowaniu zamknięte w oznakowanym pojemniku należy usuwać w sposób bezpieczny i przekazać firmie posiadającej uprawnienia do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (np. w spalarni). Nie mieszać ze strumieniem odpadów komunalnych.

5.5. Warunki przechowywania oraz długość okresu przechowywania produktów biobójczych w normalnych warunkach przechowywania

- Produkt przechowywać w oryginalnym, oznakowanym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w chłodnym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu niedostępnym dla dzieci oraz zwierząt. Nie przechowywać razem z żywnością, napojami i paszami dla zwierząt.

Długość okresu przechowywania: do 2 lat od daty produkcji.

6. Inne informacje

Kategoria zagrożenia: Aquatic Chronic 3

Piktogram GHS i hasło ostrzegawcze: Nie dotyczy