

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Mida Agri 820 Iodine Cream

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: IT/2022/00799/AUT

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** IT-0014316-0005

Indice

| | |
|--|---|
| Informazioni amministrative | 1 |
| 1.1. Denominazione commerciale del prodotto | 1 |
| 1.2. Titolare dell'autorizzazione | 1 |
| 1.3. Fabbricante/i dei biocidi | 1 |
| 1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i | 2 |
| 2. Composizione e formulazione | 2 |
| 2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida | 2 |
| 2.2. Tipo di formulazione | 2 |
| 3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza | 2 |
| 4. Uso/i autorizzato/i | 3 |
| 5. Indicazioni generali per l'uso | 6 |
| 5.1. Istruzioni d'uso | 6 |
| 5.2. Misure di mitigazione del rischio | 6 |
| 5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente | 6 |
| 5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio | 7 |
| 5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio | 7 |
| 6. Altre informazioni | 8 |

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Mida Agri 820 Iodine Cream

1.2. Titolare dell'autorizzazione

| | | |
|--|-----------------------|---|
| Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione | Nome | Christeyns Italia S.r.l. |
| | Indirizzo | Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia |
| Numero di autorizzazione | IT/2022/00799/AUT 1-2 | |

Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)

IT-0014316-0005

Data di rilascio dell'autorizzazione

06/06/2022

Data di scadenza dell'autorizzazione

06/07/2032

1.3. Fabbricanti dei biocidi

| | |
|---------------------------------------|---|
| Nome del produttore | Christeyns Italia S.r.l. |
| Indirizzo del fabbricante | Via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia |
| Ubicazione dei siti produttivi | via Aldo Moro, 30 20042 Pessano con Bornago (MI) Italia |
| | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio |

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

| | |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| Principio attivo | 1349 - Polyvinylpyrrolidone iodine |
| Nome del produttore | Christeyns NV |
| Indirizzo del fabbricante | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio |
| Ubicazione dei siti produttivi | Afrikalaan 182 9000 Gent Belgio |

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

| Nome comune | Nomenclatura IUPAC | Funzione | Numero CAS | Numero CE | Contenuto (%) |
|-----------------------------|--------------------|------------------|------------|-----------|---------------|
| Polyvinylpyrrolidone iodine | | Principio attivo | 25655-41-8 | | 2,5 |

2.2. Tipo di formulazione

| |
|--------------------|
| AL - Altri liquidi |
|--------------------|

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

| | |
|--------------------------------|--|
| Indicazioni di pericolo | Provoca grave irritazione oculare. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| Consigli di prudenza | Indossare occhiali protettivi. Se l'irritazione degli occhi persiste: Consultare un medico. Non disperdere nell'ambiente. Smaltire il prodotto in accordo con la legislazione locale/regionale/nazionale/internazionale.. |

4. Usoli autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Uso 1 - Disinfezione capezzoli dopo la mungitura - immersione manuale

| | |
|--|---|
| Tipo di prodotto | Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria |
| Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente) | <p>Soluzioni acquose a medio-alta viscosità a base di iodio per la disinfezione dei capezzoli di mucche da latte dopo la mungitura tramite immersione manuale.</p> <p>Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).</p> <p>Trattamento tramite immersione manuale utilizzando una coppetta da immersione.</p> <p>Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una tazza da immersione. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.</p> |
| Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo) | <p>Nome scientifico: Staphylococcus aureus Nome comune: Bacteria, aerobic Gram-positive Fase di sviluppo: .</p> <p>Nome scientifico: Streptococcus uberis Nome comune: Bacteria, aerobic Gram-positive Fase di sviluppo: .</p> <p>Nome scientifico: Escherichia coli Nome comune: Bacteria, aerobic Gram-negative Fase di sviluppo: .</p> <p>Nome scientifico: Candida albicans Nome comune: Yeasts Fase di sviluppo: .</p> |
| Campo di applicazione | <p>In ambiente chiuso</p> <p>Disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura per animali mungibili (vacche da latte, bufale, pecore e capre).</p> |
| Metodi di applicazione | <p>Metodo: Sistema aperto: trattamento per immersione Descrizione dettagliata:</p> <p>Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale.</p> <p>Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione.</p> <p>Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.</p> <p>Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.</p> |

Dosi di impiego e frequenze

Tasso di domanda: Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.

Diluizione (%): 0

Numero e tempi di applicazione:

2 volte/giorno (vacche da latte e bufale) 1-2 volte/giorno (pecore e capre)

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale addestrato

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

5-10-20-25 L HDPE taniche

200 L HDPE taniche

600-1000 L HDPE taniche

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale. Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione. Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno. Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti. Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare occhiali protettivi.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:
Grave irritazione oculare

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.
- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.
- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.
- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali. Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Prodotto pronto all'uso per la disinfezione dei capezzoli dopo la mungitura mediante trattamento ad immersione manuale. Dopo la mungitura, immergere i capezzoli dell'animale nel prodotto pronto all'uso utilizzando una coppetta da immersione. Si consiglia l'uso di una pompetta dosatrice per il riempimento del prodotto nell'apparecchiatura di applicazione. Applicare 10 ml di prodotto/animale (vacca da latte) per trattamento, 2 volte/giorno
Su bufale: applicare 10 ml di prodotto/animale per trattamento, 2 volte/giorno
Su pecore: applicare 2 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno
Sulle capre: applicare 3 ml di prodotto/animale per trattamento, 1-2 volte/giorno.
Lasciare il prodotto sui capezzoli e mantenere l'animale in piedi per almeno cinque minuti.
Non pulire i capezzoli subito dopo la disinfezione. Pulire accuratamente i capezzoli strofinandoli con un tovagliolo di carta monouso asciutto solo prima della mungitura successiva.

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Indossare occhiali protettivi.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Probabili effetti avversi diretti o indiretti:

Gravi irritazione oculare

Istruzioni di primo soccorso:

- IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente con acqua per alcuni minuti. Rimuovere le lenti a contatto, se presenti e facile da fare. Continuare a sciacquare. Se l'irritazione oculare persiste: consultare un medico.

- SE SULLA PELLE: Sciacquare la pelle con abbondante acqua.

- IN CASO DI INALAZIONE: Fornire aria fresca; consultare un medico in caso di reclami.

- IN CASO DI INGESTIONE: Sciacquare la bocca con acqua e poi bere acqua. Se non ti senti bene, chiedi consiglio/attenzione al medico.

Tieni a disposizione il contenitore o l'etichetta.

Non lasciare sola la persona avvelenata.

QUANDO SI CHIEDE UN CONSIGLIO MEDICO TENERE L'IMBALLAGGIO O L'ETICHETTA A PORTATA DI MANO E CHIAMARE IL CENTRO ANTIVELENI LOCALE

Misure di emergenza ambientale

Assorbire il prodotto sversato con materiale inerte. Spalare in un contenitore adatto per lo smaltimento secondo la legislazione locale.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

Smaltire il prodotto inutilizzato e l'imballaggio in conformità con i requisiti locali.

Il prodotto usato può essere scaricato nella fognatura comunale o smaltito nel deposito di letame a seconda delle esigenze locali.

Evitare il rilascio in un singolo impianto di trattamento delle acque reflue.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Conservare il prodotto nella confezione originale.

Tenere il contenitore ben chiuso.

Non conservare a temperatura superiore a 30°C.

Proteggere dalla luce solare diretta.

Periodo di validità: 1 anno

6. Altre informazioni

| |
|--|
| |
|--|