

Rezumatul caracteristicilor produsului pentru un produs biocid

Denumirea produsului: BROS – momeala raticida sub forma de boabe de grau impregnate

Tipul (tipurile) de produs (produse): TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

TP 14 - Rodenticide

Numărul curent: RO/2014/0087/MRA/ES/AA-2013-14-00110

Numărul curent R4BP 3: RO-0008243-0000

Cuprins

Informații administrative	1
1.1. Denumirea comercială a produsului	1
1.2. Detinatorul autorizației	1
1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide	1
1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active	2
2. Compoziția și formularea produsului	2
2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid	2
2.2. Tipul preparatului	3
3. Fraze de pericol și de precauție	3
4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)	3
4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	4
4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	4
4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	5
4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	5
4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	5
4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	6
4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	7
4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	7
4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	7
4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	7
4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	9
4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	9
4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	9
4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	9
4.3.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	10
4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	11
4.4.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	11

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	11
4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	12
4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	12
4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	13
4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	13
4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	14
4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	14
4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	14
4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	15
4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	16
4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	16
4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	16
4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	16
4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	18
4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	18
4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	18
4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	18
4.7.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	19
4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare	20
4.8.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare	20
4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	20
4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia	21
4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	21
5. Direcții generale de utilizare	21
5.1. Instrucțiuni de utilizare	21
5.2. Măsuri de reducere a riscurilor	23
5.3. Particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului	24
5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia	25
5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare	25

Informații administrative

1.1. Denumirea comercială a produsului

BROS -MOMEALA RATICIDA SUB FORMA DE BOABE DE GRÂU IMPREGNATE
BROS GRÂU RATICID

1.2. Detinatorul autorizației

Numele și adresa detinatorului autorizației	Numele	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.
	Adresa	Karpia 24 61-619 Poznan Polonia
Numărul curent	RO/2014/0087/MRA/ES/AA-2013-14-00110	
Numărul curent R4BP 3	RO-0008243-0000	
Data autorizației	30/10/2013	
Data de expirare a autorizației	01/01/2023	

1.3. Producătorul (Producătorii) produselor biocide

Numele producatorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Adresa locurilor de producție	C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Numele producatorului	BROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Adresa producătorului	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia
Adresa locurilor de producție	ul. Karpia 24 61-619 Poznań Polonia

1.4. Producatorul (producatorii) substanței (substanțelor) active

Substanța activă	12 - Bromodiolonă
Numele producătorului	Laboratorios Agrochem S.L.
Adresa producătorului	C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Adresa locurilor de producție	C/Tres Rieres,10 08292 Esparreguera (Barcelona) Spania
Substanța activă	12 - Bromodiolonă
Numele producătorului	Dr Tezza S.r.L.
Adresa producătorului	Via Tre Ponți, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia
Adresa locurilor de producție	Via Tre Ponți, 22 37050 S.Maria de Zevio (VR) Italia

2. Compoziția și formularea produsului

2.1. Informații calitative și cantitative despre compoziția produsului biocid

Denumirea comună	Denumirea IUPAC	Funcția	Numărul CAS	Numărul CE	Continut (%)
Bromodiolonă	3-[3-(4'-Bromo[1,1'-biphenyl]-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one	Substanța activă	28772-56-7	249-205-9	0.0029

2.2. Tipul preparatului

gata de utilizare: grăunțe

3. Fraze de pericol și de precauție

Fraze de pericol

Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.

Fraze de precauție

A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Citiți eticheta înainte de utilizare.

Nu inspirați praful.

Purtați mănuși de protecție.

Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

Aruncați conținutul la în categoria deșeurilor periculoase, la unitatea autorizată, în conformitate cu reglementările curente..

4. Utilizare (utilizări) autorizată (autorizate)

4.1 Modul de utilizare

Utilizarea 1 - Utilizare #1 - Șoareci de casă și șobolani brun- Utilizare generală - în interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte

Rattus norvegicus-șobolani brun- Juvenile și Adulte

Domeniul de utilizare

de interior

în interior

Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 - -
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Greutatea maximă a pachetului e 150g. Numărul de pungi per pachet: până la 150g Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

4.1.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 2 până la 3 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.

4.1.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea secțiunea 5.2

4.1.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

a se vedea secțiunea 5.3

4.1.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.1.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.2 Modul de utilizare

Utilizarea 2 - Utilizare #2 - Șobolani bruni - Utilizare generală - În exterior, în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Rattus norvegicus-șobolani brunii-Juvenile și Adulte
Domeniul de utilizare	în aer liber În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile.
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 - -
Categoria (categoriile) de utilizatori	Publicul larg (neprofesionist)
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Greutatea maximă a pachetului e 150g. Numărul de pungi per pachet: până la 150g Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

4.2.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocuiți orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.

4.2.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea secțiunea 5.2

4.2.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

a se vedea secțiunea 5.3

4.2.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.2.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.3 Modul de utilizare

Utilizarea 3 - Utilizare #3 - Șoareci de casă - Uz profesional - în interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte
Domeniul de utilizare	de interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în pliculețe sau ca momeală vrac
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 - -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Greutatea minimă a pachetului e 3kg Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 60 g Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC . Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.



4.3.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate la cel puțin 2-3 zile la începutul tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Re-umpleți cu momeală dacă este necesar.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.3.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea secțiunea 5.2

4.3.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.3.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

--

4.3.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.4 Modul de utilizare

Utilizarea 4 - Utilizare #4 - Șobolani bruni - Uz profesional - în interior

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte
Domeniul de utilizare	de interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în pliculețe sau ca momeală vrac
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 - -
Categoria (categoriile) de utilizatori	profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Greutatea minimă a pachetului e 3kg

Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.

Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.

4.4.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate doar la 5 până la 7 zile după începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.4.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

a se vedea secțiunea 5.2

4.4.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.4.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.4.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.5 Modul de utilizare

Utilizarea 5 - Utilizare #5 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional - În exterior, în jurul clădirilor

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)

Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte

Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte

Domeniul de utilizare

În aer liber

În exterior, în jurul clădirilor

Metoda (metodele) de aplicare

Aplicare momeală -

Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în pliculețe sau ca momeală vrac

Doza (dozele) și frecvența de aplicare

Șoareci: cutii pentru momeală cu 60g de produs la fiecare 5-10 m. 60 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). Șobolani: cutii pentru momeală cu 100 g de produs la fiecare 5-10m. 100 g de momeală per cutie pentru momeală. Dacă este necesar mai mult de o cutie pentru momeală, distanța minimă dintre cutii trebuie să fie de 5-10 m (5 m în caz de infestare puternică și 10 m în caz de infestare slabă). - 0 -
-

Categoria (categoriile) de utilizatori

profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg

Numărul de pungă per pachet: până la 10 kg.

Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungă, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .
Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.

4.5.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici (de ex.. Ploaie, zăpadă, etc). Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Cutiile pentru momeală trebuie vizitate [pentru șoareci - cel puțin 2-3 zile la] [pentru șobolani - doar la 5-7 zile după] începerea tratamentului și cel puțin săptămânal după aceea, pentru a verifica dacă momeala este acceptată, să se verifice dacă cutiile pentru momeală sunt intacte și pentru a îndepărta cadavrele rozătoarelor. Reumpleți cu momeală, dacă este necesar.
- Înlocuiți orice momeală dintr-o cutie care a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.5.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.5.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Atunci când plasați cutia pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanțuri, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că momeala nu intră în contact cu apa.

4.5.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.5.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.6 Modul de utilizare

Utilizarea 6 - Utilizare #6 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - în interior

Tipul produsului

TP 14 - Rodenticide

Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz

Nu este relevant pentru rodenticide

Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte
Domeniul de utilizare	de interior în interior
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în pliculețe sau ca momeală vrac
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șobolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală; Șoareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală - 0 - -
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Greutatea minimă a pachetului e 3kg Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC . Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.

4.6.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.6.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
 - Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei.
 - Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
 - Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
 - Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
 - Folosiți acest produs doar în interior și în spații inaccesibile pentru copii sau animale non-țintă.

4.6.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.6.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.6.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate al produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.7 Modul de utilizare

Utilizarea 7 - Utilizare #7 - Șoareci de casă și/sau șobolani bruni - Uz profesional instruit - În exterior, în jurul clădirilor

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte Mus musculus-Șoareci de casă-Juvenile și Adulte
Domeniul de utilizare	în aer liber În exterior, în jurul clădirilor
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în pliculețe sau ca momeală vrac
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șobolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală; Șoareci: cutii pentru momeală cu 60-100 g per punct de amplasare momeală - 0 - -
Categoria (categoriile) de utilizatori	instruiți profesional
Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare	Greutatea minimă a pachetului e 3kg Numărul de punji per pachet: până la 10 kg. Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g Ambalaj: cutii, punji, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC . Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.



4.7.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici. Plasați punctele pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundării.
- Înlocuiți orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.7.2 Măsuri specifice de reducere a riscului de utilizare


- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.7.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanțuri, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.7.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4



4.7.5 In functie de modul de utilizare, conditiile de depozitare si termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

4.8 Modul de utilizare

Utilizarea 8 - Utilizare #8 - Șobolani bruni - Uz profesional instruit - Zone exterioare deschise și gropi de gunoi

Tipul produsului	TP 14 - Rodenticide
Descrierea exactă a utilizării autorizate, după caz	Nu este relevant pentru rodenticide
Organism(organisme)-țintă (inclusiv stadiul de dezvoltare)	Rattus norvegicus-șobolani bruni-Juvenile și Adulte
Domeniul de utilizare	în aer liber Zone exterioare deschise și gropi de gunoi
Metoda (metodele) de aplicare	Aplicare momeală - Momeală gata de utilizare pentru a fi plasată în cutii pentru momeală inviolabile, în pliculețe sau ca momeală vrac
Doza (dozele) și frecvența de aplicare	Șobolani: cutii pentru momeală cu 100-200 g per punct de amplasare momeală. - 0 - -

Categoria (categoriile) de utilizatori

instruiți profesional

Dimensiunile ambalajului și materialul de ambalare

Greutatea minimă a pachetului e 3kg

Numărul de pungi per pachet: până la 10 kg.

Grame/kg de momeală per pungă ambalată: pliculețe individuale de la 10 la 100 g
Ambalaj: cutii, pungi, saci, găleți, tuburi, sticle și pliculețe. Material: Carton + PET sau LDPE, PE sau PP sau PET sau LDPE sau PET / PET MET / PE sau PET / ALU / PE sau PET / PE sau PA / PE, HDPE, PVC .

Mai mult, produsul poate fi furnizat sub formă de momeală vrac direct în interiorul ambalajului secundar menționat mai sus.

4.8.1 Instrucțiuni specifice de utilizare

- Protejați momeala de acțiunea factorilor atmosferici. Plasați cutiile pentru momeală în zone care nu sunt supuse inundațiilor.
- Înlocuiți orice momeală din punctele în care momeala a fost deteriorată de acțiunea apei sau contaminată de reziduuri.
- Îndepărtați produsul rămas la finalul tratamentului.
- Respectați orice instrucțiuni suplimentare, prevăzute de codul bunelor practici relevant.

4.8.2 Măsurile specifice de reducere a riscului de utilizare

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, conform recomandărilor codurilor de bune practici în domeniu.
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Nu utilizați produsul în tratamentele cu momeală cu impulsuri.
- Nu aplicați acest produs direct în vizuine.

4.8.3 În funcție de modul de utilizare, particularități ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- La plasarea punctelor pentru momeală în apropierea apelor de suprafață (de ex. râuri, iazuri, canale de scurgere a apei, șanțuri, canale de irigație) sau sistemelor de scurgere a apei, asigurați-vă că se evită contactul momelei cu apa.

4.8.4 În funcție de modul de utilizare instrucțiunile pentru eliminarea în siguranță a produsului și ambalajul acestuia

a se vedea secțiunea 5.4

4.8.5 În funcție de modul de utilizare, condițiile de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

a se vedea secțiunea 5.5

5. Direcții generale de utilizare

5.1. Instrucțiuni de utilizare

Utilizare generală

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Înainte de utilizarea rodenticidelor, mai întâi aplicați metode non- chimice (de ex. capcane) .
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Nu deschideți pliculețele cu momeală.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă ținta momelii.
- Plasați cutiile pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Nu plasați cutiile cu momeală lângă scurgeri unde acestea pot intra în contact cu apa.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.

Uz profesionist

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca și componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și a avertiza că nu trebuie mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).
- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă ținta momelii.
- Plasați produsul în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- În cazul în care aportul de momeală este scăzut având în vedere dimensiunea aparentă a infestării, considerați plasarea cutiilor pentru momeală către zone mai îndepărtate, dar și posibilitatea înlocuirii momelii cu o alta cu o componentă diferită.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată și nu este aparentă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare și folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Îndepărtați momeala neconsumată sau cutiile cu momeală rămase la finalul perioadei de tratament.
- Momeală în pliculețe: Nu deschideți pliculețele care conțin momeală
- Momeală vrac: Amplasați momeala în punctul pentru momeală cu ajutorul unui dispozitiv de dozare. Specificați metodele pentru minimizarea prafului (ex. ștergere cu cârpa udă).

Uz profesionist instruit

- Citiți și urmați instrucțiunile de utilizare și prospectele oferite la vânzare, înainte de a utiliza produsul.
- Desfășurați o inspecție pre-momeală a zonei infestate și o evaluare a locației pentru a identifica speciile de rozătoare, zonele de activitate și pentru a determina cauza și amplitudinea infestării.
- Îndepărtați mâncarea imediat accesibilă rozătoarelor (de ex. grăunțe vărsate sau resturi de alimente). De asemenea, nu curățați aria infestată chiar înainte de aplica tratamentul, deoarece acest fapt deranjează populația de rozătoare și face acceptarea momelii mai dificilă.
- Acest produs trebuie utilizat doar ca și componentă a sistemului de gestiune integrată a dăunătorilor (IPM) care include printre altele măsuri de igienă și unde este posibil, măsuri fizice de control.
- Cutiile pentru momeală trebuie plasate în vecinătatea imediată a zonei unde s-a observat activitate a rozătoarelor (de ex. drum de acces, cuiburi, zone de hrană, găuri, vizuine etc.).
- Acolo unde este posibil, cutiile pentru momeală trebuie fixate în pământ sau în diverse structuri.
- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate în mod clar pentru a arăta că acestea conțin rodenticide și a avertiza că nu trebuie

mutate sau deschise (vezi secțiunea 5.3 pentru informațiile cuprinse pe etichete).

- La utilizarea produsului în zone publice, zonele tratate trebuie marcate pe durata tratamentului unde trebuie plasat un avertisment cu privire la riscul de otrăvire primară sau secundară cu anticoagulant, care de asemenea trebuie să indice în apropierea cutiilor cu momeală și măsurile de prim ajutor care trebuie luate în caz de otrăvire.
- Momeala trebuie securizată pentru a nu fi scoasă din cutia cu momeală.
- Plasați produsul în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă sau a altor animale care nu reprezintă ținta momelii.
- Plasați produsul pentru momeală în afara zonelor unde există alimente, băuturi sau hrană pentru animale, dar și departe de ustensilele sau suprafețele care pot intra în contact cu hrana sus-menționată.
- Purtați mănuși din plastic rezistente la produse chimice pe durata manipulării produsului.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncați, nu beți și nici nu fumați. Spălați mâinile și alte zone ale pielii expuse la produs după utilizarea acestuia.
- Frecvența vizitelor în zona tratată este stabilită de operator, luând în considerare inspecția desfășurată la începutul tratamentului. Frecvența trebuie să fie consecventă cu recomandările oferite de codul de bune practici.
- În cazul în care aportul de momeală este scăzut având în vedere dimensiunea aparentă a infestării, considerați plasarea cutiilor pentru momeală către zone mai îndepărtate, dar și posibilitatea înlocuirii momelii cu o alta cu o componentă diferită.
- Dacă după o perioadă de 35 de zile momeala este în continuare consumată și nu este aparentă o scădere a activității rozătoarelor, trebuie determinată cauza. Atunci când au fost excluse celelalte elemente, este posibil ca rozătoarele să fie rezistente, astfel că trebuie luată în considerare utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant, acolo unde este posibil, sau a unui anticoagulant mai puternic. De asemenea, trebuie luată în considerare și folosirea capcanelor ca metodă alternativă de control.
- Momeală în pliculețe: Nu deschideți pliculețele care conțin momeală
- Momeală vrac: Amplasați momeala în punctul pentru momeală cu ajutorul unui dispozitiv de dozare. Specificați metodele pentru minimizarea prafului (ex. ștergere cu cârpa udă).

5.2. Măsurile de reducere a riscurilor

Utilizare generală

- Luați în considerare măsuri preventive (de ex. astupați găurile, îndepărtați potențialele surse de mâncare și apă pe cât posibil) pentru a îmbunătăți aportul de momeală și reducerea posibilității de reapariție a invaziei
- Nu utilizați produsul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
 - produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex."utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
 - utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului (de ex.. încă se observă activitate a rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.
- Căutați și îndepărtați rozătoarele moarte pe durata tratamentului, cel puțin la inspectarea cutiilor pentru momeală.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

Uz profesionist

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur (de ex. utilizatorii ariei tratate, . și ai împrejurimilor) cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Pentru a reduce riscul de otrăvire secundară, căutați și îndepărtați rozătoarele moarte frecvent pe parcursul tratamentului, (cel puțin de două ori pe săptămână)
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați anticoagulantul ca momeală permanentă pentru prevenirea infestării cu rozătoare sau pentru monitorizarea activității rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar următoarele:
 - produsul nu va fi furnizat publicului general (de ex. "doar pentru uz profesionist").
 - produsul trebuie utilizat în cadrul cutiilor pentru momeală inviolabile (de ex."utilizați doar în cutii pentru momeală inviolabile").
 - utilizatorii vor eticheta corespunzător cutiile pentru momeală cu informațiile cuprinse în secțiunea 5.3 a SPC (ex. "etichetați cutiile pentru momeală conform recomandărilor de pe produs")
- Utilizarea acestui produs trebuie să elimine rozătoarele în 35 de zile. Informațiile produsului (de ex. eticheta și/ sau prospectul) vor recomanda ca în cazul în care se suspectează lipsa eficacității la finalul tratamentului (de ex.. încă se observă activitate a rozătoarelor), utilizatorul trebuie să apeleze la consiliere din partea furnizorului produsului sau să apeleze la un serviciu de control al dăunătorilor.
- Nu spălați cu apă cutiile pentru momeală între aplicații.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

Uz profesionist instruit

- Când este posibil, înainte de aplicarea tratamentului, informați persoanele din jur cu privire la campania de control al rozătoarelor.
- Informațiile despre produs (eticheta și/ sau prospectul) vor specifica în mod clar că produsul va fi furnizat doar pentru utilizare profesionistă - profesioniști care dețin o certificare care este în conformitate cu cerințele aplicabile de instruire (respectiv, „doar pentru profesioniști instruiți”).
- Nu utilizați în zone unde se suspectează rezistența la substanța activă.
- Produsele nu vor fi folosite mai mult de 35 de zile fără o evaluare a stadiului infestării și eficacității tratamentului.
- Nu utilizați alternativ diferiți anticoagulanți cu putere comparabilă sau mai slabă, din motive de rezistență. Pentru tratament alternativ, luați în considerare un rodenticid anticoagulant, dacă este disponibil, sau un anticoagulant mai puternic.
- Nu spălați cu apă între utilizări cutiile pentru momeală sau ustensilele care se utilizează pentru cutiile acoperite sau protejate între aplicații.
- îndepărtați cadavrele rozătoarelor conform prevederilor locale.

5.3. Particularitati ale efectelor posibile directe sau indirecte, instrucțiuni de prim ajutor și măsuri de urgență pentru protecția mediului

- Acest produs conține o substanță anticoagulantă. La ingerare, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot include sângerări nazale și gingivale. În cazurile severe, pot apărea echimoze și prezența sângelui în urină sau fecale.

- Antidot: Vitamina K1 administrată doar de personal medical sau veterinar.

- În caz de:

- Contact cu pielea, spălați cu apă și apoi cu apă și săpun.
- Contact cu ochii, verificați întotdeauna dacă există lentile de contact și îndepărtați-le, clătiți ochii cu lichid de clătire sau cu apă, păstrați pleoapele deschise cel puțin 10 minute.
- Contact bucal, clătiți gura cu apă, cu atenție. Nu administrați produse pe cale orală unei persoane care și-a pierdut cunoștința. Nu provocați vomă. În caz de înghițire, consultați imediat medicul, și prezentați ambalajul sau eticheta produsului. Telefon de urgență: +40 - 021 318 36 06. Consultați un chirurg veterinar la ingerarea de către animale de companie.

- Cutiile pentru momeală trebuie etichetate cu următoarele informații: "nu mutați și nu deschideți"; "conține rodenticid"; "denumire comercială sau număr autorizație "; " substanță/ e activă/ e" și "în caz de accident, contactați un centru toxicologic +40 - 021 318 36 06"

- Periculos pentru fauna

5.4. Instrucțiuni pentru eliminarea în siguranță a produsului și a ambalajului acestuia

- La finalul perioadei de tratament, îndepărtați momeala neconsumată și ambalajul conform cerințelor locale.

- Se recomandă utilizarea mănușilor.

5.5. Condiții de depozitare și termenul de valabilitate a produsului în condiții normale de depozitare

- Depozitați în spații uscate, bine ventilate și răcoroase. Păstrați recipientul închis și departe de acțiunea razelor solare.

- Depozitați în afara zonei de acces a copiilor, păsărilor, animalelor de casă, a celor de fermă.

- Durata de viață la raft: doi ani

6. Alte informații

-Datorită acțiunii întârziate, rodenticidele cu anticoagulant sunt eficiente la 4 până la 10 zile de la consumarea momelii.

- Rozătoarele pot fi purtătoare de boli. Nu atingeți rozătoarele moarte cu mâinile neprotejate, utilizați mănuși sau instrumente cum ar fi cleștii pentru preluarea acestora.

- Acest produs conține un agent amar și un colorant.

Cerințe post-autorizare:

- Test de stabilitate pe termen lung în termen de 2 ani.

Etichetarea produsului completă mai jos:

GHS08

Atenție

H373 Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată.

P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

P103 Citiți eticheta înainte de utilizare.

P260 Nu inspirați praful.

P280 Purtați mănuși de protecție.

P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine.

P501 Aruncați conținutul și/sau recipientul în categoria deșeurilor periculoase, la unitatea autorizată, în conformitate cu reglementările curente.