

NL

BIJLAGE

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN VAN EEN BIOCIDEN

FANGA PATE PRO

Productsoort(en)

PT14: Rodenticiden

Toelatingsnummer: BE2016-0015

Toelatingsnummer in R4BP: BE-0014181-0000

Hoofdstuk 1. ADMINISTRATIEVE INFORMATIE

1.1. Handelsnaam (-namen) van het product

Handelsnaam (-namen)	FANGA PATE PRO EXTREM PATE TERMIRATOR
----------------------	---

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de houder van de toelating	Naam	TRIPLAN SA
	Adres	BP 258 LA POSTE FRANCAISE AD500 ANDORRA LA VELLA Frankrijk
Toelatingsnummer		BE2016-0015
<i>Toelatingsnummer in R4BP</i>		BE-0014181-0000
Toelatingsdatum		04/08/2014
Vervaldatum		31/12/2026

1.3. Fabrikant(en) van het product

Naam van de fabrikant	IRIS
Adres van de fabrikant	1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint Privat 30 340 SALINDRES Frankrijk
Productielocaties	IRIS site 1 1126A, Avenue du Moulinas, Route de Saint Privat 30340 SALINDRES Frankrijk

Naam van de fabrikant	INDUSTRIAL CHEMICAL SRL
Adres van de fabrikant	Via Sorgaglia 40 I-35020 Arre (PD) Italië
Productielocaties	INDUSTRIAL CHEMICAL SRL site 1 Via Sorgaglia 40 I-35020 Arre (PD) Italië

Naam van de fabrikant	NOXIMA
Adres van de fabrikant	CARREFOUR JEAN MONNET / LACROIX SAINT- OUEN 60201 Compiègne Frankrijk
Productielocaties	NOXIMA site 1 Carrefour Jean Monnet / Lacroix Saint-Ouen 60201 Compiègne Frankrijk

Naam van de fabrikant	FARMAVIT OOD
Adres van de fabrikant	Bul Tsar Boris III, n°63, Office n°1 1612 SOFIA Bulg arije
Productielocaties	FARMAVIT OOD site 1 Industrialna 2 str, Pleven District 5960 GULIANTSI Bulgarije

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	Brodifacum
Naam van de fabrikant	ACTIVA/TEZZA

Adres van de fabrikant	Via feltre 32 20132 Milan Italië
Productielocaties	ACTIVA/TEZZA site 1 Via tre ponti 22 37050 S. Maria Di Zevio (VR) Italië

Hoofdstuk 2. PRODUCTSAMENSTELLING EN -FORMULERING

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van het product

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Brodifacum	3-[3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxycoumarin	werkzame stof	56073-10-0	259-980-5	0,005 % (m/m)

2.2. Type(n) formulering

RB Lokmiddel (klaar voor gebruik)

Hoofdstuk 3. GEVARENAANDUIDINGEN EN VEILIGHEIDSAANBEVELINGEN

Gevarenaanduidingen	H360D: Kan het ongeboren kind schaden. H373: Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling (bloed).
Veiligheidsaanbevelingen	P201: Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen. P202: Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft. P260: rook niet inademen. P280: Draag Beschermende handschoenen. P308+P313: IF exposed or concerned: Get medical advice/attention. P314: Get medical advice/attention if you feel unwell. P405: Achter slot bewaren. P501: Inhoud/Verpakking afvoeren in overeenstemming met de geldende nationale / regionale bepalingen afvoeren naar {1:...:}.

Hoofdstuk 4. TOEGELATEN GEBRUIK

4.1. Beschrijving van het gebruik

Tabel 1. HUISMUIZEN EN/OF RATTEN - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - BINNEN

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	<p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p>
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Lokaasformuleringen: - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistant lokaaskisten - [Aasstations bedekt en beschermd]
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter / Muizen: - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Lokaasproducten:</p> <p>Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter</p>

	<p>- Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter</p> <p>Muizen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg</p> <p>FANGA PATE PRO wordt geleverd in een papieren zakje (10 en 20 g).</p> <p>Sachets zijn verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HDPE of PP emmer (5, 10, 15, 18, 20 kg) - PE zakken in kartonnen en metalen dozen (5, 10, 12, 15, 20, 50 kg)

4.1.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.1.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].
 - Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.
 - Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.
 - Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

4.1.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaaskisten dicht bij afwateringssysteem worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.1.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.1.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.2. Beschrijving van het gebruik

Tabel 2. MUIZEN EN/OF RATTEN - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - BUITEN ROND GEBOUWEN

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Lokaasformuleringen: - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistant lokaaskisten - [Aasstations bedekt en beschermd]

Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Ratten : - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter , Muizen: - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter</p> <p>Aantal en timing van de toepassing: Lokaasproducten: Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter</p> <p>Muizen: - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter</p>
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg</p> <p>FANGA PATE PRO wordt geleverd in een papieren zakje (10 en 20 g). Sachets zijn verpakt in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - HDPE of PP emmer (5, 10, 15, 18, 20 kg) - PE zakken in kartonnen en metalen dozen (5, 10, 12, 15, 20, 50 kg)

4.2.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen atmosferische omstandigheden . Plaats de lokaaskisten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in lokaaskisten waar het lokaas werd aangetast door water of verontreinigd werd
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.
- Voor gebruik buitenshuis moeten aasstations worden afgedekt en op strategische locaties worden geplaatst om de blootstelling aan niet-doelsoorten zoveel mogelijk te beperken.

4.2.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".
- Overweeg preventieve bestrijdingsmaatregelen (holen dichtstoppen, mogelijk voedsel en drinken zo veel mogelijk verwijderen) om inname van het product te verbeteren en de kans op een nieuwe invasie te verminderen.

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

- Gebruik het product niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.

- Gebruik het product niet in pulsed baiting lokaasbehandelingen.

4.2.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer lokaaskisten dicht bij oppervlaktewateren of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.2.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.2.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.3. Beschrijving van het gebruik

Tabel 3. MUIZEN EN/OF RATTEN - gereserveerd voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid - OPEN GEBIEDEN BUITEN & VUILSTORTPLAATSEN

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus

	<p>Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren</p> <p>Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren</p>
Toepassingsgebied(en)	<p>gebruik buiten overig: Other</p> <p>Open gebieden buiten (muizen en/of ratten) Vuilstortplaatsen buiten (ratten)</p>
Toepassingsmethode(n)	<p>Methode: Lokaas toepassing</p> <p>Gedetailleerde beschrijving: Lokaasformuleringen: - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistent lokaaskisten - [Aasstations bedekt en beschermd]</p>
Dosering(en) en frequentie	<p>Toe te passen dosis: Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter , Muizen : - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter</p> <p>Aantal en timing van de toepassing:</p> <p>Lokaasproducten:</p> <p>Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter</p> <p>Muizen: - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter</p>
Categorie/categorieën gebruikers	<p>professionele gebruiker</p>
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	<p>Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg</p> <p>FANGA PATE PRO wordt geleverd in een papieren zakje (10 en 20 g).</p> <p>Sachets zijn verpakt in:</p> <p>- HDPE of PP emmer (5, 10, 15, 18, 20 kg)</p>

	- PE zakken in kartonnen en metalen dozen (5, 10, 12, 15, 20, 50 kg)
--	--

4.3.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden. Plaats de aaspunten in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- Vervang lokaas in aaspunten waar lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.
- Verwijder het resterende product aan het einde van de behandelperiode.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.
- Voor gebruik buitenshuis moeten aasstations worden afgedekt en op strategische locaties worden geplaatst om de blootstelling aan niet-doelsoorten zoveel mogelijk te beperken

4.3.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar]".
- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging te voorkomen, in lijn met de aanbevelingen die de desbetreffende best practice code geeft.

4.3.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer aaspunten dicht bij oppervlaktewateren of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.3.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.3.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.4. Beschrijving van het gebruik

Tabel 4. HUISMUIZEN - PROFESSIONALS - BINNEN

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: <i>Mus musculus</i> Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistent lokaaskisten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 30 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdoos 1 tot 2 meter te zijn. Aantal en timing van de toepassing: 30 g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdoos 1 tot 2 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg FANGA PATE PRO wordt geleverd in een papieren zakje (10 en 20 g). Sachets zijn verpakt in: - HDPE of PP emmer (5, 10, 15, 18, 20 kg) - PE zakken in kartonnen en metalen dozen (5, 10, 12, 15, 20, 50 kg)

4.4.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- De aasstations dienen aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.4.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.4.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer aasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.4.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.4.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

4.5. Beschrijving van het gebruik

Tabel 5. RATTEN - PROFESSIONALS - BINNEN

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren

	Wetenschappelijke naam: <i>Rattus norvegicus</i> Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren
Toepassingsgebied(en)	gebruik binnen Binnen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistant lokaaskisten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: 180g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdoos 5 tot 10 meter te zijn. Aantal en timing van de toepassing: 180g lokaas per lokaasdoos. Als er meer dan één lokaasdoos nodig is, dient de minimale afstand tussen lokaasdoos 5 tot 10 meter te zijn.
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg FANGA PATE PRO wordt geleverd in een papieren zakje (10 en 20 g). Sachets zijn verpakt in: - HDPE of PP emmer (5, 10, 15, 18, 20 kg) - PE zakken in kartonnen en metalen dozen (5, 10, 12, 15, 20, 50 kg)

4.5.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- De aasstations dienen pas 5 à 7 dagen na het begin van de behandeling te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.5.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

-

4.5.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer aasstations dicht bij afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.5.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.5.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

+

4.6. Beschrijving van het gebruik

Tabel 6. HUISMUIZEN EN/OF RATTEN - PROFESSIONALS - BUITEN ROND GEBOUWEN

Productsoort	PT14: Rodenticiden
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Niet relevant voor rodenticiden
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus rattus Triviale naam: roof rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren Wetenschappelijke naam: Rattus norvegicus Triviale naam: brown rat Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: volwassen exemplaren Wetenschappelijke naam: Mus musculus Triviale naam: house mouse Ontwikkelingsstadia: juveniele exemplaren

Toepassingsgebied(en)	gebruik buiten Buiten rond gebouwen
Toepassingsmethode(n)	Methode: Lokaas toepassing Gedetailleerde beschrijving: - Kant-en-klaar lokaas moet worden uitgelegd in tamper resistent lokaaskisten
Dosering(en) en frequentie	Toe te passen dosis: Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter Muizen: - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter Aantal en timing van de toepassing: Lokaasproducten: Ratten: - Grote plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 5 meter - Geringe plaag: 180g lokaas per lokaaskist elke 10 meter Muizen: - Grote plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 1 meter - Geringe plaag: 30g lokaas per lokaaskist elke 2 meter
Categorie/categorieën gebruikers	professionele gebruiker
Verpakkingsgrootten en verpakkingsmateriaal	Minimale verpakkingsgrootte van 3 kg FANGA PATE PRO wordt geleverd in een papieren zakje (10 en 20 g). Sachets zijn verpakt in: - HDPE of PP emmer (5, 10, 15, 18, 20 kg) - PE zakken in kartonnen en metalen dozen (5, 10, 12, 15, 20, 50 kg)

4.6.1. Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

- Bescherm lokaas tegen weersomstandigheden (bijv. regen, sneeuw enz.). Plaats de aasstations in gebieden waar geen overstromingen kunnen optreden.
- De aasstations dienen [voor muizen – aan het begin van de behandeling ten minste om de 2 à 3 dagen] [voor ratten – pas 5 tot 7 dagen na het begin van de behandeling] te worden bezocht en daarna ten minste wekelijks, om te controleren of het lokaas geaccepteerd wordt en de aasstations intact zijn en om lijken van knaagdieren te verwijderen. Lokaas indien nodig aanvullen.
 - Vervang lokaas in een aasstation als het lokaas beschadigd is door water of verontreinigd is door vuil.
- [Indien beschikbaar] Volg alle aanvullende aanwijzingen die in de relevante best practice code staan.

4.6.2. Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

- Dit product niet direct in de holen toepassen.

4.6.3. Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

- Wanneer aasstations dicht bij oppervlaktewateren (bijv. rivieren, vijvers, kanalen, dijken, sloten) of afwateringssystemen worden geplaatst, zorg er dan voor dat contact van het lokaas met water wordt voorkomen.

4.6.4. Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

-

4.6.5. Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

-

Hoofdstuk 5. ALGEMENE GEBRUIKSAANWIJZING¹

5.1. Gebruiksaanwijzingen

- Lees en volg de productinformatie evenals de informatie die bij het product wordt geleverd of wordt meegegeven in het verkooppunt, alvorens het product te gebruiken.
- Voer voorafgaand aan de behandeling een onderzoek uit in het geïnfesteerde gebied en een beoordeling ter plekke om te bepalen om welke knaagdiersoort het gaat en waar de knaagdieren actief zijn, en om de waarschijnlijke oorzaak en de ernst van de plaag te achterhalen.
- Verwijder voedsel dat gemakkelijk bereikbaar is voor knaagdieren (bijv. gemorst graan of voedselafval). Maak afgezien daarvan het geïnfesteerde gebied niet vlak voor de behandeling schoon, aangezien dit de knaagdierpopulatie alleen maar verstoort en de acceptatie van lokaas lastiger maakt.
- Het product mag uitsluitend worden gebruikt als onderdeel van een geïntegreerd plaagbeheersysteem, met onder andere hygiënemaatregelen en, waar mogelijk, fysieke bestrijdingsmethoden.
- Aasstations dienen te worden geplaatst in de onmiddellijke nabijheid van plaatsen waar eerder knaagdieractiviteit is waargenomen (bijv. looproutes, nesten, voerplaatsen, holen enz.).

- Waar mogelijk moeten aasstations aan de grond of andere structuren worden vastgemaakt.
- Aasstations moeten duidelijke etiketten hebben waarop staat dat zero-denticiden bevatten en dat ze niet verplaatst of geopend mogen worden (zie rubriek 5.3 voor de informatie die op het etiket moet staan).
- Wanneer het product in openbare gebieden wordt gebruikt, dienen de behandelde gebieden tijdens de behandelperiode te worden gemarkeerd en moet bij het lokaas een mededeling beschikbaar worden gesteld waarin het risico op primaire of secundaire vergiftiging door het antistollingsmiddel wordt uitgelegd en de eerste maatregelen worden aangegeven die moeten worden genomen in geval van vergiftiging.
- Het lokaas dient zo vast gemaakt te worden dat het niet weggesleept kan worden van de lokaaskist.

- Plaats het product buiten het bereik van kinderen, vogels, huisdieren, boerderijdieren en andere niet-doeldiersoorten.
- Plaats het product uit de buurt van voedsel, drinken en diervoeder, en ook van gebruiksvoorwerpen of oppervlakken die daarmee in contact komen.
- Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- Handen en direct blootgestelde huid wassen na gebruik van dit product.
- Maak de sachets die het lokaas bevatten niet open.

Voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

- De frequentie van bezoeken aan het behandelde gebied moet worden bepaald naar eigen goeddunken professional of gecertificeerde gebruiker, in het licht van het onderzoek aan het begin van de behandeling. Deze frequentie moet consistent zijn met de aanbevelingen in de praktijkcode van toepassing.
- Als de inname van het lokaas laag is ten opzichte van de schijnbare omvang van de plaag, overweeg dan verplaatsing van de lokaaskisten naar verderop gelegen plaatsen en de mogelijkheid om over te gaan op een andere lokaasformulering.
- Als het lokaas na een behandelingsperiode van 35 dagen nog steeds geconsumeerd wordt en geen afname in knaagdieractiviteit wordt waargenomen, moet de waarschijnlijke oorzaak worden vastgesteld. Wanneer andere elementen zijn uitgesloten, is het waarschijnlijk dat er resistente knaagdieren zijn. Overweeg dan het gebruik van een niet-bloedverdunnende rodenticide, als die beschikbaar is, of een sterkere bloedverdunnende rodenticide. Overweeg ook het gebruik van vallen als alternatieve beheersingsmaatregel.

Alleen voor professionals:

- Overweeg preventieve maatregelen (blokkeer holen, verwijder alle voedsel en drank) om de aasconsumptie te vergroten en het risico op herinvasie te verminderen.
- Verwijder het resterende lokaas of de aasstations aan het einde van de behandelperiode.

¹De gebruiksaanwijzing, de risicobeperkende maatregelen en de andere aanwijzingen voor het gebruik in dit deel gelden voor elk toegelaten gebruik.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

- Informeer indien mogelijk voorafgaand aan de behandeling eventuele omstanders (bijv. gebruikers van het behandelde gebied en de omgeving) over de knaagdierbestrijdingscampagne [in overeenstemming met de toepasselijke good practice code, indien beschikbaar].
- De informatie over het product (dat wil zeggen het etiket en/of de bijsluiter) heeft duidelijk aan te geven dat het product moet worden bevrijd(geleverd) alleen voor professionele gebruikers (bijvoorbeeld " voor de professionals alleen ").
- Producten mogen niet langer dan 35 dagen worden gebruikt zonder een evaluatie van de staat van de plaag en de doeltreffendheid van de behandeling.
- Niet wassen met water-aasstations of gereedschap dat wordt gebruikt in overdekte en beschermde lokaasstations tussen toepassingen.
- Voer knaagdierkadavers af in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften [Dode knaagdieren moeten worden verwijderd en vernietigd door een gespecialiseerd of erkend bedrijf]

Voor professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid:

- Niet gebruiken op plaatsen waar eventueel resistentie tegen de werkzame stof kan voorkomen.
- Gebruik met het oog op resistentiemanagement geen verschillende bloedverdunnende middelen met overeenkomstige of zwakkere potentie door elkaar. Kies voor afwisselend gebruik een niet-bloedverdunnende rodenticide, indien een dergelijk product beschikbaar is, of een krachtiger bloedverdunnend middel.

Alleen voor professionals:

- Zoek en verwijder tijdens de behandeling met frequente tussenpozen (bijv. ten minste twee keer per week) dode knaagdieren om het risico op secundaire vergiftiging tegen te gaan. [Geef indien van toepassing aan of vaker wordt geïnspecteerd of dagelijks is vereist]
- Gebruik lokaas dat werkzame bloedverdunnende stoffen bevat niet als permanent lokaas ter preventie van knaagdierplagen of om knaagdieractiviteit te monitoren.
- Met behulp van dit product zouden knaagdieren binnen 35 dagen geëlimineerd moeten zijn. De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk aan te bevelen dat de gebruiker in geval van vermoed gebrek aan werkzaamheid aan het eind van de behandeling (d.w.z. er wordt nog steeds knaagdieractiviteit waargenomen) de productleverancier moet raadplegen of een plaagbestrijdingsdienst moet bellen.
- De productinformatie (d.w.z. etiket en/of bijsluiter) dient duidelijk te vermelden dat:
 - Het product mag niet aan het algemene publiek worden geleverd (bijv. "uitsluitend voor professionals").
 - Het product dient te worden gebruikt in daarvoor geschikte verzegelde aasstations (bijv. "uitsluitend gebruiken in verzegelde aasstations").
 - Gebruikers aasstations passend dienen te voorzien van de informatie die in rubriek 5.3 van de samenvatting van de productkenmerken staat (bijv. "etiketteer aasstations conform de productaanbevelingen")

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

- Dit product bevat een antistollingsmiddel. Bij inslikken kunnen, mogelijk met enige vertraging, symptomen optreden zoals een bloedneus en bloedend tandvlees. In ernstige gevallen kunnen bloeduitstortingen optreden en kan bloed aanwezig zijn in de ontlasting of urine.
- Tegengif: vitamine K1, uitsluitend toe te dienen door medisch/veterinair personeel.
 - Lokaaskisten moeten worden voorzien van de volgende informatie: "niet verplaatsen of openen"; "bevat een rodenticide"; "productnaam of toelatingsnummer"; "werkzame stof(fen)" en "in geval van een vergiftiging, neem contact op met een professionele hulpverlener die contact kan opnemen met het vergiftigingsinformatiecentrum".

-
- Gevaarlijk voor dieren in het wild.
 - In geval van:
 - o Blootstelling via de huid: de huid met water wassen en vervolgens met water en zeep.
 - o Blootstelling van de ogen: de ogen spoelen met oogspoelvloeistof of water, oogleden ten minste tien minuten open houden.
 - o Blootstelling via de mond: de mond zorgvuldig met water spoelen. Nooit iets aan een bewusteloze persoon toedienen via de mond. Geen braken opwekken. Na inslikken onmiddellijk medisch advies inwinnen en verpakking of etiket van het product tonen. Neem in geval van inslikken door een huisdier contact op met een dierenarts.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

- Verwijder ongegeten lokaas en de verpakking aan het eind van de behandeling in overeenstemming met lokale vereisten [De verpakking en (ongegeten) restanten van rodenticiden worden beschouwd als gevaarlijke afval. Het afvoeren en vernietigen dient te gebeuren door een hiertoe gespecialiseerde of vergunde onderneming].

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

- Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren. De verpakking afgesloten en niet in direct zonlicht bewaren.
- Op een plaats bewaren waartoe kinderen, vogels, huis- en boerderijdieren geen toegang hebben.
- Houdbaarheid: 2 jaar

Hoofdstuk 6. OVERIGE INFORMATIE

- Vanwege de vertraagde werking kan het na consumptie van hetlokaas 4 tot 10 dagen duren tot bloedverdunnende rodenticiden effectief zijn.
- Knaagdieren kunnen ziekten bij zich dragen. Raak dode knaagdieren niet met blote handen aan, draag handschoenen of gebruik hulpmiddelen zoals een tang bij het verwijderen.
- Dit product bevat een bitterstof en een kleurstof.