

Sommario delle caratteristiche del prodotto biocida

Nome del prodotto: Deosan Activate PVP Plus AG215

Tipi di prodotto: Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Numero di autorizzazione: EU-0019228-0000

**Numero di riferimento
dell'approvazione nel registro
per i biocidi (R4BP 3):** EU-0019228-0005

Indice

Informazioni amministrative	1
1.1. Denominazione commerciale del prodotto	1
1.2. Titolare dell'autorizzazione	1
1.3. Fabbricante/i dei biocidi	1
1.4. Fabbricante/i del/i principio/i attivo/i	2
2. Composizione e formulazione	3
2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida	3
2.2. Tipo di formulazione	3
3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza	3
4. Uso/i autorizzato/i	4
5. Indicazioni generali per l'uso	23
5.1. Istruzioni d'uso	23
5.2. Misure di mitigazione del rischio	23
5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente	24
5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio	24
5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio	24
6. Altre informazioni	25

Informazioni amministrative

1.1. Denominazione commerciale del prodotto

Deosan Activate PVP Plus AG215
Deosan Activate PVP Plus
Agros Iodo-Prev POS-Ordenha
Deosan Hitech 2 AG214
Iodine Teat Dip Solution

1.2. Titolare dell'autorizzazione

Nome e indirizzo del titolare dell'autorizzazione	Nome	Diversey Europe Operations B.V.
	Indirizzo	Maarssebroeksedijk 2 3542 DN Utrecht Paesi Bassi
Numero di autorizzazione	EU-0019228-0000 1-2	
Numero di riferimento dell'approvazione nel registro per i biocidi (R4BP 3)	EU-0019228-0005	
Data di rilascio dell'autorizzazione	03/04/2019	
Data di scadenza dell'autorizzazione	31/03/2029	

1.3. Fabbricante/i dei biocidi

1.4. Fabbricanti dei principi attivi

Principio attivo	1319 - Iodio
Nome del produttore	ACF Minera S.A.
Indirizzo del fabbricante	San Martin No 499 1100000 Iquique Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Lagunas mine 118 0000 Pozo Almonte Cile

Principio attivo	1319 - Iodio
Nome del produttore	Sociedad Quimica y Minera (SQM) S.A.
Indirizzo del fabbricante	Los Militares 4290, Piso 4, Las Condes 8320000 Santiago Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Nueva Victoria plant 5090000 Pedro de Valdivia plant Cile

Principio attivo	1319 - Iodio
Nome del produttore	Cosayach Nitratos S.A.
Indirizzo del fabbricante	Hnos Amunátegui 178 8320000 Santiago Cile
Ubicazione dei siti produttivi	S.C.M. Cosayach Cala Cala 118 0000 Pozo Almonte Cile

Principio attivo	1319 - Iodio
Nome del produttore	Nihon Tennen Gas Development Co., Ltd.
Indirizzo del fabbricante	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Giappone
Ubicazione dei siti produttivi	Chiba Plant, 2508 Minami-Hinata, Shirako-Machi, Chosei-Gun 299-4205 Chiba Giappone

Principio attivo	1319 - Iodio
Nome del produttore	ISE Chemicals Corporation
Indirizzo del fabbricante	3-1, Kyobashi 1-Chome 104-0031 Tokyo Giappone
Ubicazione dei siti produttivi	Shirasto Plant (3695 Kitaimaizumi, Oamishirasato City 299-3201 Chiba Giappone

Principio attivo	1319 - Iodio
Nome del produttore	Atacama Minerals SCM
Indirizzo del fabbricante	Coronel Pereira No 72 Of. 701, Las Condes 8320000 Santiago Cile
Ubicazione dei siti produttivi	Atacama Minerals SCM, Aguas Blancas Facility 3580000 Antofagasta Cile

2. Composizione e formulazione

2.1. Informazioni qualitative e quantitative sulla composizione del biocida

Nome comune	Nomenclatura IUPAC	Funzione	Numero CAS	Numero CE	Contenuto (%)
Iodio		Principio attivo	7553-56-2	231-442-4	0,3

2.2. Tipo di formulazione

AL - Altri liquidi

3. Indicazioni di pericolo e consigli di prudenza

Indicazioni di pericolo	Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
--------------------------------	---

Consigli di prudenza

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Non disperdere nell'ambiente.

Smaltire il prodotto in in conformità alle normative nazionali.

Smaltire il recipiente in in conformità alle normative nazionali.

4. Usi/ autorizzato/i

4.1 Descrizione dell'uso

Usso 1 - Uso 12 Disinfezione pre-mungitura, immersione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Batteri Nome comune: batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>In ambienti interni</p>
Metodi di applicazione	<p>Immersione manuale -</p> <p>Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura</p> <p>Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Concentrazione di iodio in uso. 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. -</p> <p>3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno. Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri
Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri
Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.1.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.
Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.1.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura.

4.1.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.1.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2 Descrizione dell'uso

Usò 2 - Usò 13 Disinfezione pre-mungitura, schiuma per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	<p>Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato</p> <p>Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato</p>
Campo di applicazione	<p>In ambiente chiuso</p> <p>In ambienti interni</p>
Metodi di applicazione	<p>Schiuma per applicazione manuale - -</p> <p>Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. -</p> <p>3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno. Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione</p>
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri</p>

4.2.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.
3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione

4.2.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura.

4.2.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.2.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3 Descrizione dell'uso

Usi 3 - Usi 14 Disinfezione pre-mungitura, spray per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso in ambienti interni

Metodi di applicazione	<p>Spray per applicazione manuale - -</p> <p>Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima della mungitura</p> <p>Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale dello spray.</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. -</p> <p>3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno. Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri</p>

4.3.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante applicazione manuale della spray.
Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni pre-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.3.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti alle sostanze chimiche durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)
Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura

4.3.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.3.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4 Descrizione dell'uso

Uso 4 - Uso 15 Disinfezione post-mungitura, immersione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: bacteria (gram-positive and gram-negative) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Immersione manuale - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.
Dosi di impiego e frequenze	Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. -

	3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.4.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione manuale.
Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.4.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura.

4.4.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.4.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5 Descrizione dell'uso

Uso 5 - Uso 16 Disinfezione post-mungitura, schiuma per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismi bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Schiuma per applicazione manuale - - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.
Dosi di impiego e frequenze	Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. - 3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri
Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri
Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.5.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura con metodo di applicazione della schiuma manuale.
Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.5.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura.

4.5.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.5.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6 Descrizione dell'uso

Uso 6 - Uso 17 Disinfezione post-mungitura, spray per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Yeast Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Spray per applicazione manuale - - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.
Dosi di impiego e frequenze	Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. - 3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.6.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.
Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

4.6.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)
Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura

4.6.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.6.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7 Descrizione dell'uso

Usi 7 - Usi 18 – Disinfezione post-mungitura, spray per applicazione automatica (da non associare a disinfezione pre-mungitura mediante liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi)
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Yeast
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Applicazione automatica spray - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione automatica dello spray.
Dosi di impiego e frequenze	Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. - 5 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Non combinare con disinfezione pre-mungitura a base di iodio. Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.7.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante applicazione automatica dello spray. Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
5 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno. Non combinare con disinfezione pre-mungitura a base di iodio. Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione

4.7.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.7.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8 Descrizione dell'uso

Usi 8 - Usi 19 Disinfezione post-mungitura, immersione semiautomatica (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Immersione semiautomatica (liquido RTU) - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione semiautomatica.

Dosi di impiego e frequenze

Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. -

3 applicazioni post-mungitura per animale al giorno.
Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

Categoria/e di utilizzatori

Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri
Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.8.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale dopo la mungitura mediante immersione semiautomatica. Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni post-mungitura, per animale al giorno.
Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione

4.8.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Nel caso sia necessaria una combinazione di disinfezione pre/post-mungitura, occorre considerare l'utilizzo di un altro prodotto che non contiene iodio per la disinfezione pre/post-mungitura.

4.8.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.8.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9 Descrizione dell'uso

Uso 9 - Uso 20 Disinfezione pre/post-mungitura, immersione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Yeast Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Immersione manuale - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo della mungitura mediante immersione manuale
Dosi di impiego e frequenze	Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. - 3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale). Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale

Dimensioni e materiale dell'imballaggio

Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri

Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri

Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.9.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima della mungitura mediante immersione manuale.
Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale). Applicare un massimo di 10 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.9.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

4.9.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.9.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10 Descrizione dell'uso

Us0 10 - Us0 21 Disinfezione pre/post-mungitura, schiuma per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto	Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria
Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)	-
Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)	Nome scientifico: Batteri Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi) Fase di sviluppo: Nessun dato Nome scientifico: Lieviti Nome comune: Lieviti Fase di sviluppo: Nessun dato
Campo di applicazione	In ambiente chiuso In ambienti interni
Metodi di applicazione	Schiuma per applicazione manuale - - Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.
Dosi di impiego e frequenze	Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p) - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. - 3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale). Applicare un massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.
Categoria/e di utilizzatori	Utilizzatore professionale
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri

4.10.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
Applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale della schiuma.
3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale). Applicare un

massimo di 5 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.10.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto).

4.10.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.10.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conservazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11 Descrizione dell'uso

Usi 11 - 22 Disinfezione pre/post-mungitura, spray per applicazione manuale (liquido RTU)

Tipo di prodotto

Tipo di prodotto 03 - Igiene veterinaria

Descrizione esatta dell'uso autorizzato (se pertinente)

-

Organismo/i bersaglio (compresa la fase di sviluppo)

Nome scientifico: Batteri
Nome comune: Batteri (gram positivi e gram negativi)
Fase di sviluppo: Nessun dato

Nome scientifico: Lieviti
Nome comune: Lieviti
Fase di sviluppo: Nessun dato

Campo di applicazione

In ambiente chiuso

in ambienti interni

Metodi di applicazione	<p>Spray per applicazione manuale - -</p> <p>Disinfettante per mammelle, per l'applicazione diretta su animali in lattazione prima e dopo la mungitura Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.</p>
Dosi di impiego e frequenze	<p>Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p). - Formulazione pronta all'uso contenente 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso. -</p> <p>3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale). Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.</p>
Categoria/e di utilizzatori	<p>Utilizzatore professionale</p>
Dimensioni e materiale dell'imballaggio	<p>Tanica in HDPE o f-HDPE da 1, 5 e 20 litri Fusto in HDPE o f-HDPE da 200 litri</p> <p>Cisterna IBC in HDPE o f-HDPE da 950 litri</p>

4.11.1 Istruzioni d'uso specifiche per l'uso

Da applicare direttamente sulle mammelle dell'animale prima e dopo la mungitura mediante applicazione manuale dello spray.

Formulazione pronta all'uso contenente lo 0,3% p/p di iodio. Non diluire prima dell'uso.
3 applicazioni pre-mungitura e 3 applicazioni post-mungitura, per animale, al giorno (fino a 5 applicazioni in totale). Applicare un massimo di 15 ml di prodotto per animale per applicazione.

4.11.2 Misure di mitigazione del rischio specifiche per l'uso

Indossare guanti protettivi resistenti agli agenti chimici durante la manipolazione del prodotto (il materiale dei guanti deve essere specificato dal titolare dell'autorizzazione nelle informazioni sul prodotto)
Indossare calzature protettive adeguate (EN 13832) durante l'applicazione del prodotto. Indossare una tuta protettiva (almeno del tipo 6, EN 13034).

4.11.3 Dove specifico per l'uso, i dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.4 Dove specifico per l'uso, le istruzioni per lo smaltimento in sicurezza del prodotto e del relativo imballaggio

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

4.11.5 Dove specifico per l'uso, le condizioni di stoccaggio e la durata di conversazione del prodotto in normali condizioni di stoccaggio.

Vedere la sezione 5 - Indicazioni generali per l'uso

5. Indicazioni generali per l'uso

5.1. Istruzioni d'uso

Il prodotto deve essere portato a una temperatura >20 °C prima dell'uso

Pre-mungitura:

Applicare il prodotto su tutta la lunghezza di ciascuna mammella.

Per l'uso efficace contro batteri e lieviti, il prodotto deve restare a contatto con la pelle per almeno 30 secondi.

Una volta trascorso il tempo di contatto appropriato, rimuovere accuratamente il prodotto, utilizzando un tovagliolo di carta/panno monouso per assicurarsi che le mammelle siano asciutte e pulite.

Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p)

Post-mungitura:

Coprire l'intera lunghezza di ogni mammella con il prodotto, immediatamente dopo la mungitura.

Per garantire un tempo di contatto sufficiente, prestare attenzione che il prodotto non venga rimosso dopo l'applicazione (ad es. assicurarsi che le vacche rimangano in piedi per almeno 5 minuti)

Concentrazione di iodio in uso: 3000 mg/Kg (0,3% p/p).

5.2. Misure di mitigazione del rischio

Si raccomanda l'uso di una pompa dosatrice per inserire il prodotto nell'attrezzatura per l'applicazione.

Il prodotto non contiene sostanze che destano preoccupazione.

5.3. Dettagli dei probabili effetti negativi, diretti o indiretti e le istruzioni per interventi di pronto soccorso e le misure di emergenza per la tutela dell'ambiente

Inalazione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale. Contatto cutaneo: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale. Contatto con gli occhi: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale. Ingestione: Nessun effetto o sintomo noto con uso normale

Dopo l'inalazione: Portare in zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
Dopo il contatto cutaneo: Lavare immediatamente con acqua e sapone e risciacquare accuratamente.
Dopo il contatto con gli occhi: Sciacquare ad occhi aperti per alcuni minuti sotto l'acqua corrente (almeno 15 minuti).

Dopo l'ingestione: Sciacquare la bocca, quindi bere abbondante acqua. Rivolgersi immediatamente a un medico.
In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto

Stabilità e reattività:

Reattività: Nessun pericolo di reattività noto in condizioni di conservazione e uso normali. Stabilità chimica: Stabile in condizioni di conservazione e uso normali.

Possibilità di reazioni pericolose: Nessuna reazione pericolosa nota in condizioni di conservazione e uso normali.

Condizioni da evitare: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

Prodotti di decomposizione pericolosi: Nessuno noto in condizioni di conservazione e uso normali.

Precauzioni ambientali:

Arginare le fuoriuscite più estese.

Contenere e/o assorbire il prodotto fuoriuscito con materiale inerte e trasferirlo in un contenitore adatto.

Impedire il deflusso del materiale versato in corsi d'acqua, scarichi e fogne.

Raccogliere in contenitori adatti e chiusi per lo smaltimento.

Non rimettere i materiali versati nel contenitore originale.

5.4. Istruzioni per lo smaltimento sicuro del prodotto e del suo imballaggio

I contenitori vuoti devono essere sciacquati tre volte prima dello smaltimento.

I tovaglioli di carta utilizzati per asciugare e rimuovere il prodotto dalle mammelle degli animali devono essere smaltiti come rifiuti normali/domestici.

Non scaricare il prodotto non diluito nelle fogne.

5.5. Condizioni di stoccaggio e durata di conservazione del prodotto in condizioni normali di stoccaggio

Conservare nel contenitore originale chiuso
Proteggere dal gelo
Non conservare a temperature superiori a 30 °C
Periodo di conservazione 24 mesi

6. Altre informazioni

Nessuno