

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID
NR. RO/2022/0331/MRS/HU-2013-PA-14-00044-0000**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea produselor biocide si ale HOTĂRÂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piață în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesiva eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent :**UNGARIA**
- Nr. Autorizatiei din statul membru emitent: **HU-2013-PA-14-00044-0000**

II. Data emiterii autorizatiei : 06.05.2022**III. Data expirării autorizatiei : 31.12.2024****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: LANIRAT RODENTICID
MOMEALĂ**

Alte denumiri : Lanirat whole grain rodenticide; Lanirat rágcsálóirtó szer

V.**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI din România: Metatox Kft.**

ADRESA : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: METATOX PESZTICID
GYÁRTÓ**

ADRESA : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Metatox Peszticid Gyártó-, és Forgalmazó Kft.

ADRESA : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

LOC DE PRODUCTIE : H-5520 Szeghalom, Kossuth u.8., Ungaria

**NUMELE FABRICANTULUI DE SUBSTANTA ACTIVA: (*Bromadiolone*)
PELGAR INTERNATIONAL LTD.**

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22ADRESA: Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants United Kingdom
LOC DE PRODUCTIE : Unit 13, Newman Lane GU34 2QR Alton, Hants United Kingdom**VI.****TIPUL DE PRODUS:** Tip 14 (Rodenticid)**VII.****CATEGORIILE DE UTILIZATORI:** profesional/ profesionali instruiți**VIII.****TIPUL PREPARATULUI :** este o momeală gata de utilizare sub forma de granule**IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ****1) Substanta activă****a) substante chimice**

Denumire comună	Bromadiolone
Denumirea IUPAC	3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-2-hydroxychromen-4-one
Numar CAS	28772-56-7
Numar CE	249-205-9
Continut de substantă activă	0,005%

2) Substanta inactivă/nonactivă-neprecizată**X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI****A. Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice**

Pictograme, simboluri și indicarea pericolului	 GHS08 Atenție
Fraze de risc H	H360D Poate dauna fatalului. H373- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge) în caz de expunere prelungită sau repetată
Fraze de prudență P	P101 Dacă este necesară consultarea medicului, țineți la îndemână recipientul sau eticheta produsului P201 Procurați instrucțiuni speciale înainte de utilizare. P260 Nu inspirați praful. P280 Purtați mănuși de protecție și echipament de protecție a feței (mască respiratorie) P308+P313 ÎN CAZ DE expunere sau posibilă expunere: consultați medicul. P314 Consultați medicul, dacă nu vă simțiți bine, P501 Aruncați conținutul și recipientul în conformitate cu reglementările naționale (a se preciza).

XI. AMBALAREA**Utilizarea nr. 1 – Șoareci de casă – profesioniști – la interior**

- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în cutii de carton de 50 g, 100 g, 120 g, 125 g, 150 g, 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o cutie de carton de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-un sac de plastic de 20 kg, 25 kg sau 50 kg.

Utilizarea nr. 2 – Șobolani – profesioniști – la interior

- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în cutii de carton de 50 g, 100 g, 120 g, 125 g, 150 g, 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o cutie de carton de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-un sac de plastic de 20 kg, 25 kg sau 50 kg.

Utilizarea nr. 3 – Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști – la exterior, în jurul clădirilor

- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în cutii de carton de 50 g, 100 g, 120 g, 125 g, 150 g, 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o cutie de carton de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-un sac de plastic de 20 kg, 25 kg sau 50 kg.
- Momeală vrac plasată într-o sac țesut din PP, cu greutate de umplere de 20 kg, 25 kg sau 50 kg.

Utilizarea 4 - Șoareci de casă și/sau șobolani – profesioniști instruiți – la interior

- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeli în plicuri individuale de 25 g, 30 g, 40 g, 50 g, 100 g, 150 g, apoi introduse în cutii de carton de 50 g, 100 g, 120 g, 125 g, 150 g, 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o găleată de plastic de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-o cutie de carton de 3 kg și 5 kg;
- Momeală cu granule vrac plasată într-un sac de plastic de 20 kg, 25 kg sau 50 kg.
- Momeală vrac plasată într-o sac țesut din PP, cu greutate de umplere de 20 kg, 25 kg sau 50 kg.

Utilizarea 5 - Șoareci și/sau șobolani – profesioniști instruiți – la exterior și în jurul clădirilor

- Pentru controlul șoarecilor: 20-25 g momeală per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 3 metri. Pentru controlul șobolanilor: 50-100 g momeală per stație de momeală. Dacă este nevoie de mai mult de o stație de momeală, distanța minimă dintre stațiile de momeală trebuie să fie de 5 metri.

XII.

INSTRUCTIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :

Organisme țintă

- *Șoarecele de casă* (*Mus musculus*),
- *Sobolanul cenușiu* (*Rattus norvegicus*).

Mod de acțiune: Ingerare

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Şoarece de casă (Mus musculus)-Concentrația - 20-25 gr momeală/stație de momeală la distanța de 3-5 metri.Timpul de acțiune:4-10 zile de la aplicare

Şobolan cenuşiu (Rattus norvegicus) –Concentrația – max.200 g momeală/ stație de momeală la distanța de 5-10 metri.Timpul de acțiune:4-10 zile de la aplicare

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE :

- Citiți și urmați informațiile despre produs precum și orice alte informații care însوțesc produsul sau care sunt furnizate la punctele de vânzare înainte de utilizare.
- Efectuați un sondaj prealabil al zonei infestate și o evaluare la fața locului pentru a identifica speciile de rozătoare, locurile lor de activitate și pentru a determina cauza probabilă și întinderea infestării.
- Eliminați produsele alimentare ușor accesibile rozătoarelor (de exemplu: cereale vărsate sau deșeuri alimentare.)
- În afară de acestea, nu curățați zona infestată chiar înainte de tratament, deoarece acest lucru deranjează populația de rozătoare și face mai dificilă acceptarea momelii.
- Produsul trebuie plasat în imediata apropiere a locurilor în care activitatea rozătoarelor a fost identificată anterior.
- Dacă este posibil, stațiile de momeală trebuie să fie fixate la sol sau de alte structuri.
- Stațiile de momeală trebuie să fie etichetate cât mai evident, pentru a specifica conținutul de rodenticid și interzicerea mutării sau a deschiderii acestora.
- Atunci când produsul este utilizat în zone publice, zonele tratate trebuie să fie marcate în perioada de tratament, în apropierea momelii trebuie amplasate notificări, care oferă informații despre riscul de intoxicare primară sau secundară cu anticoagulant, precum și măsuri care trebuie luate în caz de intoxicare.
- Momeala trebuie să fie fixată astfel încât să nu poată fi târâtă de stația de momeală.
- Nu așezați produsul la îndemâna copiilor, păsărilor, animalelor de companie, animalelor din fermă și a altor animale nevizate.
- Așezați produsul departe de alimente, băuturi și hrană pentru animale, precum și de ustensile sau suprafetele care au contact cu acestea.
- Purtați mănuși de protecție chimică rezistente, în faza de manipulare a produsului.
- Atunci când utilizați produsul nu mâncăți, nu beți și nu fumați. Spălați mâinile și pielea direct expusă după utilizarea produsului.
- Frecvența vizitelor în zona tratată poate fi la latitudinea operatorului, în concordanță cu sondajul efectuat la începutul tratamentului. Această frecvență ar trebui să fie în concordanță cu recomandările furnizate de codul de bune practici relevant. (în primele două săptămâni, stația de momeală trebuie verificată la fiecare 2-3 zile pentru șoareci și 5-7 zile pentru șobolani și completarea cantității de momeală consumată. Momeala deteriorată, umedă sau mucegăită trebuie înlocuită. Verificarea este apoi repetată săptămânal).
- Dacă asimilarea consumului momelii este relativ scăzută comparativ cu dimensiunea aparentă a infestării, luați în considerare înlocuirea punctelor de momeală în alte locații.
- Dacă după o perioadă de tratament de 35 de zile se observă continuarea consumului de momeală și nu s-a observat declinul activității rozătoarelor, trebuie să se determine cauza probabilă a acestei situații.
- În cazul în care au fost excluse alte cauze, este posibilă prezența unor rozătoare rezistente, astfel se ia în considerare utilizarea unui rodenticid fără efect coagulant, unde este disponibil, sau a



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

unui rodenticid anticoagulant mai puternic.

- De asemenea, luați în considerare utilizarea capcanelor, ca o măsură alternativă de control.
- Îndepărtați momeala rămasă și stațiile de momeală la sfârșitul perioadei de tratament.
- Nu deschideți pliculețele, care conțin momeala.
- Așezați momeala în stația de momeală folosind un dispozitiv de dozare.
- Datorită efectului întârziat al agentului anticoagulant moartea rozătoarelor este de așteptat la 4-10 zile după consum.
- Tratamentul poate dura 2-6 săptămâni în funcție de populația rozătoarelor

XIII. CONDIȚIILE DE DEPOZITARE :

- Se depozitează într-un loc uscat, răcoros și bine ventilat. Se păstrează recipientul închis și departe de lumina directă a soarelui.
- Se depozitează în locuri în care nu au acces copii, păsările, animalele de companie și animalele de fermă.
- DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCIDE ÎN CONDIȚII NORMALE DE DEPOZITARE : 2 ani

ALTE INFORMATII :

Prezenta autorizatie este însotită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fișei cu date de securitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Biroul RSI și Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însotit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilinca

