

Biocidinio produkto charakteristikų santrauka

Produkto pavadinimas: calgodip D 3000

Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

PT 03 - Veterinarinė higiena

Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018724-0000

**R4BP 3 sprendimo nuorodos
numeris:** EU-0018724-0011

Turinys

Administracinė informacija	1
1.1. Produkto prekiniai pavadinimai	1
1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas	1
1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)	1
1.4. Veikliosios (-ių) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)	2
2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas	3
2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį	3
2.2. Formuliacijos tipas	3
3. Pavojingumo ir atsargumo frazės	3
4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)	4
5. Bendrieji naudojimo nurodymai	16
5.1. Naudojimo instrukcijos	16
5.2. Rizikos valdymo priemonės	16
5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką	17
5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos	17
5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis	18
6. Kita informacija	18

Administracinė informacija

1.1. Produkto prekiniai pavadinimai

calgodip D 3000
Jod-Dip S 30
Bestfarm Dip Premium
Jod 30 Universal (Iwetec)
Jod-Dipp 30 (Technolit)
Dip es SF 3000
Lerapur Jod SP 30

1.2. Autorizacijos liudijimo turėtojas

Autorizacijos liudijimo turėtojo pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas

Pavadinimas	CVAS Development GmbH
Adresas	Dr. Albert Reimann Str. 16 a 68526 Ladenburg Vokietija

Autorizacijos liudijimo numeris

EU-0018724-0000 1-9

R4BP 3 sprendimo nuorodos numeris

EU-0018724-0011

Autorizacijos liudijimo data

18/12/2018

Autorizacijos liudijimo galiojimo pabaigos data

30/11/2028

1.3. Biocidinio produkto gamintojas (-ai)

Gamintojo pavadinimas	Calvatis GmbH
Gamintojo adresas	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Vokietija
Gamybos vieta	Dr. Albert Reimann Str. 16a 68526 Ladenburg Vokietija

1.4. Veikliosios (-iųjų) medžiagos (-ų) gamintojas (-ai)

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Cosayach Nitratos S.A.
Gamintojo adresas	Amunategui 178 not applicable Santiago Čilė
Gamybos vieta	S.C.M. Cosayach Cala Cala not applicable Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	ACF Minera S.A.
Gamintojo adresas	San Martin No 499 not applicable Iquique Čilė
Gamybos vieta	Lagunas mine not applicable Pozo Almonte Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	SQM S.A.
Gamintojo adresas	Los Militares 4290, Piso 4 not applicable Las Condes Čilė
Gamybos vieta	Nueva Victoria plant not applicable Pedro de Valdivia plant Čilė

Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Nihon Tennen Gas Co., Ltd / Kanto Natural Gas Development Co., Ltd
Gamintojo adresas	661 Mobara 297-8550 Mobara City, Chiba Japonija
Gamybos vieta	2508 Minami-Hinata 299-4205 Shirako-Machi, Chosei-Gun, Chiba Japonija
Veiklioji medžiaga	1319 - Jodas
Gamintojo pavadinimas	Norkem Limited (manufacturer of PVP-iodine)
Gamintojo adresas	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Jungtinė Karalystė
Gamybos vieta	Norkem House, Bexton Lane WA 16 9FB Knutsford, Cheshire Jungtinė Karalystė

2. Produkto sudėtis ir formuliacijos tipas

2.1. Kokybinė ir kiekybinė informacija apie biocidinio produkto sudėtį

Bendras pavadinimas	IUPAC pavadinimas	Funkcinė paskirtis	CAS numeris	EB numeris	Kiekis (proc.)
Jodas		Veiklioji medžiaga	7553-56-2	231-442-4	0,34
Acto rūgštis	Acto rūgštis		64-19-7	200-580-7	0,26

2.2. Formuliacijos tipas

AL - Bet koks kitas skystis

3. Pavojingumo ir atsargumo frazės

Pavojingumo kategorijos	Kenksminga vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.
--------------------------------	--

Pavojingumo frazės

Saugoti, kad nepatektų į aplinką.

turinį išpilti (išmesti) į pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus..

talpyklą išpilti (išmesti) į pagal vietinius/regioninius/nacionalinius/tarptautinius reikalavimus..

4. Autorizuotas (-i) naudojimas (-ai)

4.1 Naudokite aprašymą

Naudojimas 1 - Naudojimo Nr.9.1 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija rankiniu būdu merkiant po melžimo.

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Neaktualu
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis	vidaus Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Rankiniu būdu, naudojant mirkymo indą. - Žr. naudojimo instrukcijas
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% - Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.1.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje. Rekomenduojama naudoti dozatorių, pilant paruoštą naudoti dezinfekantą į talpą. Pripildyti talpą dezinfekantu, skiriant 5 ml dezinfekanto vienai karvei, ir ant viršaus užsukti mirkymo indą. Vengti perteklinio skysčio nutekėjimo. Prieš melžimą kruopščiai nušluostyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba šluoste. Po melžimo suspausti talpą ir pakišti po kiekvienu speniu mirkymo indą iš apačios. Įsitikinti, kad į dezinfekantą įmerkta apie 3 cm spenio. Suspaudus talpą, pakartotinai pripildyti mirkymo indą šviežiu dezinfekantu. Jeigu reikia pakartotinai pripildyti talpą šviežiu dezinfekantu. Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos. Po dezinfekcijos ištuštinti, išvalyti talpą ir mirkymo indą, ir išskalauti vandeniu.

4.1.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu be jodo.

4.1.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.1.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

--

4.2 Naudokite aprašymą

Naudojimas 2 - Naudojimo Nr.9.2 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija rankiniu būdu, po melžimo, naudojant putų indą.

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Neaktualu
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis	vidaus Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Rankiniu būdu, naudojant putų indą. - Žr. naudojimo instrukcijas
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% - Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

4.2.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje. Rekomenduojama naudoti dozatorių, pilant produktą į talpą. Pripildyti talpą paruoštu naudoti dezinfekantu, skiriant 5 ml produkto vienai karvei, ir ant jo viršaus užsukti putų indą. Vengti perteklinio skysčio nutekėjimo. Prieš melžimą kruopščiai nušluostyti spenius vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis arba šluoste. Po melžimo suspausti talpą ir pakišti po kiekvienu speniu putų indą iš apačios. Įsitikinti, kad į dezinfekantą įmerkta apie 3 cm spenio. Suspaudus rezervuarą, pakartotinai pripildyti putų indą šviežiu dezinfekantu. Jeigu reikia pakartotinai pripildyti talpą šviežiu dezinfekantu. Po dezinfekcijos ištuštinkite ir išvalykite talpą ir putų indą ir išskalaukite vandeniu.

4.2.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jeigu reikia dezinfekcijos prieš melžiant ir pamelžus, dezinfekcijai prieš melžiant reikėtų naudoti kitą priemonę, kurios sudėtyje nėra jodo.

4.2.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.2.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3 Naudokite aprašymą

Naudojimas 3 - Naudojimo Nr.9.3 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija po melžimo, naudojant rankinį purkštuvą

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Neaktualu
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis	vidaus Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Rankiniu būdu, naudojant rankinį purkštuvą. - Žr. naudojimo instrukcijas
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% - Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.3.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
 Rekomenduojama naudoti dozatorių, pilant produktą į talpą.
 Pripildyti talpą paruoštu naudoti dezinfekantu, skiriant 5 ml produkto vienai karvei, ir ant jo viršaus užsukti purkštuvą. Vengti perteklinio skysčio nutekėjimo.
 Prieš melžimą kruopščiai nušluostyti spenius vienkartinė popierine servetėle arba šluoste.
 Po melžimo, rankiniu purkštuvu purkšti dezinfekantą. Dezinfekantas aplink spenio kanalą turi padengti apie 3 cm plotą.
 Jeigu reikia, pripildyti purkštuvo talpą šviežiu dezinfekantu,
 Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.

 Po dezinfekcijos, talpą ir purkštuvą ištuštinti, išvalyti ir išskalauti vandeniu.

4.3.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant rankiniu purkštuvu spenius po melžimo, mėvėti, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą nurodo autorizuotojas produkto informacijoje) ir avėti ilgaaulius, cheminėms medžiagoms atsparius, batus. Saugotis purškiamo produkto dalelių ore.
Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.3.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.3.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4 Naudokite aprašymą

Naudojimas 4 - Naudojimo Nr.9.4 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija po melžimo, naudojant elektroninį purkštuvą.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Neaktualu

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Naudojimo sritis

	<p>vida</p> <p>Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.</p>
Naudojimo metodas (-ai)	<p>Rankiniu būdu, po melžimo naudojant elektroninį purkštuvą. -</p> <p>Žr. naudojimo instrukcijas</p>
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	<p>Naudojimas - 0% -</p> <p>Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).</p>
Vartotojų kategorija (-os)	<p>Profesionalas</p>
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	<p>Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.</p>

4.4.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje. Atidaryti talpą, į kurią įpilta paruošto naudoti dezinfekanto ir įstatyti elektroninio purkštuvu žarną. Vienam gyvūnui skiriama apie 5 ml dezinfekanto. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo. Prieš melžimą, kruopščiai nuvalyti spenius vienkartinėmis popierinėmis servetėlėmis arba šluoste.

Po melžimo, elektroniniu purkštuvu purkšti dezinfekantą. Dezinfekantas aplink spenio kanalą turi padengti apie 3 cm plotą. Esant reikalui, tuščią talpą pakeisti pilna talpa.

Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.

Po dezinfekavimo purkštuvu žarną įstatyti į kibirą vandens ir praskalauti purkštuvą purkškiant vandenį.

4.4.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Dezinfekuojant elektroniniu purkštuvu spenius po melžimo, mūvėti, cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (pirštinių medžiagą nurodo autorizuotojas produkto informacijoje) ir avėti ilgaaulius, cheminėms medžiagoms atsparius, batus. Saugotis purškiamo produkto dalelių ore.

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.4.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.4.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5 Naudokite aprašymą

Naudojimas 5 - Naudojimo Nr.9.5 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija automatizuotu būdu merkiant, po melžimo.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Neaktualu

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Naudojimo sritis

vidaus

Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Automatizuotu būdu, merkiant. -

Žr. naudojimo instrukcijas

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% -

Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.5.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Atidaryti talpą, kurioje yra paruoštas naudoti dezinfekantas, ir į ją įstatyti automatizuotos spenių merkimo sistemos žarną. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo.
Po melžimo vakuumas išjungiamas ir išvirkščinama spenių dezinfekantio į kolektorių. Automatizuotai klosterio šalinimo (AKŠ) sistemai patraukus mirkymo indą, speniai lieka padengti 5 ml dezinfekanto. Pašalinus AKŠ, visos automatizuotos spenių įmerkimo sistemos linijos gerai išplaunamos vandeniu ir suspausto oro srove.
Paskutiniu valymo etapu, po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos suspausto oro srove.
Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.
Po tokios procedūros, melžimo sistema yra parengta kitam melžimui.
Visas procesas yra automatizuotas.

4.5.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu be jodo.

4.5.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.5.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.6 Naudokite aprašymą

Naudojimas 6 - Naudojimo Nr.9.6 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija automatizuotu būdu, putomis, po melžimo.

Produkto tipas

PT 03 - Veterinarinė higiena

Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas

Neaktualu

Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)

Mokslinis pavadinimas: Bakterijos
Bendrinis pavadinimas: Bakterijos
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Mokslinis pavadinimas: Mielės
Bendrinis pavadinimas: Mielės
Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės

Naudojimo sritis

vidaus

Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.

Naudojimo metodas (-ai)

Automatizuotu būdu, putomis. -

Žr. naudojimo instrukcijas

Naudojimo norma (-os) ir dažnis

Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% -

Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).

Vartotojų kategorija (-os)

Profesionalas

Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga

Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.6.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje. Atidaryti talpą, kurioje yra paruoštas naudoti dezinfekantas, ir į ją įstatyti automatizuotos spenių merkimo sistemos žarną. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo. Po melžimo vakuumas išjungiamas ir išvirkščinama spenių dezinfekantio į kolektorių. Automatizuotai klosterio šalinimo (AKŠ) sistemai patraukus putų indą, speniai lieka padengti 5 ml putų dezinfekanto. Pašalinus AKŠ, visos automatizuotos putų įmerkimo sistemos linijos gerai išplaunamos vandeniu ir prapučiamos suspausto oro srove. Paskutiniu valymo etapu, po kiekvieno bandos melžimo, linijos yra dezinfekuojamos (pvz., priemone, kurios sudėtyje yra chloro) ir dar kartą prapučiamos suspausto oro srove. Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos. Po tokios procedūros, melžimo sistema yra parengta kitam melžimui. Visas procesas yra automatizuotas.

4.6.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.6.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.6.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.6.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.7 Naudokite aprašymą

Naudojimas 7 - Naudojimo Nr.9.7 – melžiamų gyvūnų spenių dezinfekcija automatizuotu būdu, naudojant robotą.

Produkto tipas	PT 03 - Veterinarinė higiena
Jeigu taikytina, tikslus autorizuoto naudojimo aprašas	Neaktualu
Kontroliuojamas (-i) organizmas (-ai) (įskaitant vystymosi stadijas)	Mokslinis pavadinimas: Bakterijos Bendrinis pavadinimas: Bakterijos Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės Mokslinis pavadinimas: Mielės Bendrinis pavadinimas: Mielės Vystymo stadija: Vegetatyvinės ląstelės
Naudojimo sritis	vidaus Melžiamų gyvūnų (melžiamų karvių) spenių dezinfekcija po melžimo.
Naudojimo metodas (-ai)	Automatizuotu būdu, naudojant robotą. - Žr. naudojimo instrukcijas
Naudojimo norma (-os) ir dažnis	Karvės: 5 ml vienam kartui - 0% - Naudoti po melžimo, 2–3 kartus per dieną (po kiekvieno melžimo).
Vartotojų kategorija (-os)	Profesionalas
Pakuočių dydžiai ir pakuočių medžiaga	Didelio tankio polietileno (HDPE) talpyklės po 5-60 kg, 60-200 kg ir 600-1000 kg.

4.7.1 Specifinės naudojimo instrukcijos

Dezinfekantą, prieš naudojant, reikia palaikyti aukštesnėje nei 20 °C temperatūroje.
Atidaryti talpą, kurioje yra paruošto naudoti dezinfekanto, ir į ją įstatyti automatizuoto roboto melžimo įrenginio žarną. Vengti perteklinio skysčio nubėgimo .
Robotas, automatizuotu būdu, šepetėliais nuvalo spenius.
Robotui baigus melžimo procedūrą, dezinfekantas iš klasterio automatiškai purškiamas ant spenių. Dezinfekantą ant spenių palikti iki kito melžimo. Užtikrinti, kad gyvūnai stovėtų bent 5 minutes po dezinfekcijos.
Purkštuvai plaunami automatizuotai.

4.7.2 Specifinės rizikos valdymo priemonės

Jei būtina dezinfekcija prieš ir po melžimo, dezinfekcija prieš melžimą turi būti atlikta su produktu, kurio sudėtyje nėra jodo.

4.7.3 Kai taikoma, informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir skubios pagalbos priemonės skirtos apsaugoti aplinką

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.7.4 Kai taikoma, produkto saugaus šalinimo ir pakavimo instrukcijos

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

4.7.5 Kai taikoma, produkto saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Žr. bendrąsias naudojimo instrukcijas.

5. Bendrieji naudojimo nurodymai

5.1. Naudojimo instrukcijos

Žr. naudojimo instrukcijas.

5.2. Rizikos valdymo priemonės

Žr. rizikos mažinimo priemones.

5.3. Informacija apie galimą tiesioginį arba netiesioginį poveikį, pirmosios pagalbos instrukcijos ir neatidėliotinos priemonės siekiant apsaugoti aplinką

Paminėta MSDS

Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Įkvėpus: įleiskite gryno oro; atsiradus negalavimų, kreipkitės į gydytoją.

Patekus ant odos: nuplaukite vandeniu ir muilu.

Patekus į akis: skalaukite akis kelias minutes tekančiu vandeniu. Tada kreipkitės į gydytoją.

Nurijus: skalaukite burną ir gerkite daug vandens. Nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Stabilumas ir reaktyvumas

Pavojingų reakcijų tikimybė: reakcijos su oksidantu ir reduktoriumi.

Vengtinios aplinkybės: nėra jokios aktualios informacijos.

Nesuderinamos medžiagos: nėra jokios aktualios informacijos.

Pavoingos irimo medžiagos: jodas (kaistant).

Avarių likvidavimo priemonės

Atsargumo priemonės, asmens apsaugos priemonės ir skubiosios pagalbos procedūros: nereikia jokių ypatingų priemonių.

Aplinkos apsaugos priemonės: saugokite, kad dideli kiekiai dezinfekavimo priemonės nepatektų į nuotekų sistemą arba vandens telkinius.

Izoliavimo ir valymo priemonės ir medžiagos: sugerkite naudodami skysčius rišančias medžiagas (smėlį, diatomitą, rūgščių rišiklius, universaliuosius rišiklius, pjuvenas). Surinktas medžiagas būtina šalinti laikantis galiojančių taisyklių.

5.4. Produkto ir jo pakuotės saugaus šalinimo instrukcijos

Paminėta MSDS

Atliekų tvarkymo metodai

Rekomendacija: būtina šalinti specialiu būdu, laikantis oficialių taisyklių.

Atliekų šalinimo kodas: atsižvelgiant į Europos atliekų katalogo (EWC) reglamento reikalavimus, atliekų kodus reikia pritaikyti prie konkretaus pramonės sektoriaus ir proceso.

Europos atliekų katalogas: atsižvelgiant į EWC reglamento reikalavimus, atliekų kodus reikia pritaikyti prie konkretaus pramonės sektoriaus ir proceso.

Panaudoję priemonę, šalinkite nepanaudotus likučius ir pakuotę pagal vietines ir nacionalines taisykles. Panaudotą dezinfekavimo priemonę galima nuleisti į komunalinę kanalizaciją arba išmesti mėšlo laikymo vietoje, atsižvelgiant į vietinių taisyklių reikalavimus. Vengti patekimų į individualias nuotekų valymo sistemas.

Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo; jei reikia, ploviklis.

Rekomenduojama valymo priemonė: vanduo; jei reikia, ploviklis.

5.5. Saugojimo sąlygos ir produkto galiojimo laikas normaliomis laikymo sąlygomis

Galiojimo laikas: 24 mėnesių.

Dezinfekavimo priemonės būtina saugoti nuo šalčio, aukštesnės nei 30 °C temperatūros ir nuo tiesioginių saulės spindulių.

6. Kita informacija

Neaktualu