

Sažetak svojstava biocidnog proizvoda

Naziv proizvoda: EC GEL ANTS

Vrsta(e) proizvoda: Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Broj odobrenja: KLASA:UP/I-543-04/18-12/08

Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3): HR-0018784-0000

Sadržaj

Administrativne informacije	1
1.1. Trgovački naziv proizvoda	1
1.2. Nositelj odobrenja	1
1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda	1
1.4. Proizvođači aktivnih tvari	1
2. Sastav i formulacija proizvoda	2
2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda	2
2.2. Vrsta formulacije	2
3. Oznake opasnosti i obavijesti	2
4. Odobrena uporaba	3
4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu	4
4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu	4
4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima,	4
4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	4
4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim	4
4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu	5
4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu	5
4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima,	6
4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	6
4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim	6
5. Opće upute za uporabu	6
5.1. Upute za uporabu	6
5.2. Mjere za smanjenje rizika	6
5.3. Pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u	7
5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže	8
5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalim uvjetima skladištenja	8
6. Ostale informacije	8

Administrativne informacije

1.1. Trgovački naziv proizvoda

EC GEL ANTS

1.2. Nositelj odobrenja

Naziv i adresa nositelja odobrenja	Naziv	Laboratorios Econovar S.L.
	Adresa	C/Muntaner 179, 3º 1ª 08036 Barcelona Španjolska
Broj odobrenja	KLASA:UP/I-543-04/18-12/08	
Referentni broj odluke u registru biocidnih proizvoda (R4BP 3)	HR-0018784-0000	
Datum odobrenja	04/04/2018	
Datum isteka odobrenja	29/08/2022	

1.3. Proizvođač(i) biocidnih proizvoda

Naziv proizvođača	MYLVA, S.A.
Adresa proizvođača	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Španjolska
Lokacija proizvodnih pogona	Sant Galderic, 23, Polígon Industrial Ponent, Sant Pol de Mar 08395 Barcelona Španjolska

1.4. Proizvođači aktivnih tvari

Aktivna tvar	37 - Imidaklopid
Naziv proizvođača	Bayer CropScience AG
Adresa proizvođača	Alfred Nobel-Strasse 50 D-40789 Monheim am Rhein Njemačka
Lokacija proizvodnih pogona	Alte Heerstr D-41538 Dormagen Njemačka

2. Sastav i formulacija proizvoda

2.1. Podatci o kvalitativnom i kvantitativnom sastavu biocidnog proizvoda

Uobičajeni naziv	IUPAC naziv	Funkcija	CAS broj	EC broj	Sadržaj (%)
Imidaklopid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Aktivna tvar	138261-41-3	428-040-8	0.01

2.2. Vrsta formulacije

RB - mamac (pripremljen za uporabu)

3. Oznake opasnosti i obavijesti

Oznaka upozorenja	Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.
Oznake obavijesti	<p>Čuvati izvan dohvata djece.</p> <p>Prije uporabe pročitati naljepnicu.</p> <p>Izbjegavati ispuštanje u okoliš.</p> <p>Sakupiti proliveno/rasuto.</p> <p>Odložiti sadržaj u/na U skladu s lokalnim propisima.</p>

4. Odobrena uporaba

4.1 Opis uporabe

Uporaba 1 - primjena - mamac za mrave u obliku gela koji se nanosi u kapljicama/linijama - primjena u unutarnjim i vanjskim prostorima - opća javnost (osobe koje nisu stručnjaci).

Vrsta proizvoda	Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)
Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Linepithema humile -argentinski mrav-odrasli/insekti Monomorium pharaonis-faraonski mrav-odrasli/insekti Lasius niger-crni mrav-odrasli/insekti
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom U unutarnjim prostorima. Stambene, industrijske, javne, komercijalne ili zgrade ustanova. U vanjskim prostorima. Oko zgrada. Na terasama i u privatnim vrtovima.
Načini primjene	primjena mamaca - Otvoreno nanošenje mamca u obliku gela iz štrcaljke/patrone. Nanesite sredstvo u kapljicama ili linijama (produljene kapljice) na mjesta na kojima ima mravi, primjerice uz mravlje staze ili mravinjake.
Broj i vremenski raspored primjena	Doza: 0,2 g/m ² (1 kapljica = 1 linija od 3 cm duljine = 0,2 g mamca u obliku gela) - 0 - Učestalost nanošenja: Nakon sedam dana pregledajte mjesta nanošenja i ponovno nanesite ako je mamac potrošen. Učestalost tretmana: Tretman se može ponoviti tri mjeseca nakon nestanka infestacije. U slučaju potrebe tretman se može ponoviti nakon 3 mjeseca.
Kategorije korisnika	široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Patrona od LDPE plastike s 15, 20, 25, 30, 35, 40 i 50 g mamca u obliku gela Štrcaljka od LDPE plastike s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 i 10 g mamca u obliku gela.

4.1.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Preporučuje se pranje ruku prije upotrebe mamca kako ne bi došlo do kontaminacije neugodnim mirisima poput duhana i sl. U blizini područja u kojima se nanosi sredstvo ne smiju se raspršivati druge kemikalije jer ga mogu kontaminirati i učiniti neprivlačnim mravima.

Ne upotrebljavajte na drvenim ili poroznim površinama. Ako je potrebno nanesite proizvod na neporoznu podlogu npr. plastičnu foliju i njome prekrijte drvene ili porozne podloge.

Nanesite sredstvo u kapljicama ili linijama pokraj mravljih staza, na mjesta na kojima ima mravi, primjerice u mravinjake, ili u procjepe i pukotine na mjestima na kojima je uočena njihova prisutnost.

Mjesto gdje je nanesen proizvod redovito pregledavajte.

U vanjskim prostorima, tj. u slučajevima kada vanjski uvjeti utječu na proizvod (kiša, jaka izloženost suncu, prljavština itd.), proizvod treba ponovno nanijeti.

Unutar 15 dana, efikasnost proizvoda je veća od 90 % mortaliteta

4.1.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Izbjegavajte kontakt s očima i kožom.

Spriječiti da djeca i životinje dođu u dodir s tretiranim površinama.

Ne nanositi na površine koje se često čiste.

4.1.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

vidjeti odjeljak 5.3.

4.1.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

vidjeti odjeljak 5.4

4.1.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

vidjeti odjeljak 5.5

4.2 Opis uporabe

Uporaba 2 - primjena - mamac za mrave u obliku gela koji se nanosi u obliku kutija s mamcem - primjena u unutarnjim i vanjskim prostorima - javnost (osobe koje nisu stručnjaci)

Vrsta proizvoda

Vrsta proizvoda 18: Insekticidi, akaricidi i proizvodi za suzbijanje drugih člankonožaca (zaštita od nametnika)

Ako je relevantno, točan opis odobrene uporabe	Insekticid
Ciljni organizam(mi) (uključujući razvojnu fazu)	Linepithema humile-argentinski mrav-odrasli/insekti Monomorium pharaonis-faraonski mrav-odrasli/insekti Lasius niger-crni mrav-odrasli /insekti
Područje primjene	u zatvorenom prostoru na otvorenom U unutarnjim prostorima. Stambene, industrijske, javne, komercijalne ili zgrade ustanova. U vanjskim prostorima. Oko zgrada, na terasama i u privatnim vrtovima.
Načini primjene	Klopke s mamcem spremne za korištenje - Klopke s mamcem spremne za korištenje
Broj i vremenski raspored primjena	Doza: 0,4 - 0,9 g/m ² , ovisno o razini infestacije, podijeljeno u nekoliko kutija s mamcem radi veće učinkovitosti. Primjerice, postavite 2 do 4 kutije s 5 grama mamca na 22 m ² - 0 - Učestalost nanošenja: Pregledajte točke na koje ste nanijeli sredstvo nakon sedam dana i postavite novu kutiju s mamcem ako je mamac potrošen, a infestacija još nije suzbijena. U slučaju potrebe tretman se može ponoviti nakon 3 mjeseca.
Kategorije korisnika	Široka javnost (amaterska uporaba)
Veličine pakiranja i ambalažni materijal	Plastične zamke s 1, 2, 3, 4, 5 i 6 grama mamca u obliku gela

4.2.1 Upute za uporabu specifične za uporabu

Mamac u obliku gela u prozirnim zamkama (kutija s mamcem).
Otvorite zamku: odrežite kraj zamke, kroz koji će mravi ulaziti, po označenoj liniji.
Aktivirajte zamku: gurnite kapsulu do kraja sve dok gel ne izađe u središnji odjeljak.
Kada se upotrebljava u vanjskim prostorima, mjesta izložena izravnoj sunčevoj svjetlosti ili kiši treba izbjegavati

4.2.2 Mjere za smanjenje rizika specifične za uporabu

Kutije za mamke ne smiju se otvarati niti dirati..
Nikada ne gurajte prste u rupe na kutiji s mamcem.
Nakon dovršetka tretiranja (1 do 3 mjeseca) pokupiti kutije za mamke i odložiti u otpad.

4.2.3 Ako su specifične za uporabu, pojedinosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

vidjeti odjeljak 5.3

4.2.4 Ako su specifične za uporabu, upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

vidjeti odjeljak 5.4

4.2.5 Ako su specifični za uporabu, uvjeti skladištenja i rok trajanja proizvoda u uobičajenim uvjetima skladištenja

vidjeti odjeljak 5.5

5. Opće upute za uporabu

5.1. Upute za uporabu

Insekticid formuliran kao mamac u gelu za suzbijanje tropskih i vrtnih mravi (Monomorium pharaonis, Linepithema humile i Lasius niger) koji služi za upotrebu u privatnim i komercijalnim zgradama i izvan njih. Nanosi ga se pomoću patrona/štrcaljki radi suzbijanja tri vrste mrava. Upotrebljava ga se i tako da se postave kutije s mamcem radi suzbijanja vrste Linepithema humile. Nakon opsežnog pregleda radi utvrđivanja razine infestacije (niske ili visoke), postavite točke s mamcem na mjesta na kojima su mravi uočeni. Prije upotrebe obavezno pročitajte naljepnicu ili listić s uputama te slijedite sve dane upute. Uklonite alternativne izvore hrane iz okoline koji bi mogli biti konkurentni. Primijeniti xxxxxx na mjestima pojavljivanja mrava kao što su u blizini mravinjaka ili putova kretanja mrava, ili u pukotine i procjepe gdje je zamijećena njihova prisutnost. Vanjska uporaba (terase, privatni vrtovi, okućnice), primijeniti xxxx na mjesta gdje je veća vjerojatnost pojavljivanja mrava: nadstrešnice, krovni vijenci, na mjestima ulaska žica i cijevi u strukturu zgrada.

5.2. Mjere za smanjenje rizika

Ne nanosite proizvod (gel i kutiju s mamcem) na mjesta koja su već tretirana drugim insekticidom.

Ovaj proizvod treba upotrebljavati naizmjenično s drugim proizvodima koji ga ne sadrže kako bi se spriječio razvoj rezistentnih populacija.

Proizvod se smije ponovno nanositi samo dok se štetočine ne suzbiju.

Slijedite preporučene doze i intervale pri upotrebi proizvoda.

Slijedite upute kako ne bi bilo rizika za okoliš.

Kada ga se upotrebljava oko zgrada, nemojte nanositi u blizini odvoda. Ako je tretirana zona povezana sa sustavom za odvod kišnice ili kanalizacijom, upotrebljavajte samo u područjima u kojim ne postoji opasnost da će biti pod vodom ili se smočiti, tj. u područjima zaštićenima od kiše, poplava i vode za čišćenje.

Proizvod treba sigurno nanijeti kako ga životinje ili djeca ne bi pojeli.

Ne bacajte proizvod na zemlju, u vodotokove, u sudoper ili odvod.

Ne ispuštajte u okoliš (P273).

Ne nanositi na površine na kojima se čuva, priprema ili konzumira hrana ili hrana za životinje. Spriječiti onečišćenje vode za piće za ljude i životinje.

5.3. Pojediniosti o vjerojatnim izravnim i posrednim učincima, upute za prvu pomoć i hitne mjere u slučaju nužde za zaštitu okoliša

Osnovni postupci za prvu pomoć:

Ako proizvod dođe u kontakt s očima, obilno ispirite vodom barem 15 minuta. **OBAVEZNO** skinite kontaktne leće

Ako dođe do kontakta s kožom, operite je sapunom i obilnom količinom vode, ali bez trljanja

Ako je moguće, odvedite osobu u bolnicu i pokažite naljepnicu ili pakiranje kada je god to moguće. Ne ostavljajte otrovanu osobu samu.

Medicinski savjeti za liječnike i zdravstveno osoblje

Liječenje je simptomatsko i suportivno.

AKO JE POTREBAN MEDICINSKI SAVJET, TREBATE IMATI PRI RUCI SPREMNIK ILI NALJEPNICU TE KONTAKTIRATI CENTAR ZA KONTROLU TROVANJA.

Hitne mjere za zaštitu okoliša

Mjere opreza koje se odnose na okoliš: Pazite da ne dođe do kontaminacije odvoda, površinske i podzemne vode te tla.

Metode čišćenja: Uklonite proizvod iz zahvaćenog područja pomoću mokre maramice i bacite s kućanskim otpadom. U slučaju prolijevanja u vodu, spriječite širenje prikladnom barijerom. Uklonjeni proizvod treba odložiti u skladu s lokalnim zakonima. Obratite se nadležnim tijelima ako situaciju nije moguće kontrolirati.

5.4. Upute za sigurno odlaganje proizvoda i ambalaže

Odložite sadržaj/spremnike u skladu s lokalnim propisima (P501).

Neiskorišteni proizvod, pakiranje i sav preostali otpad (npr. mrtve insekte) odložite u skladu s lokalnim propisima.

5.5. Uvjeti skladištenja i roka trajanja proizvoda pod normalnim uvjetima skladištenja

Stabilnost proizvoda pohranjenog u izvornom spremniku jest 3 godine u normalnim uvjetima pohrane.

Pohranite u izvornom spremniku.

Držite spremnike čvrsto zatvorenima na suhom, hladnom i dobro provjetrenom mjestu.

Preporuča se skladištenje na temperaturi od 5°C do 45°C.

6. Ostale informacije

Opća javnost (korisnik koji nije stručnjak): Korisnici koji nisu stručnjaci i koji nanose proizvod u kontekstu svojeg privatnog života.

Proizvod sadrži goroku tvar koja je odbojna ljudima ili kućnim ljubimcima.