

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**CERTIFICAT PENTRU AUTORIZAREA PRODUSULUI BIOCID****Nr. RO/2022/0329/MRS/ IT/2018/00480/AUT**

In conformitate cu prevederilor REGULAMENTULUI (UE) NR. 528/2012 al Parlamentului European si al Consiliului privind punerea la dispozitie pe piata și utilizarea produselor biocide și ale HOTĂRĂRII GUVERNULUI nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2013 privind punerea la dispozitie pe piata și utilizarea produselor biocide, în baza documentelor depuse în dosarul tehnic, Comisia Națională pentru Produse Biocide, în ședința din data **11.04.2022**, a decis că produsul biocid poate fi plasat pe piata în România, conform prevederilor legale în vigoare.

I. TIPUL AUTORIZATIEI

autorizația prin recunoașterea reciprocă succesivă eliberată în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul (UE) nr. 528/2012;

- Statul membru al Uniunii Europene emitent: **ITALIA**
- Nr. Autorizației din statul membru emitent Nr.: **IT/2018/00453/AUT**

II. Data emiterii autorizatiei: 06.05.2022**III. Data expirării autorizatiei: 31.12.2022****IV.****DENUMIREA COMERCIALĂ A PRODUSULUI BIOCID: FERPASTA BRODI 25**

Alta denumire comerciala: BROM ESCA NEW, BRODIFAST PASTA, IKURAT PASTA, STARKORAT PASTA, FIGHTER PASTA, XTREME RAT PASTA, APTIRAT PASTA, ENDERAT PASTA; NECORAT PASTA; BRODIFABD 025 PASTA; STARKORAT PASTA; XTREME RAT PASTA

V.**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI: Ferbi S.r.l.****Adresa:** Viale I Maggio – 64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Italy**NUMELE TITULARULUI AUTORIZATIEI recunoscută reciproc: Ferbi S.r.l.****Adresa:** Viale I Maggio – 64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Italy**NUMELE FABRICANTULUI PRODUSULUI BIOCID: Ferbi S.r.l.****Adresa:** Viale I Maggio – 64023, Mosciano Sant'Angelo (TE), Italy**NUMELE FABRICANTULUI SUBSTANTEI ACTIVE: Activa S.r.l.****Adresa :** Via Feltre, 32, 20132 – Milano Italia**VI.**



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE
MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



TIPUL DE PRODUS : Grupa Principala 3, tip de produs 14: rodenticide.

VII.

CATEGORIILE DE UTILIZATORI: Publicul larg, profesioniști.

VIII.

TIPUL PREPARATULUI: Momeală gata de utilizare: pastă

IX. COMPOZITIA CALITATIVĂ SI CANTITATIVĂ


1) Substanta activă

Denumirea comună	Brodifacoum
Denumirea IUPAC	3-[3-[4-(4-Bromophenyl)phenyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-yl]-2-hydroxychromen-4-one
Numar CAS	56073-10-0
Numar CE	259-980-5
Continut de substanță activă	0,0025%

2) Substanta inactivă/nonactivă – nu se specifica

X. CLASIFICAREA SI ETICHETAREA PRODUSULUI

Produs biocid cu substanțe active - substanțe chimice

Simboluri si pictograme	 GHS08 Atentie!
Fraze de pericol (H)	H373 Poate provoca leziuni ale organelor prin expunere prelungită sau repetată.
Fraze de prudenta (P)	P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. P301+P310 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Sunați imediat un CENTRU DE TOXICOLOGIE sau un medic. P308+P313 ÎN CAZ de expunere sau de îngrijorare: Solicitați sfat/asistență medicală. P501 Aruncați conținutul/recipientul în conformitate cu reglementările naționale.

XI. AMBALAREA

Utilizare 1 – șoareci de casă - uz profesional - interior

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 10 - 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungi, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

**MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE****MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS**

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

**Utilizare 2 – Șobolani- uz profesional - interior**

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungă, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Utilizare 3 – Șoareci de casă și șobolani – uz profesional - exterior, în jurul clădirilor

Formularea momelii: plicuri de hârtie filtrată de 10 - 20 g.

Tipul ambalajului: flacoane, pungă, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Dimensiunea / volumul ambalajului: de la 1,5 kg la 25 kg. Ambalarea este limitată la ambalajul individual care conține maximum 10 kg de produs per sac. Pachetele conțin momeli în vrac sau ambalaje secundare mai mici de până la 1,5 kg, care nu pot fi vândute separat.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Utilizare 4 – Șoareci de casă - populație - interior

Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).

Tipul ambalajului: flacoane, pungă, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Utilizare 5 – Șobolani – populație - interior

Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).

Tipul ambalajului: flacoane, pungă, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie.

Utilizare 6 – Șobolani – uz profesional și populație – în jurul clădirilor

Până la 150 g (conține momeală rodenticidă de 10-20 g în plicuri de momeală sub formă de pastă).

Tipul ambalajului: flacoane, pungă, saci, găleți, cutii, cutii de carton, canistre. Ambalajele pot fi etichetate, tipărite sau serigrafiate.

Materialul ambalajului: plastic sau compozit din plastic (HDPE, PP, PET), hârtie

XII. INSTRUCȚIUNILE SI DOZELE DE APLICARE :**1. UZ NON PROFESIONAL - IN INTERIOR si IN JURUL CLADIRILOR**

FERPASTA BRODI 25 poate fi utilizat in interiorul si in jurul cladirilor, de exemplu, locuinte, beciuri, garaje, dulapuri si gradini aflate in proprietate.

INDICATII DE UTILIZARE SI AVERTIZARI

Inainte de utilizare cititi si urmati instructiunile scrise pe ambalajul produsului precum si



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDALE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



informatiile care insotesc produsul sau sunt furnizate la punctul de vanzare.

Luati in considerare mecanisme de control non-chimice (de exemplu capcane) inainte de utilizarea produselor rodenticide.

Indepartati sursele de hrana usor accesibile pentru rozatoare (de exemplu cereale imprastiate sau resturi de mancare). De asemenea, nu curatati zona infestata inainte de tratament deoarece acest lucru perturba populatia de rozatoare, facand mai dificila acceptarea momelii.

Statiile cu momeala trebuie pozitionate in imediata apropiere a locurilor in care activitatea rozatoarelor a fost verificata anterior (de exemplu: cai de acces, cuiburi, usi de acces pentru animale, deschideri, diguri, etc.). Unde este posibil, fixati statiile de intoxicare la sol sau pe alte structuri.

Pozitionati produsul departe de indemana copiilor, pasari, animale de companie, animale domestice si alte animale non-tinta.

Pozitionati produsul departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale, precum si de unelte sau suprafete care pot intra in contact cu produsul.

Nu plasati statiile de intoxicare in apropierea sistemelor de scurgere a apei deoarece momeala poate intra in contact cu apa.

Nu mancati, beti sau fumati in timpul utilizarii produsului. Dupa utilizarea produsului spalati mainile si pielea expusa.

La sfarsitul perioadei de tratament indepartati momeala ramasa sau statiile ramase cu momeala.

Nu deschideti pungile alimentare care contin momeala. Periculos pentru mediul inconjurator.

DOZE SI UTILIZARI

- **Utilizare in interiorul cladirilor - Pentru controlul Soarecelui de casa (*Mus musculus*).**

Pozitionati 20-40 g de FERPASTA BRODI 25 per statie de intoxicare, egala cu 1-2 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 20 grame fiecare sau egala cu 2-4 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 10 grame fiecare. In cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 5-7 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal. Aceasta are ca scop verificarea integritatii statiilor, consumul de momeala, si eventual, pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala.

- **Utilizare in interiorul cladirilor - Pentru controlul Sobolanului cenusiu (*Rattus norvegicus*).**

Pozitionati 100-200 g de FERPASTA BRODI 25 per statie de intoxicare, egala cu 5-10 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 20 grame fiecare sau egala cu 10-20 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 10 grame fiecare. In cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 5-7 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal. Aceasta are ca scop verificarea integritatii statiilor, consumul de momeala, si eventual, pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala.

- **Utilizare in exterior, in jurul cladirilor Pentru controlul Sobolanului cenusiu (*Rattus norvegicus*).**

Pozitionati 100-200 g de FERPASTA BRODI 25 per statie de intoxicare, egala cu 5-10 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 20 grame fiecare sau egala cu 10-20 momeli pasta proaspata gata




MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDICE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



de utilizare a 10 grame fiecare. In cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri.

Positionati statiile de intoxicare in zone care nu sunt expuse inundatiilor.

Inlocuiti momelile din statiile de intoxicare daca sunt afectate de apa sau contaminate cu mizerie.

Statiile de intoxicare trebuie verificate cel putin la fiecare 5-7 zile la inceputul tratamentului si cel putin saptamanal dupa aceea, pentru a verifica daca momeala este acceptata, statiile sunt intregre si pentru a indeparta corpurile rozatoarelor. Umpleti din nou statia de intoxicare cand este necesar.

2. UZ PROFESIONAL (PROFESIONALI): IN INTERIOR si IN JURUL CLADIRILOR.

FERPASTA BRODI 25 poate fi utilizat in interiorul si in jurul cladirilor industriale (inclusiv depozite, hale, carenele navelor), anexe gospodaresti, cladiri civile, locuinte, beciuri, garaje, dulapuri, gradini si arii exterioare relevante.

MOD DE APLICARE: FERPASTA BRODI 25 este o momeala gata de utilizare in forma de pasta proaspata, pentru utilizare exclusiva in statii de intoxicare pentru momeala, marcate corespunzator, departe de accesul persoanelor neautorizate, protejate de agentii atmosferici, de ingerarea de catre speciile non tinta si de dispersia in mediu.

INDICATII DE UTILIZARE SI AVERTIZARI

Inainte de utilizare cititi si urmati instructiunile scrise pe ambalajul produsului precum si informatiile care insotesc produsul sau sunt furnizate la punctul de vanzare.

Inainte de pozitionarea momelilor, efectuati o inspectie a zonei infestate si o evaluare la fata locului pentru a identifica speciile de rozatoare, locurile de activitate si pentru a determina cauza probabila si amploarea infestarii. Indepartati sursele de hrana usor accesibile pentru rozatoare (de exemplu cereale imprastiate sau resturi de mancare). De asemenea, nu curatati zona infestata inainte de tratament deoarece acest lucru perturba populatia de rozatoare, facand mai dificila acceptarea momelii.

Produsul trebuie utilizat numai in cadrul sistemului integrat de management al infestatiei (IPM), care include, printre altele, masuri de igiena si, unde este cazul, metode fizice de control.

Luati in considerare masurile preventive de control (de exemplu: astuparea gaurilor, indepartarea, pe cat posibil, a tuturor surselor de hrana si apa) pentru a verifica cantitatea de produs consumata si pentru a reduce posibilitatea de reinfestare.

Statiile cu momeala trebuie pozitionate in imediata apropiere a locurilor in care activitatea rozatoarelor a fost verificata anterior (de exemplu: cai de acces, cuiburi, usi de acces pentru animale, deschideri, diguri, etc.). Unde este posibil, fixati statiile de intoxicare la sol sau pe alte structuri.

Statiile de intoxicare trebuie etichetate in mod clar, indicand faptul ca acestea contin rodenticide si nu trebuie indepartate sau deschise.

Atunci cand produsul este utilizat in zone publice, zonele tratate trebuie semnalizate pe durata perioadei de tratament. Alaturi de momeala, trebuie sa fie disponibil un avertisment care sa indice riscul otravirii primare si secundare de catre anticoagulant, si masurile de prim ajutor care trebuie urmate in caz de otravire. Momeala trebuie fixata astfel incat sa nu fie scoasa din statia de intoxicare.



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCIDE

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA

Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22



Pozitionati produsul departe de indemana copiilor, pasari, animale de companie, animale domestice si alte animale non-tinta. Pozitionati produsul departe de alimente, bauturi si hrana pentru animale, precum si de unelte sau suprafete care pot intra in contact cu produsul.

In timpul manipularii produsului purtati manusi de protectie rezistente la substante chimice.

Nu mancati, beti sau fumati in timpul utilizarii produsului. Dupa utilizarea produsului spalati mainile si pielea expusa.

Daca consumul de momeala este scazut in comparatie cu amploarea evidenta a infestarii, luati in considerare repositionarea statiilor de intoxicare in alte locuri si posibilitatea de a schimba tipul de momeala. Daca dupa o perioada de tratament de 35 de zile, momelile sunt consumate si nu se observa o diminuare a activitatii rozatoarelor, este necesar sa se determine cauza cea mai probabila. In cazul in care alte elemente au fost deja excluse, este probabila existenta unor roatoare rezistente: luati atunci in considerare, unde este posibil, utilizarea unui rodenticid non-anticoagulant sau a unui rodenticid anticoagulant mai puternic. Luati in considerare si utilizarea capcanelor ca masura alternativa de control.

La sfarsitul perioadei de tratament indepartati momeala ramasa sau statiile ramase cu momeala.

Nu deschideti pungile alimentare care contin momeala.

Statiile de intoxicare trebuie etichetate cu urmatoarele informatii "nu mutati sau deschideti"; "contine rodenticid"; "numele produsului sau numarul de autorizatie"; "substanta/e activa/e" si "in caz de incidente, consultati un Centru Antiotravire. Periculos pentru mediul inconjurator.

DOZE SI UTILIZARI

- **Utilizare in interiorul cladirilor - Pentru controlul Soarecelui de casa (*Mus musculus*).**

Pozitionati 20-40 g de FERPASTA BRODI 25 per statie de intoxicare, egala cu 1-2 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 20 grame fiecare sau egala cu 2-4 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 10 grame fiecare. In cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 2-3 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal. Aceasta are ca scop verificarea integritatii statiilor, consumul de momeala, si eventual, pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala.

Urmati instructiunile suplimentare solicitate de bunele practici relevante.

- **Utilizare in interiorul cladirilor - Pentru controlul Sobolanului cenusiu (*Rattus norvegicus*).**

Pozitionati 100-200 g de FERPASTA BRODI 25 per statie de intoxicare, egala cu 5-10 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 20 grame fiecare sau egala cu 10-20 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 10 grame fiecare. In cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 5-7 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal. Aceasta are ca scop verificarea integritatii statiilor, consumul de momeala, si eventual, pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala.

Urmati instructiunile suplimentare solicitate de bunele practici relevante.

- **Utilizare in exterior, in jurul cladirilor - Pentru controlul Soarecelui de casa (*Mus musculus*).**



MINISTERUL SANATATII- COMISIA NATIONALA PENTRU PRODUSE BIOCID

MINISTRY OF HEALTH- NATIONAL COMMITTEE FOR BIOCIDAL PRODUCTS

Str. Dr. A. Leonte, Nr. 1 - 3, 050463 Bucuresti, ROMANIA
Tel: *(+40 21) 318 36 20, Secretariat tehnic: (+40 21) 311 86 20; Fax: (+40 21) 311 86 22

Pozitionati 20-40 g de FERPASTA BRODI 25 per statie de intoxicare, egala cu 1-2 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 20 grame fiecare sau egala cu 2-4 momeli pasta proaspata gata de utilizare a 10 grame fiecare. In cazul in care sunt necesare mai multe statii, amplasati-le la o distanta de circa 5-10 metri una de alta nicidecum la o distanta mai mica de 5 metri. Protejati momeala de conditiile atmosferice (de exemplu ploaie, zapada, etc). Pozitionati statiile de intoxicare in zone care nu sunt expuse inundatiilor.

Statiile de intoxicare trebuie verificate la fiecare 2-3 zile la inceputul tratamentului si apoi cel putin saptamanal. Aceasta are ca scop verificarea integritatii statiilor, consumul de momeala, si eventual, pentru a indeparta carcasele rozatoarelor. Atunci cand este necesar completati cantitatea de momeala.

XIII. CONDITIILE DE DEPOZITARE

Se va depozita numai in recipientul original, în recipiente etichetate clar.

A se păstra în locuri uscate, răcoroase și bine ventilate. A se păstra ambalajele închise departe de razele soarelui.

Se va depozita în locuri unde nu au acces copiii, păsările, animalele de companie și animalele de fermă.

Se vor evita supraîncălzirea și loviturile violente asupra produsului.

DURATA DE CONSERVARE A PRODUSELOR BIOCID ÎN CONDITII NORMALE DE DEPOZITARE : 24 luni

ALTE INFORMATII:

Periculos pentru animalele sălbatice.

Acest produs conține o substanță anticoagulantă. În caz de ingestie, simptomele, care pot apărea cu întârziere, pot să includă sângerări nazale și gingivale. În cazuri severe, pot să apară echimoze pe suprafața pielii și sânge în fecale sau urină.

Antidot: Vitamina K1 administrată numai de personal medical/ veterinar..

In caz de: Expunere cutanată, se va spăla pielea cu apă și apoi cu apă și săpun.

Expunerea oculară, clățiți ochii cu lichid de uz ocular, țineți pleoapele deschise timp de cel puțin 10 minute.

Expunere orală, se va clăti gura cu atenție cu apă. Nu se administrează niciodată nimic pe cale orală unei persoane inconștiente. Nu se va provoca vomă. În caz de ingerare de către un animal de companie, se va contacta un medic veterinar

Prezenta autorizatie este însoțită de următoarele documente :

- proiect de etichetă a produsului biocid
- fisa cu date de securitate a produsului biocid
- rezumatul caracteristicilor produsului biocid

- I. Este obligatorie transmiterea de către detinătorul autorizatiei a fisei cu date de securitate către Institutul National de Sănătate Publică – Biroul RSI si Informare Toxicologică
- II. Prezentul document poate fi însoțit de anexă în cazul modificărilor administrative

PRESEDINTE,
Dr. Chim. Gabriela Cilișca

