

Samenvatting van de productkenmerken van een biocide

Productnaam: MAGNUM GEL ROACHES

Productsoort(en): PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Toelatingsnummer: BE2019-0040

**Referentienummer van de asset
in R4BP 3:** BE-0020416-0000

Inhoudsopgave

Administratieve informatie	1
1.1. Handelsnaam van het product	1
1.2. Toelatingshouder	1
1.3. Fabrikant(en) van de biociden	1
1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)	2
2. Productsamenstelling en -formulering	2
2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide	2
2.2. Formuleringstype	2
3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen	2
4. Toegelaten gebruik	3
5. Algemene gebruiksaanwijzing	14
5.1. Gebruiksvoorschrift	14
5.2. Risicobeperkende maatregelen	14
5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen	15
5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking	15
5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden	15
6. Overige informatie	15

Administratieve informatie

1.1. Handelsnaam van het product

MAGNUM GEL ROACHES
MAGNUM GEL CAFARDS
ROACHES GEL
ROACHES BAIT
EC Gel Roaches
X GEL ROACHES

1.2. Toelatingshouder

Naam en adres van de toelatingshouder	Naam	MYLVA S.A.
	Adres	Via Augusta, 48 08006 Barcelona Spanje
Toelatingsnummer	BE2019-0040	
Referentienummer van de asset in R4BP 3	BE-0020416-0000	
Toelatingsdatum	29/08/2017	
Vervaldatum	31/12/2025	

1.3. Fabrikant(en) van de biociden

Naam van de fabrikant	MYLVA, S.A.
Adres van de fabrikant	Via Augusta, 48 08006 BARCELONA Spanje
Productielocatie	C/ Sant Galderic, 23 Polígono Industrial Ponent Sant Pol de Mar 08395 BARCELONA Spanje

1.4. Fabrikant(en) van de werkzame stof(fen)

Werkzame stof	37 - Imidacloprid
Naam van de fabrikant	ADAMA Agriculture España S.A.
Adres van de fabrikant	Calle Mendez Alvaro, 20-5 28045 Madrid Spanje
Productielocatie	Adama Makhteshim Ltd. - Neot-Hovav Eco-Industrial Park 84100 Beer Sheva Israël
	Jiangsu Yangnong Chemicals Group Co. Ltd - 39 Wenfeng Road 225009 Yangzhou China

2. Productsamenstelling en -formulering

2.1. Kwalitatieve en kwantitatieve informatie over de samenstelling van de biocide

Triviale naam	IUPAC-naam	Functie	CAS-nummer	EG-nummer	Gehalte (%)
Imidacloprid	(2E)-1-[(6-chloropyridin-3-yl) methyl]-N-nitroimidazolidin-2-imine	Werkzame stof	138261-41-3	428-040-8	2,15

2.2. Formuleringstype

RB - Lokmiddel (klaar voor gebruik)

3. Gevarenaanduidingen en veiligheidsaanbevelingen

Gevarencategorie	<p>Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.</p> <p>Bevat 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-one en 2-octil-1, 2-tiaxazol-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.</p>
Veiligheidsaanbevelingen	<p>Buiten het bereik van kinderen houden.</p> <p>Lees aandachtig en volg alle instructies op.</p> <p>Voorkom lozing in het milieu.</p>

Gelekte/gemorste stof opruimen.

Inhoud naar afvoeren volgens de nationale/regionale voorschriften

verpakking afvoeren naar volgens de nationale / regionale voorschriften

4. Toegelaten gebruik

4.1 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 1 - Lokaasgel in druppelvorm - Binnenshuis - Algemeen (niet-professioneel) publiek

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik

Insecticide.

Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Wetenschappelijke naam: *Blattella germanica*
Triviale naam: German cockroach
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: *Blatta orientalis*
Triviale naam: Oriental cockroach
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: *Periplaneta americana*
Triviale naam: American Cockroach
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Binnen

Binnenshuis, naden en kieren.

Toepassingsmethode(n)

Methode: De lokaasgelspuit/het lokaasgelpatroon uit de verpakking halen.
Gedetailleerde beschrijving:
Druppels MAGNUM GEL ROACHES aanbrengen op plaatsen waar kakkerlakken vaak voorkomen, langs kakkerlakkenroutes of in warme en vochtige zones.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: Dosis: hangt af van het besmettingsniveau en de soorten kakkerlakken. (1 druppel = 0'04 g) Duitse kakkerlak (*Blattella germanica*): 0'10-0'16 g/m² (1-4 druppels/m²) Oosterse kakkerlak (*Blatta orientalis*): 0'16-0'24 g/m² (2-6 druppels/m²) Amerikaanse kakkerlak (*Periplaneta Americana*): 0'16 g/m² - 0'24 g/m² (2-6 druppels/m²)
Verdunning (%):

Aantal en timing van de toepassing:

Frequentie van de toepassing: 1 toepassing om de 4 weken.

Breng het product slechts één keer opnieuw aan als de besmetting aanhoudt. Breng niet meer dan 12 druppels per huis aan per toepassing.

Frequentie van de behandeling: De behandeling mag drie maanden na het einde van de besmetting worden herhaald.

Categorie/categorieën gebruikers

Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Spuit, Plastic: LDPE, 1, 2, 3, 4, 5, 8,9 en 10 g

4.1.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het biocide alleen aan in spleten en spleten, achter meubels en motoren. Het product kan niet op oppervlakken worden gebruikt.
Niet mengen met andere chemicaliën, en niet gebruiken in omgevingen die onlangs werden behandeld met een ander insectenverdelgingsmiddel.

Niet gebruiken op houten of poreuze oppervlakken.
Vermijd contact met behandelde oppervlakken.
Stel geen aasdruppels bloot aan zonlicht of warmtebron (dat wil zeggen radiator)

4.1.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Vermijd contact met ogen en huid.
Het product mag niet worden toegepast in een zone die toegankelijk is voor kinderen.
De behandeling moet worden beperkt tot gebieden buiten het bereik van dieren.
Niet aanbrengen op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in contact kunnen komen met voer / voedsel.
Alleen gebruiken in verborgen, moeilijk bereikbare plaatsen en uit de buurt van water.

4.1.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.1.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.1.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

4.2 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 2 - Lokaasgel in druppelvorm - Binnenshuis - Professioneel

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Blattella germanica</i> Triviale naam: Duitse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Blatta orientalis</i> Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Periplaneta americana</i> Triviale naam: Amerikaanse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Binnenshuis, naden en kieren
Toepassingsmethode(n)	Methode: De lokaasgelspuit/het lokaasgelpatroon uit de verpakking halen. Gedetailleerde beschrijving: Druppels MAGNUM GEL ROACHES aanbrengen op plaatsen waar kakkerlakken vaak voorkomen, langs kakkerlakkenroutes of in warme en vochtige zones.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Dosis: hangt af van het besmettingsniveau en de soorten kakkerlakken. (1 druppel = 0'04 g) Duitse kakkerlak (<i>Blattella germanica</i>): 0'10-0'16 g/m ² (1-4 druppels/m ²) Oosterse kakkerlak (<i>Blatta orientalis</i>): 0'16-0'24 g/m ² (2-6 druppels/m ²) Amerikaanse kakkerlak (<i>Periplaneta Americana</i>): 0'16 g/m ² - 0'24 g/m ² (2-6 druppels/m ²) Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van de toepassing: 1 toepassing om de 4 weken. Breng het product slechts één keer opnieuw aan als de infestatie aanhoudt. Breng niet meer dan 12 druppels per huis aan per toepassing. Frequentie van de behandeling: De behandeling mag drie maanden na het einde van de besmetting worden herhaald.

**Categorie/categorieën
gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

Spuit, Plastic: HDPE, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10g

4.2.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het biocide alleen aan in spleten en spleten, achter meubels en motoren. Het product kan niet op oppervlakken worden gebruikt.

Niet mengen met andere chemicaliën, en niet gebruiken in omgevingen die onlangs werden behandeld met een ander insectenverdelgingsmiddel.

Niet gebruiken op houten of poreuze oppervlakken.
Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Stel geen aasdruppels bloot aan zonlicht of warmtebron (dat wil zeggen radiator)

4.2.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Vermijd contact met ogen en huid.

Het product mag niet worden toegepast in een zone die toegankelijk is voor kinderen.

De behandeling moet worden beperkt tot gebieden buiten het bereik van dieren.

Niet aanbrengen op oppervlakken of gebruiksvoorwerpen die in contact kunnen komen met voer / voedsel.

Alleen gebruiken in verborgen, moeilijk bereikbare plaatsen en uit de buurt van water.

4.2.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.2.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.2.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

4.3 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 3 - Lokaasgel in druppelvorm - Binnenshuis - Professioneel gebruiker met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Blattella germanica</i> Triviale naam: German cockroach Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Blatta orientalis</i> Triviale naam: Oriental cockroach Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Periplaneta americana</i> Triviale naam: American Cockroach Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Binnenshuis, naden en spleten.
Toepassingsmethode(n)	Methode: De lokaasgelspuit/het lokaasgelpatroon uit de verpakking halen. Gedetailleerde beschrijving: Druppels MAGNUM GEL ROACHES aanbrengen op plaatsen waar kakkerlakken vaak voorkomen, langs kakkerlakkenroutes of in warme en vochtige zones.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Dosis: hangt af van het besmettingsniveau en de soorten kakkerlakken. (1 druppel = 0'04 g) Duitse kakkerlak (<i>Blattella germanica</i>): 0'10-0'16 g/m ² (1-4 druppels/m ²) Oosterse kakkerlak (<i>Blatta orientalis</i>): 0'16-0'24 g/m ² (2-6 druppels/m ²) Amerikaanse kakkerlak (<i>Periplaneta Americana</i>): 0'16 g/m ² - 0'24 g/m ² (2-6 druppels/m ²) Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van de toepassing: 1 toepassing om de 4 weken. Breng het product slechts één keer opnieuw aan als de infestatie aanhoudt. Breng niet meer dan 12 druppels per huis aan per toepassing. Frequentie van de behandeling: De behandeling mag drie maanden na het einde van de besmetting worden herhaald.

**Categorie/categorieën
gebruikers**

Professioneel

**Verpakkingsgrootte en
verpakkingsmateriaal**

Spuit, Plastic: LDPE, 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 en 10g
Patroon, Plastic: LDPE, 15, 20, 30, 35, 40, 50 g

4.3.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het biocide alleen aan in spleten en spleten, achter meubels en motoren. Het product kan niet op oppervlakken worden gebruikt.

Niet mengen met andere chemicaliën, en niet gebruiken in omgevingen die onlangs werden behandeld met een ander insectenverdelgingsmiddel.

Niet gebruiken op houten of poreuze oppervlakken.

Vermijd contact met behandelde oppervlakken.

Stel geen aasdruppels bloot aan zonlicht of warmtebron (dat wil zeggen radiator)

4.3.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

Draag geschikte handschoenen tijdens het aanbrengen.

Vermijd oog- en huidcontact.

Het product mag niet worden toegepast op plaatsen die voor kinderen en dieren toegankelijk zijn.

Het product mag niet worden aangebracht op oppervlakken waar voedsel wordt bereid, geserveerd, geconsumeerd of opgeslagen.

Het product mag worden toegepast in de levensmiddelenindustrie bij afwezigheid van voedsel, behalve in magazijnen waar goed verpakte producten worden opgeslagen.

Er moeten passende maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat voedsel, apparatuur of gebruiksvoorwerpen die worden gebruikt op locaties die eerder met het product zijn behandeld, geen residues van de werkzame stof bevatten.

Gebruik uitsluitend op moeilijk bereikbare plaatsen en weg van het water.

Pas geïntegreerde bestrijdingsmethoden toe, zoals chemische methoden, fysieke controle en andere maatregelen, rekeninghoudend met lokale specifieke kenmerken (klimatologische omstandigheden, doelsoorten, gebruiksvoorwaarden enz.)

Controleer de werkzaamheid van het product op de site. Bij verminderde werkzaamheid moet de oorzaak hiervan worden onderzocht om er zeker van te zijn dat er geen resistentie mogelijk is.

Gebruik het product niet op plaatsen waar resistentie wordt vermoed of reeds is vastgesteld.

Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.

4.3.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie 5.3

4.3.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie 5.4

4.3.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie 5.5

4.4 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 4 - Vallen met lokaasgel - Binnenshuis - Algemeen (niet-professioneel) publiek

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide.
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Blattella germanica</i> Triviale naam: Duitse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Blatta orientalis</i> Triviale naam: Oosterse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Periplaneta americana</i> Triviale naam: Amerikaanse kakkerlak Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Binnenshuis.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Gebruiksklare lokaasstations Gedetailleerde beschrijving: Gebruiksklare lokaasstations.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: Dosering: 0,2-0,4 g/m ² , afhankelijk van het infestatieniveau, onderverdeeld in verschillende aasstations. Bijvoorbeeld 2 lokaasstations per kamer voor de bestrijding van beperkte plagen (ca. 5 g/22 m ²) - 4 lokaasstations per kamer voor de bestrijding van grote plagen (ca. 10 g/22 m ²) Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van de toepassing: De lokaasstations moeten na ongeveer 4 weken worden aangevuld met vers lokaas als de plaag aanhoudt Frequentie van de behandeling: drie maanden na het einde van de besmetting kan de behandeling worden herhaald.
Categorie/categorieën gebruikers	Breed publiek (niet-professioneel)

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Lokaasstation van zwart kunststof met 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g lokaasgel

4.4.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het product op donkere en natte plaatsen aan: onder de gootsteen, achter het toilet, bij de afvoer.

Gel gang in aasstations.

1. Open het aasstation: knip het uiteinde van de plastic doos op de voorgesneden lijn.
2. Activeer het lokaas: druk de capsule volledig in totdat de gel in het centrale compartiment is afgezet. Scheid de capsule niet na activering.
3. Plaas het geactiveerde aasstation op aanbevolen plaatsen.

4.4.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De stations mogen niet open of in gebruik zijn.

Breng de vingers nooit door de gaten in de aasdoos.

Aan het einde van de behandelingscampagne, verzamel lokdozen voor verwijdering.

4.4.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

Zie hoofdstuk 5.3

4.4.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Zie hoofdstuk 5.4

4.4.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Zie hoofdstuk 5.5

4.5 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 5 - Vallen met lokaasgel - Binnenshuis - Professioneel met aangetoonde gevorderde bekwaamheid

Productsoort	PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen
Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik	Insecticide
Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)	Wetenschappelijke naam: <i>Blattella germanica</i> Triviale naam: German cockroach Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Blatta orientalis</i> Triviale naam: Oriental cockroach Ontwikkelingsstadia: Adulten Wetenschappelijke naam: <i>Periplaneta americana</i> Triviale naam: American Cockroach Ontwikkelingsstadia: Adulten
Toepassingsgebied	Binnen Binnenshuis.
Toepassingsmethode(n)	Methode: Kant-en-klare lokaasstations. Gedetailleerde beschrijving: Kant-en-klare lokaasstations.
Dosering en frequentie van de toepassing	Toe te passen dosis: De dosering is als volgt: 0,2-0,4 g/m ² , afhankelijk van het niveau van infestatie, onderverdeeld in verschillende aasstations. Bijvoorbeeld: - 2 lokaasstations per kamer voor de bestrijding van beperkte plagen (ca. 5 g/22 m ²) - 4 lokaasstations per kamer voor de bestrijding van grote plagen (ca. 10 g/22 m ²) Verdunning (%): Aantal en timing van de toepassing: Frequentie van de toepassing: De lokaasstations moeten na ongeveer 4 weken worden aangevuld met vers lokaas als de plaag aanhoudt. Frequentie van de behandeling: drie maanden na het einde van de besmetting kan de behandeling worden herhaald.
Categorie/categorieën gebruikers	Professioneel
Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal	Lokaasstation van zwart kunststof met 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g lokaasgel

4.5.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het product op donkere en natte plaatsen aan: onder de gootsteen, achter het toilet, bij de afvoer.
Gel gang in aasstations.

1. Open het aasstation: knip het uiteinde van de plastic doos op de voorgesneden lijn.
2. Activeer het lokaas: druk de capsule volledig in totdat de gel in het centrale compartiment is afgezet. Scheid de capsule niet na activering.
3. Plaas het geactiveerde aasstation op aanbevolen plaatsen.

4.5.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De stations mogen niet open of in gebruik zijn.

Breng de vingers nooit door de gaten in de aasdoos.

Aan het einde van de behandelingscampagne, verzamel lokdozen voor verwijdering.

Pas geïntegreerde bestrijdingsmethoden toe, zoals chemische methoden, fysieke controle en andere maatregelen, rekeninghoudend met lokale specifieke kenmerken (klimatologische omstandigheden, doelsoorten, gebruiksvoorwaarden, enz.)

Controleer de werkzaamheid van het product op de site. Bij verminderde werkzaamheid moet de oorzaak hiervan worden onderzocht om er zeker van te zijn dat er geen resistentie mogelijk is.

Gebruik het product niet op plaatsen waar resistentie wordt vermoed of reeds is vastgesteld.

Informeer de toelatingshouder indien de behandeling niet effectief is.

4.5.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie 5.3

4.5.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie 5.4

4.5.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie 5.5

4.6 Omschrijving van het gebruik

Gebruik 6 - Vallen met lokaasgel - Binnenshuis - Professioneel

Productsoort

PT 18 - Insecticiden, acariciden en producten voor de bestrijding van andere geleedpotigen

Indien van toepassing, een precieze beschrijving van het toegelaten gebruik Doelorganisme(n) (met inbegrip van ontwikkelingsstadium)

Insecticide

Wetenschappelijke naam: *Blattella germanica*
Triviale naam: German cockroach
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: *Blatta orientalis*
Triviale naam: Oriental cockroach
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Wetenschappelijke naam: *Periplaneta americana*
Triviale naam: American Cockroach
Ontwikkelingsstadia: Adulten

Toepassingsgebied

Binnen

Binnenshuis.

Toepassingsmethode(n)

Methode: Kant-en-klare lokaasstations.
Gedetailleerde beschrijving:
Kant-en-klare lokaasstations.

Dosering en frequentie van de toepassing

Toe te passen dosis: De dosering is als volgt: 0,2-0,4 g/m³, afhankelijk van de infestatiegraad en verdeeld over meerdere lokaasstations. Bijvoorbeeld:- 2 lokaasstations per kamer voor de bestrijding van beperkte plagen (ca. 5 g/22 m²) - 4 lokaasstations per kamer voor de bestrijding van grote plagen (ca. 10 g/22 m²)
Verdunning (%):
Aantal en timing van de toepassing:

Frequentie van de toepassing: De lokaasstations moeten na ongeveer 4 weken worden aangevuld met vers lokaas als de plaag aanhoudt

Frequentie van de behandeling: drie maanden na het einde van de besmetting kan de behandeling worden herhaald.

Categorie/categorieën gebruikers

Professioneel

Verpakkingsgrootte en verpakkingsmateriaal

Lokaasstation van zwart kunststof met 1, 1.2, 1.5, 2, 2.5 g lokaasgel

4.6.1 Gebruik-specifieke gebruiksinstructies

Breng het product op donkere en natte plaatsen aan: onder de gootsteen, achter het toilet, bij de afvoer.

Gel gang in aasstations.

1. Open het aasstation: knip het uiteinde van de plastic doos op de voorgesneden lijn.

2. Activeer het lokaas: druk de capsule volledig in totdat de gel in het centrale compartiment is afgezet. Scheid de capsule niet na activering.

3. Plaas het geactiveerde aasstation op aanbevolen plaatsen.

4.6.2 Gebruik-specifieke risicobeperkende maatregelen

De stations mogen niet open of in gebruik zijn.
Breng de vingers nooit door de gaten in de aasdoos.
Aan het einde van de behandelingscampagne, verzamel lokdozen voor verwijdering.

4.6.3 Waar specifiek voor het gebruik, de bijzonderheden betreffende mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO-instructies en noodmaatregelen om het milieu te beschermen

zie 5.3

4.6.4 Waar specifiek voor het gebruik, instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

zie 5.4

4.6.5 Waar specifiek voor het gebruik, voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

zie 5.5

5. Algemene gebruiksaanwijzing

5.1. Gebruiksvoorschrift

Lees vóór gebruik eerst het etiket of de bijsluiter, en leef te allen tijde de meegeleverde instructies na.
U moet de plaag eerst grondig bestuderen om het besmettingsniveau (laag of hoog) te bepalen. Breng daarna de lokaasstations aan op de plaatsen waar kakkerlakken zijn gezien.
Alleen voor binnengebruik.

5.2. Risicobeperkende maatregelen

Dit product moet worden afgewisseld met alternatieve producten die een andere actieve stof bevatten om de ontwikkeling van resistente populaties te voorkomen.

Lokaas mag niet worden geplaatst waar voedsel, veevoeder of drinkwater kan worden besmet.

Het product moet opnieuw worden aangebracht tot de plaag is bestreden.

De aanbevolen doses en intervallen respecteren.

Om de effectiviteit van de behandeling te optimaliseren, respecteer goede hygiënepraktijken: verwijder of voorkom toegang tot alle bronnen van voedsel. Het aas moet de belangrijkste bron van voedsel zijn dat beschikbaar is voor de kakkerlakken.

Om de werkzaamheid te optimaliseren, controleert u het aas eenmaal per week en vervangt / ververst u het aas als ze beschadigd of bevuild zijn.

Het product moet zo worden geplaatst dat het risico dat andere dieren of kinderen ervan eten zoveel mogelijk wordt beperkt

Het product niet op de grond gooien, in waterlopen lozen, door de gootsteen spoelen of in het riool lozen.

Voorom lozing in het milieu (P273).

Alleen gebruiken in verborgen, moeilijk bereikbare plaatsen en uit de buurt van water.

Aan het einde van de behandelingscampagne, verzamel lokdozen voor verwijdering.

Voer ongebruikt product, de verpakking en al het overige afval (d.w.z. dode insecten) af in overeenstemming met de nationale /regionale voorschriften.

5.3. Bijzonderheden van mogelijke directe of indirecte effecten, EHBO instructies en noodmaatregelen om mens, dier en milieu te beschermen

Elementaire eerstehulpprocedures:

In geval van contact met de ogen, gedurende minstens 15 minuten met overvloedig water spoelen. Vergeet NIET de contactlenzen te verwijderen. In geval van contact met de huid, met zeep en overvloedig water wassen, zonder wrijven. Het slachtoffer indien nodig naar een ziekenhuis brengen, en het etiket of de verpakking indien mogelijk meenemen. In geval van vergiftiging, het slachtoffer nooit zonder toezicht laten. Medisch advies voor de artsen en het sanitair personeel. Symptomatische en ondersteunende behandeling.

ALS MEDISCH ADVIES VEREIST IS, HOUD DAN DE PRODUCTVERPAKKING OF HET ETIKET BIJ DE HAND EN NEEM CONTACT OP MET HET ANTIGIFCENTRUM

Noodmaatregelen ter bescherming van het milieu (Voor algemeen publiek)

Voorzorgsmaatregelen: Voorzie beschermende barrières en lekgoten om te voorkomen dat het product in het milieu (oppervlakte- en grondwater), de riolering, de afvoer enz. terecht komt. Neem contact op met de relevante autoriteiten als u informatie hebt over lekkages naar waterwegen, afvoerputten, riolen...

InsluTINGS- en reinigingsmethoden en -materiaal: Wanneer er gemorst wordt, dit in inert materiaal (zand, kaolien ...) absorberen, verzamelen en in containers scheppen voor verwerking als gevaarlijk afval.

5.4. Instructies voor de veilige verwijdering van het product en zijn verpakking

Verwijder de inhoud / verpakking overeenkomstig de nationale / regionale voorschriften (P501).

5.5. Voorwaarden voor opslag en de houdbaarheid van het product onder normale opslagomstandigheden

Onder normale omstandigheden blijft dit product 2 jaar stabiel bij opslag in de oorspronkelijke verpakking.

In de goed gesloten, oorspronkelijke verpakking bewaren.

Op een droge, koele en goed geventileerde plaats bewaren.

U wordt aangeraden om het product bij voorkeur bij een temperatuur tussen 5°C en 45°C te bewaren.

6. Overige informatie

Het product bevat een stof met een afstotende werking voor mens en dier.

De toelatingshouder moet ervoor zorgen dat het grote publiek op de hoogte is van het verschil tussen soorten en het niveau van infestatie om een correcte dosering te kunnen toepassen.

